

ANNESS III

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT, TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF

Nota: Dan l-SPC, it-tikketta u l-fuljett ta' taghrif, huma fil-verżjoni valida ta' meta ġiet mehudha d-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti ta l-istati Membri, flimkien ma' l-Istat Membru ta' Referenza se jaġġornaw l-informazzjoni tal-prodott kif mehtieġ. Ghalhekk dan l-SPC, tikketta u l-fuljett ta' taghrif mhux neċessarjament jirrapreżentaw il-kontenut attwali.

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Ghall-prodotti mediċinali li jinghataw b'riċetta tat-tabib

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg kapsuli ibsin
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg kapsuli ibsin
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg kapsuli ibsin

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10 mg: Kull kapsula fiha 10 mg omeprazole.

20 mg: Kull kapsula fiha 20 mg omeprazole.

40 mg: Kull kapsula fiha 40 mg omeprazole.

Sustanza mhux attiva:

10 mg: Kull kapsula fiha 4 mg lactose.

20 mg: Kull kapsula fiha 8 mg lactose.

40 mg: Kull kapsula fiha 9 mg lactose.

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula, iebsa (kapsula).

10 mg: kapsuli ibsin tal-ġelatina b'korp opak roża, immarkat 10 u għatu opak roża immarkat A/OS, li fihom pritkuni b'kisja enterika.

20 mg: kapsuli ibsin tal-ġelatina b'korp opak roża, immarkat 20 u għatu opak ahmar jagħti fil-kanella mmarkat A/OM li fihom pritkuni b'kisja enterika.

40 mg: kapsuli ibsin tal-ġelatina b'korp opak ahmar jagħti fil-kanella, immarkat 40 u għatu opak ahmar jagħti fil-kanella mmarkat A/OM li fihom pritkuni b'kisja enterika.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-kapsuli Losec huma indikati:

Adulti

- Għall-kura ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-kura ta' ulċera tal-istonku
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tal-istonku
- Flimkien ma' antibiotiċi xierqa, għat-tnehhija għalkollox ta' *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) f'mard ta' ulċera peptika
- Għall-kura ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID
- Għall-prevenzjoni ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li huma f'riskju
- Għall-kura ta' esofagite tar-rifluss
- Għall-immanigġjar fit-tul ta' pazjenti b'esofagite tar-rifluss mfejqa
- Għall-kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi

- Ghall-kura tas-sindrome Zollinger-Ellison

Użu pedjatriku

Tfal 'l fuq minn sena u ≥ 10 kg

- Kura ta' esofagite tar-rifluss
- Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u ta' meta jerga' jitla' l-aċidu mill-istonku f'mard ta' rifluss gastro-esofagali.

Tfal u adolexxenti 'l fuq minn 4 snin

- Flimkien ma' antibijotiċi fil-kura ta' ulċera tad-duwodenu ikkawżata minn *H. pylori*

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Požoloġija fl-adulti

Kura ta' ulċeri tad-duwodenu

Id-doża rrakkomandata f'pazjenti b'ulċera attiva tad-duwodenu hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejtan isehh fi żmien ġimagħtejn. Għal daww il-pazjenti li ma jkunux fiequ għal kollox wara l-ewwel kors, il-fejtan isehh waqt il-perjodu ta' kura għal ġimagħtejn ohra. F'pazjenti b'ulċera tad-duwodenu li jkollhom rispons dgħajjed Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejtan is-soltu jinkiseb fi żmien 4 ġimgħat.

Prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu

Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċera tad-duwodenu f'pazjenti negattivi għal *H. pylori* jew meta t-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* mhijiex possibbli, id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. F'xi pazjenti doża ta' 10 mg kuljum tista' tkun biżżejjed. F'każ ta' falliment tal-kura, id-doża tista' tiżdied għal 40 mg.

Kura ta' ulċeri gastriki

Id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejtan isehh fi żmien erba' ġimgħat. Għal daww il-pazjenti li jista' jkun li ma jkunux fiequ għal kollox wara l-ewwel kors, il-fejtan s-soltu jsehħ waqt il-perjodu ta' kura għal erba' ġimgħat ohra. F'pazjenti b'ulċera gastrika li jkollhom rispons dgħajjed Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejtan is-soltu jinkiseb fi żmien 8 ġimgħat.

Prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri gastriki

Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċera gastrika f'pazjenti b'rispons dgħajjed id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Jekk ikun hemm bżonn id-doża tista' tiżdied għal Losec 40 mg darba kuljum.

*It-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* f'mard ta' ulċera peptika*

Għat-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* l-għażla ta' antibijotiċi għandha tqis it-tolleranza individwali tal-pazjent għal medicina, u għandha ssir skont il-modi tar-reżistenza nazzjonali, reġjonali u lokali u l-linji gwida tal-kura.

- Losec 20 mg + clarithromycin 500 mg + amoxicillin 1,000 mg, kull waħda minnhom darbtejn kuljum għal ġimgħa, jew
- Losec 20 mg + clarithromycin 250 mg (jew inkella 500 mg) + metronidazole 400 mg (jew 500 mg jew tinidazole 500 mg), kull waħda minnhom darbtejn kuljum għal ġimgħa, jew
- Losec 40 mg darba kuljum ma' amoxicillin 500 mg u metronidazole 400 mg (jew 500 mg jew tinidazole 500 mg), it-tnejn li huma tliet darbiet kuljum għal ġimgħa.

F'kull kors, jekk il-pazjent ikun għadu pożittiv għall-*H. pylori*, it-terapija tista' terġa tingħata.

Ulċeri gastriki u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID

Għall-kura ta' ulċeri gastriki u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID, id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejtan isehh fi żmien erba' ġimgħat. Għal daww il-

pazjenti li ma jkunux fiequ għalkollox wara l-ewwel kors, il-fejqan ġeneralment isehh waqt il-perjodu ta' kura għal erba' ġimgħat oħra.

Għall-prevenzjoni ta' ulċeri gastrici u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li jkollhom riskju
Għall-prevenzjoni ta' ulċeri gastrici jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li jkollhom riskju (età > 60, passat ta' ulċeri gastrici jew fid-duwodenu, passat ta' fsada GI mill-parti ta' fuq) id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum.

Kura ta' esofagite tar-rifluss

Id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejqan isehh fi żmien erba' ġimgħat. Għal dawk il-pazjenti li ma jkunux fiequ għalkollox wara l-ewwel kors, il-fejqan is-soltu isehh waqt il-perjodu kura għal 4 ġimgħat oħra.

F'pazjenti b'esofagite severa Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejqan is-soltu jinkiseb fi żmien tmien ġimgħat.

Treġġija fit-tul ta' pazjenti li jkunu fiequ minn esofagite tar-rifluss

Għall-Treġġija fit-tul ta' pazjenti li jkunu fiequ minn esofagite tar-rifluss id-doża rakkomandata hija Losec 10 mg darba kuljum. Jekk ikun hemm bżonn, id-doża tista' tiżdied għal Losec 20-40 mg darba kuljum.

Kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi

Id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg kuljum. Il-pazjenti jistgħu jkollhom rispons xieraq b'10 mg kuljum, u għalhekk għandu jiġi kkunsidrat it-tibdil tad-doża fuq bażi individwali.

Jekk il-kontroll tas-sintomi jkun għadu ma nkisibx fi żmien erba' ġimgħat ta' kura b'Losec 20 mg kuljum, huwa rakkomandat li jsiru aktar investigazzjonijiet.

Kura tas-sindrome Zollinger-Ellison

F'pazjenti bis-sindrome Zollinger-Ellison id-doża għandha tiġi aġġustata b'mod individwali u l-kura għandha titkompla sakemm ikun indikat b'mod kliniku. Id-doża tal-bidu rakkomandata hija Losec 60 mg kuljum. Il-pazjenti kollha b'mard sever u li ma kellhomx rispons xieraq għal terapija oħrajn kienu kontrollati b'mod effettiv u aktar minn 90% tal-pazjenti mmanjna fuq dożi ta' Losec 20-120 mg kuljum. Meta d-doża taqbeż Losec 80 mg kuljum, id-doża għandha tinqasam u tinghata darbtejn kuljum.

Požoloġija fit-tfal

Tfal 'l fuq minn sena u ≥ 10 kg

Kura ta' esofagite tar-rifluss

Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu mill-istonku f'mard tar-rifluss gastro-esofagali

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-pożoloġija huma kif ġej:

Età	Piż	Požoloġija
età ≥ sena	10-20 kg	10 mg darba kuljum. Id-doża tista' tiżdied għal 20 mg darba kuljum jekk ikun hemm bżonn.
età ≥ sentejn	> 20 kg	20 mg darba kuljum. Id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum jekk ikun hemm bżonn.

Esofagite tar-rifluss: Iż-żmien ta' kura huwa 4-8 ġimgħat.

Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu mill-istonku f'mard ta' rifluss gastroesofagali: Iż-żmien ta' kura huwa 2-4 ġimgħat. Jekk il-kontroll tas-sintomi jkun għadu ma nkisibx wara 2-4 ġimgħat il-pazjent għandu jiġi eżaminat aktar.

Tfal u adoloxxenti li għandhom 'l fuq minn erba' snin

Kura ta' ulċera fid-duwodenu kkawżata minn H. pylori

Meta tkun qed tintgħażel it-terapija kombinata xierqa, għandhom jitqiesu l-linji gwida nazzjonali reġjonali u lokali dwar ir-reżistenza tal-batteri, tul ta' żmien tal-kura (l-aktar komuni 7 ijiem iżda xi kultant sa 14-il jum), u l-użu xieraq ta' sustanzi kontra l-batteri.

Irid ikun hemm superviżjoni tal-kura minn speċjalista.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-pożoloġija huma kif ġej:

Piż	Pożoloġija
15–30 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 10 mg, amoxicillin 25 mg/kg piż tal-ġisem u clarithromycin 7.5 mg/kg piż tal-ġisem jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgħa.
30–40 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 20 mg, amoxicillin 750 mg u clarithromycin 7.5 mg/kg piż tal-ġisem jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgħa.
> 40 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 20 mg, amoxicillin 1 g u clarithromycin 500 mg jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgħa.

Popolazzjonijiet speċjali

Funzjoni renali indebolita

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f'pazjenti b'funzjoni renali indebolita (ara sezzjoni 5.2).

Funzjoni epatika indebolita

F'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita doża ta' 10-20 mg kuljum tista' tkun biżżejjed (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani(> 65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta' kif jingħata

Huwa rrakkomandat li tiegħu l-kapsuli Losec filghodu, l-aħjar mingħajr ikel, u tiblagħhom shaħ ma nofs tazza ilma. Il-kapsuli m'għandhomx jintmagħdu jew jitfarrku.

Għall-pazjenti li ma jistgħux jibilgħu u għal tfal li jistgħu jixorbu jew jibilgħu ikel artab

Il-pazjenti jistgħu jifthu u jibilgħu l-kontenut ma' nofs tazza ilma jew wara li jhalltu l-kontenut ma likwidu kemxejn aċiduż eż. meraq tal-frott jew pure tat-tuffieħ jew ilma mhux bil-gass. Il-pazjenti għandhomjiġu mwissija li t-taħlita għandha tittiehed mill-ewwel (jew fi żmien 30 minuta) u dejjem għandha tithawwad qabel tinxtorob u wara għandha terġa' tinxtorob nofs tazza ilma.

Inkella l-pazjenti jistgħu jhallu l-kapsula tinħall fil-halq u jibilgħu il-pritkuni ma' nofs tazza ilma. Il-pritkuni b'kisja enterika m'għandhomx jintmagħdu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal omeprazole, għal benzimidazoles sostitwiti jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Bħal inibituri tal-pompa tal-proton (PPI's) ohrajn omeprazole m'għandux jintuza flimkien ma' nelfinavir (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Malli jkun hemm xi sintomu li jqanqal suspett (eż telf tal-piż sinifikanti mingħajr intenzjoni, rimettar ta' spiss, uġiġh biex tibla', rimettar ta' demm jew melena) u meta jkun hemm suspett jew ikun magħruf li hemm ulċera fl-istonku, mard malinn għandu jiġi eskluż, minhabba li l-kura tista' sserraħ is-sintomi u tittardja d-dijanjozi.

L-ghoti flimkien ta' atazanavir u inibituri tal-pompa tal-proton mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5). Jekk ikunhemm opinjoni li t-tahlita ta' atazanavir u impeditur tal-pompa tal-proton ma tistax tigi evitata, sorveljanza klinika mill-qrib (eż. tagħbija tal-virus) hija rrakkomandata flimkien ma' zieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma' 100 mg ta' ritonavir; id-doża ta' omeprazole 20 mg m'għandiex tinqabeż.

Omeprazole bħal kull mediċina oħra li timblokka l-aċidu, jista' jnaqqas l-assorbiment tal-vitamina B₁₂ (cyanocobalamin) minhabba li jew ikun kemm livell imnaqqas hafna ta' aċidu fl-istonku jew ma jkun hemm l-ebda aċidu fl-istonku. Dan għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti bi tnaqqis fil-ħażna li jkollhom f'għisimhom jew fatturi ta' riskju għal tnaqqis fl-assorbiment ta' vitamina B₁₂ u li qegħdin fuq terapija fit-tul.

Omeprazole huwa impeditur ta' CYP2C19. Meta tibda jew tispiċċa kura b'omeprazole, il-possibbiltà ta' interazzjonijiet b'mediċini mmetabolizzati permezz ta' CYP2C19 għandu jiġi kkunsidrat. Interazzjoni hija osservata bejn clopidogrel u omeprazole (ara sezzjoni 4.5). Ir-rilevanza klinika ta' din l-interazzjoni mhijiex ċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole u clopidogrel għandu jiġi skoraggut.

Xi tfal b'mard kroniku jistgħu jehtieġu kura fuq perjodu twil għalkemm dan mhux irrakkomandat.

Losec fih il-lactose. Pazjenti b'mard eriditarju rari ta' intolleranza għal galactose, defiċjenza tal-Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m'għandhomx jiehdu din il-mediċina.

Kura b'inibituri tal-pompa tal-proton tista' twassal għal kemxejn zieda fir-riskju ta' infezzjonijiet gastrointestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter* (ara sezzjoni 5.1).

Bħal kull kura oħra għal tul ta' zmien, speċjalment meta jinqabeż perjodu ta' sena ta' kura, il-pazjenti għadhom jinżammu taħt sorveljanza regolari.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta' omeprazole fuq il-farmakokinetika ta' sustanzi attivi oħra

Sustanzi attivi b'assorbiment dipendenti fuq il-pH

It-tnaqqis fl-aċidità ġol-istonku waqt kura b'omeprazole tista' żżid jew tnaqqas l-assorbiment ta' sustanzi attivi b'assorbiment mill-istonku li jiddependi fuq il-pH.

Nelfinavir, atazanavir

Il-livelli ta' nelfinavir u atazanavir fil-plasma jonqsu f'każ ta' għoti flimkien ma' omeprazole.

L-ghoti flimkien ta' omeprazole u nelfinavir huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3). L-ghoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) naqqas l-esponiment medju għal nelfinavir b'madwar 40% u l-esponiment medju tal-meabolit attiv b'mod farmakoloġiku M8 tnaqqas b'madwar 75-90%. L-interazzjoni tista' tinvolvi wkoll l-inibizzjoni ta' CYP2C19 inhibition.

L-ghoti flimkien ta' omeprazole u atazanavir mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L-ghoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) u atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' 75% mill-esponiment ta' atazanavir. Iż-żieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma kkompensatx għall-impatt ta' omeprazole fuq l-esponiment ta' atazanavir. L-ghoti flimkien ta' omeprazole (20 mg darba kuljum) ma' atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' madwar 30% fl-esponiment atazanavir meta mqabbel ma' atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg darba kuljum.

Digoxin

Kura b'omeprazole (20 mg kuljum) flimkien ma' digoxin f'individwi b'saħħithom zied il-bijodisponibiltà ta' digoxin b'10%. Tossicità b'digoxin kienet irrappurtata b'mod rari. Madankollu

għandha tintuża l-kawtela meta omperazole jingħata f' doži għoljin lill-pazjenti anzjani. Is-sorveljanza terapewtika tal-medicina għal digoxin għandha imbagħad tissaħħah.

Clopidogrel

Fi studju kliniku crossover, clopidogrel (doża kbira fil-bidu ta' 300 mg segwita minn 75 mg/kuljum) wahdu u ma' omeprazole (80 mg fl-istess hin ma' clopidogrel) ingħataw għal 5 ijiem. L-esponiment għall-metaboliti attivi ta' clopidogrel tnaqqas b'46% (Jum 1) u b'42% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta' tagħqid ta' plejtlits (IPA) tnaqqset b'47% (24 siegħa) u bi 30% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. Fi studju iehor intwera li l-ghoti ta' clopidogrel u omeprazole f'hinijiet differenti ma' żammx l-interazzjoni, li x'aktarx tigrì minhabba l-effett inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19, milli ssehh. Id-dejta inkonsistenti fuq l-implikazzjonijiet kliniċi ta' din l-interazzjoni PK/PD f'dawk li huma każijiet kardjovaskulari serji kienet rappurtata minn studji ta' osservazzjoni u kliniċi.

Sustanzi attivi ohra

L-assorbiment ta' posaconazole, erlotinib, ketoconazol u itraconazol jtnaqqas b'mod sinifikanti u b'hekk l-effikaċja klinika tista' tiddgħajjef. Għal posaconazol u erlotinib l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat.

Sustanzi attivi mmetabolizzati minn CYP2C19

Omeprazole huwa inibitur moderat ta' CYP2C19, l-enzima prinċipali li timmetabloizza omeprazole B'dan il-mod, il-metaboliżmu ta' sustanzi attivi mogħtija flimkien miegħu li huma wkoll immetabolizzati minn CYP2C19, jista' jonqos u l-esponiment sistemiku għal dawn is-sustanzi jiżdied. Eżempji ta' medicini bħal dawn huma R-warfarin u antagonisti ohra tal-vitamina K, cilostazol, diazepam u phenytoin.

Cilostazol

Omeprazole, mogħti f' doži ta' 40 mg lill-individwi b'saħħithom fi studju inkroċjat, zied is- C_{max} u l-AUC għal cilostazol bi 18% u 26% rispettivament, u wiehed mill-metaboliti attivi tiegħu b'29% u 69% rispettivament.

Phenytoin

Is-sorveljanza tal-konċentrazzjonijiet ta' phenytoin fil-plasma huwa rrakkomandat waqt l-ewwel ġimagħtejn wara minn meta tinbeda kura b'omeprazole u, jekk isir aġġustament fid-doża ta' phenytoin, sorveljanza u aktar aġġustamenti fid-doża għandhom isiru mal-waqfa mill-kura b'omeprazole.

Mekkaniżmu mhux magħruf

Saquinavir

L-ghoti flimkien ta' omeprazole u saquinavir/ritonavir wassal għal zidiet fil-livelli tal-plażma sa madwar 70% għal saquinavir li kienu assoċjati ma' tollerabilità tajba f'pazjenti infettati bl-HIV.

Tacrolimus

L-ghoti flimkien ma' omeprazole ġie rappurtat li jżid il-livelli ta' tacrolimus fis-serum. Għandhom isiru sorveljanzi msaħħa tal-konċentrazzjonijiet ta' tacrolimus kif ukoll tal-funzjoni tal-kliwi (tneħħija tal-krejinina), u d-doża ta' tacrolimus għandha tiġi aġġustata jekk ikun meħtieġ.

L-effetti ta' sustanzi attivi ohra fuq il-farmakokinetika ta' omeprazole

Inibituri CYP2C19 u/jew CYP3A4

Minhabba li omeprazole huwa metabolizzat permezz ta' CYP2C19 u CYP3A4, sustanzi attivi li huma magħrufa li jinibixxu CYP2C19 jew CYP3A4 (bħal clarithromycin u voriconazole) jistgħu jwasslu għal zieda fil-livelli ta' omeprazole fis-serum billi jnaqqsu r-rata ta' metaboliżmu ta' omeprazole. Il-kura b'voriconazole fl-istess hin wasslet għall-esponiment ta' omeprazole ta' aktar mid-doppju. Minhabba li doži għoljin ta' omeprazole kienu tollerati sew, tibdil fid-doża ta' omeprazole

ġeneralment ma tkunx meħtieġa. Madankollu, aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'indeboliment qawwi tal-fwied u jekk tkun indikata kura għal żmien twil.

Indutturi ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Sustanzi attivi li huma magħrufa li jinduċu CYP2C19 jew CYP3A4 jew it-tnejn li huma (bħal rifampicin u St John's wort) jistgħu jwasslu għal livelli mnaqqsa ta' omeprazole fis-serum billi jżidu r-rata tal-metaboliżmu ta' omeprazole.

4.6 Tqala u treddigh

Ir-riżultati minn tlett studji prospettivi epidemjoloġiċi (aktar minn 1000 riżultat ta' esponiment) ma jindikaw l-ebda effetti avversi ta' omeprazole fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija li tkun għada kif twieldet. Omeprazole jista' jintuza waqt it-tqala.

Omeprazole johroġ mal-halib tas-sider iżda mhux probabbli li jkollu effett fuq it-tarbija meta jingħataw dozi terapewtiċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Losec mhux probabbli li jeffettwa il-hila biex issuq u thaddem magni. Jistgħu jseħhu reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjenti jiġu affettwati huma m'għandhomx isuq jew ihaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar effetti sekondarji komuni (minn 1-10% tal-pazjenti) huma uġigh ta' ras, uġigh addominali, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku u tqalligh/rimettar.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina li ġejjin kienu identifikati jew suspettati fil-programm ta' provi kliniċi għal omeprazole u wara li tqieghed fis-suq. L-ebda minnhom ma nstabu li kienu relatati mad-doża. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond il-frekwenza u l-Klassi tas-Sistemi u tal-Organ (SOC). Il-kategoriji ta' frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni (≥1/10), Komuni (≥1/100 sa <1/10), Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), Rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), Rari hafna (<1/10,000), Mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data diaponibbli).

SOC/frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika	
Rari:	Lewkopenija, tromboċitopenija
Rari hafna:	Agranuloċitosi, panċitopenija
Disturbi fis-sistema immuni	
Rari:	Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva eż. deni, angjoedima u xokk/reazzjoni anafilattiku/a
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	
Rari:	Iponatrimija
Rari hafna	Ipomagnesimja
Disturbi psikjatriċi	
Mhux komuni:	Insomnija
Rari:	Aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni
Rari hafna:	Aggressjoni, allucinazzjonijiet
Disturbi fis-sistema nervuża	
Komuni:	Uġigh ta' ras
Mhux komuni:	Sturdament, parestesija, hedla tan-nghas
Rari:	Disturb fit-togħma
Disturbi fl-ghajnejn	
Rari:	Vista mċajpra

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika	
Mhux komuni:	Vertiġini
Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali	
Rari:	Bronkospazmu
Disturbi gastro-intestinali	
Komuni:	Ugħigh addominali, stitikezza, dijarea, gass, tqalligh/rimettar
Rari:	Halq xott, stomatite, kandidjasi gastrointestinali
Disturbi fil-fwied u fil-marrara	
Mhux komuni:	Żieda fl-enzimi tal-fwied
Rari:	Epatite bis-suffejra jew mingħajrha
Rari hafna:	Falliment epatiku, encefalopatija f'pazjenti b'mard tal-fwied diġà eżistenti
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda	
Mhux komuni:	Deramtitte, ħakk, raxx, urtikarja
Rari:	Alopeċja, fotosensittività
Rari hafna:	Eritema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolisi epidermali tossika (TEN)
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi	
Rari:	Artralġja, mijalġja
Rari hafna:	Dgħufija fil-muskoli
Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja	
Rari:	Nefrite tal-interstizju
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider	
Rari hafna:	Ġinekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata	
Mhux komuni:	Telqa tal-ġisem, edima periferali
Rari:	Żieda fil-hruġ tal-gharaq

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà ta' omeprazole kienet evalwata f'totali ta' 310 tifel u tifla ta' età minn 0 sa 16-il sena b'mard relatat mal-aċidu. Hemm dejta limitata dwar l-użu fit-tul minn 46 tifel u tifla li rċievew terapija ta' manteniment b'omeprazole waqt studju kliniku għal esofaġite erożiva severa sa mhux aktar minn 749 jum. Il-profil ta' effetti avversi kien b'mod ġenerali l-istess bħal dak għall-adulti kemm għall-kura li ma ddumx kif ukoll għall-użu fit-tul. M'hemmx dejta dwar l-effetti bl-użu fit-tul tal-kura b'omeprazole fuq il-pubertà u l-kobor.

4.9 Doża eċċessiva

Hemm informazzjoni limitata dwar l-effetti ta' dozi eċċessivi ta' omeprazole fil-bnedmin. Fil-letteratura medika, dozi sa 560 mg ġew deskritti, u nkisbu rapporti rari meta dozi waħdiet mill-halq laħqu sa 2,400 mg omeprazole (120 darba d-doża klinika li soltu tkun rrakkomandata). Tqalligh, rimettar, sturdament, ugħigh fl-addome, dijarea u ugħigh ta' ras kienu rrapportati. Ukoll apatija, depressjoni u konfużjoni kienu deskritti f'każijiet waħdiet.

Is-sintomi deskritti kienu mumentanji, u l-ebda effett serju ma kien irrappurtat. Ir-rata ta' eliminazzjoni ma nbidlitx (kinetika *first order*) b'dozi aktar għoljin. Kura, jekk meħtieġa, hija kura tas-sintomi.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibitur tal-Pompa tal-Proton, Kodiċi ATC: A02BC01

Kif jaħdem

Omeprazole, taħlita ta' numru ugwali ta' żewġ enantiomeri li jduru lejn il-lemin u lejn ix-xellug inaqas is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku permezz ta' mekkanizmu speċifiku ħafna. Huwa inibitur speċifiku tal-pompa tal-aċidu fiċ-ċellola parjetali. Jahdem malajr ħafna u jipprovdi kontroll permezz ta' inibizzjoni reversibbli tal-aċidu fl-istonku b'doża mogħtija darba kuljum.

Omeprazole huwa bażi dgħajef u jiġi kkonċentrat u mibdul fil-forma attiva fl-ambjent aċiduż ħafna tal-kanalikuli fiċ-ċelluli ta' goċ-ċelluli parjetali, fejn jinibixxi l-enzima $H^+ K^+ -ATPase$ - il-pompa tal-aċidu. Dan l-effett fuq l-aħħar pass tal-proċess ta' kif jiġforma l-aċidu fl-istonku jiddependi mid-doża u jipprovdi inibizzjoni effettiva ħafna kemm tas-sekrezzjoni tal-aċidu bażali kif ukoll s-sekrezzjoni ta' l-aċidu stimulata, irrispettivament mill-istimolu.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti farmakodinamiċi kollha li deħru jistgħu jiġu spjegati bl-effett ta' omeprazole fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu.

Effett fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku

Għoti ta' dozi ta' omeprazole orali darba kuljum jipprovdi inibizzjoni malajr u effettiva tas-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku waqt il-jum u bil-lejl b'effett massimu jinkiseb fi żmien 4 ijiem ta' kura. B'omeprazole 20 mg, tnaqqis medju ta' mill-anqas 80% tal-aċidità fl-istonku fuq perjodu ta' 24-sieġha imbagħad jinżamm f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu, bi tnaqqis medju fl-ogħla punt fejn johroġ l-aċidu wara stimolazzjoni ta' pentagastrin ikun madwar 70% 24 sieġha wara li tingħata d-doża.

Għoti ta' dozi ta' omeprazole 20 mg jżomm pH fl-istonku ta' ≥ 3 għal medja ta' 17-il sieġha mill-perjodu ta' 24-sieġha f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu.

B'konsegwenza tat-tnaqqis fis-sekrezzjoni tal-aċidu u tal-aċidità fl-istonku, omeprazole inaqas/iġib lura għan-normal l-esponiment tal-esofagu għall-aċidu b'mod dipendenti mad-doża f'pazjenti b'mard ta' rifluss gastro-esofagali. L-inibizzjoni ta' sekrezzjoni tal-aċidu huwa relatat mal-erja taħt il-kurva bejn il-konċentrazzjoni fil-plażma- ħin (AUC) ta' omeprazole u mhux mal-konċentrazzjoni fil-plażma infisha f'ħin partikolari.

L-ebda takifilassi ma ġiet osservata waqt kura b'omeprazole.

Effett fuq H. pylori

H. pylori hija assoċjata ma' mard ta' ulċera fl-istonku, li jinkludi mard ta' ulċera fid-duwodenu u fl-istonku. *H. pylori* hija fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite. *H. pylori* flimkien ma' aċidu fl-istonku huma fatturi ewlenin fl-iżvilupp ta' mard ta' ulċera fl-istonku. *H. pylori* huwa fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite atrofika li hija assoċjata ma' riskju akbar fl-iżvilupp ta' kanċer fl-istonku.

It-tneħħija għalkollox ta' *H. pylori* b'omeprazole u sustanzi kontra l-mikrobi hija assoċjata ma' rati għoljin ta' fejqan u l-għejbien fit-tul ta' mard ta' ulċeri fl-istonku.

Kuri b'żewġ mediċini ġew ittestjati u nstabu li kienu anqas effettivi minn kuri bi tlett mediċini. Madankollu huma jistgħu jiġu kkunsidrati f'każijiet fejn sensittività eċċessiva magħrufa ma tippermettix l-użu ta' taħlita ta' tliet mediċini.

Effetti oħrajn relatati mal-inibizzjoni tal-aċidu

Waqt kura fit-tul ċesti glandulari fl-istonku kienu rrapportati bi frekwenza x'aktarx oghla. Dawn il-bidliet huma konsegwenza fiżjoloġika ta' inibizzjoni qawwija tal-aċidu fl-istonku, huma beninni u jidher li huma reversibbli.

Tnaqqis fl-aċidità bi kwalunkwe mezz inkluz bl-inibituri tal-pompa tal-proton, iżid l-għadd ta' batteri li normalment jinsab fil-passaġġ gastro-intestinali. Kura b'mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku jista' jwassal għal riskju ftit akbar ta' infezzjonijiet gastro-intestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter*.

Użu pedjatriku

Fi studju mhux kontrollat fi tfal (1 sa 16-il sena) b'rifluss esofagali sever, omeprazole b'doži minn 0.7 sa 1.4 mg/kg tejjeb il-livell ta' esofagite f'90 % tal-kazijiet u naqqas b'mod sinifikanti s-sintomi tar-rifluss. Fi studju *single-blind*, tfal minn 0-24 xahar b'mard ta' rifluss gastroesofagali li kien dijanjostikat b'mod kliniku kienu ikkurati b'0.5, 1.0 jew 1.5 mg omeprazole/kg. Il-frekwenza ta' rimettar/episodji ta' rigurgitar naqqsu b'50% wara 8 ġimghat irrispettivament mid-doża.

Tnehhija għalkollox ta' H. pylori fit-tfal:

Studju kliniku randomised, double blind (studju Hélot) ikkonkluda li omeprazole flimkien ma' żewġ antibjotiċi (amoxicillin u clarithromycin), kien sigur u effettiv fil-kura ta' infezzjoni b'*H. pylori* fi tfal minn 4 snin 'l fuq b'gastrite: Rata ta' tnehhija ta' *H. pylori*: 74.2% (23/31 pazjent) b'omeprazole + amoxicillin + clarithromycin kontra 9.4% (3/32 pazjent) b'amoxicillin + clarithromycin. Madankollu, ma kienx hemm evidenza ta' xi benefiċċju kliniku rigward is-sintomi ta' indigestjoni. Dan l-istudju ma jagħti l-ebda tagħrif dwar tfal taħt 4 snin.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Omeprazole u omeprazole magnesium jtkissru fl-aċidu u għalhekk jingħataw b'mod orali bħala granuli b'kisja enterika f'kapsuli jew pilloli. L-assorbiment ta' omeprazole isehh malajr, bl-ogħla livelli fil-plażma isehhu madwar siegħa-sagħtejn wara d-doża. L-assorbiment ta' omeprazole isehh fl-musrana ż-żgħira u normalment jintemm fi żmien 3-6 sigħat. It-tehid tal-ikel miegħu m'għandu l-ebda effett fuq il-bijodisponibilità. Id-disponibilità sistemika (bijodisponibilità) ta' omeprazole minn doża waħda orali ta' omeprazole hija madwar 40%. Wara doži ripetuti mogħtija darba kuljum, il-bijodisponibilità tiżdied għal madwar 60%.

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni apparenti f'individwi b'saħħithom huwa madwar 0.3 l/kg piż tal-ġisem. Omeprazole huwa 97% imwahaħhal mal-proteina fil-plażma.

Metaboliżmu

Omeprazole jiġi metabolizzat għal kolli bis-sistema cytochrome P450 (CYP). Il-parti l-kbira tal-metaboliżmu tiegħu jiddependi fuq CYP2C19 li jiġi espress b'mod polimorfiku, responsabbli għall-formazzjoni ta' hydroxyomeprazole, il-metabolu ewlieni fil-plażma. Il-parti li jibqa' tiddependi fuq iżoforma oħra speċifika, CYP3A4, responsabbli għall-formazzjoni ta' omeprazole sulphone. B'konsegwenza ta' l-affinità għolja ta' omeprazole għal CYP2C19, jista' jkun hemm inibizzjoni kompetittiva u interazzjonijiet metaboliċi bejn il-mediċini ma' sottostrati oħra ta' CYP2C19. Madankollu, minhabba affinità baxxa għal CYP3A4, omeprazole ma jistax jinibixxi l-metaboliżmu ta' sottostrati oħra ta' CYP3A4. Flimkien ma' dan, omeprazole m'għandux effett inibitorju fuq l-enzimi prinċipali CYP.

Madwar 3% tal-popolazzjoni Kawkaża u 15-20% tal-popolazzjonijiet Ażjatiċi m'għandhomx enzima CYP2C19 li taħdem u jissejhu metabolizzaturi dgħajfin. F'individwi bħal dawn il-metaboliżmu ta' omeprazole x'aktarx jiġi katalizzat b'CYP3A4. Waqt li jingħata 20 mg omeprazole darba kuljum b'mod ripetut, l-AUC medja kienet minn 5 sa 10 darbiet oghla f'metabolizzaturi dgħajfin meta mqabbla ma' individwi li għandhom l-enzima CYP2C19 li taħdem (metabolizzaturi estensivi). Il-medja tal-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu wkoll oghla, bi 3 sa 5 darbiet. Dawn is-sejbiet m'għandhomx effett fuq il-pożoloġija ta' omeprazole.

Tnehhija

Il-half life ta' l-eliminazzjoni mill-plażma ta' omeprazole is-soltu tkun iqsar minn siegħa kemm għal doża waħda kif ukoll għal doži ripetuti mogħtija darba kuljum. Omeprazole jitneħħa għal kolli mill-plażma bejn id-doži u m'għandu l-ebda tendenza li jakkumula meta jingħata darba kuljum. Kważi 80% ta' doża orali ta' omeprazole titneħħa bħala metaboli fl-awrina, il-bqija fl-ippurgar, l-aktar li jkun ġej mis-sekrezzjoni tal-bila.

L-AUC ta' omeprazole tiżdied meta jingħata b'mod ripetut. Din iż-żieda tiddependi mid-doża u twassal għal relazzjoni bejn id-doża-AUC mhux lineari wara li jingħata b'mod ripetut. Din id-

dipendenza mal-hin u mad-doża ssehh minhabba li l-metabolizmu first-pass u t-tnehhija sistemika jonqsu probabbli minhabba inibizzjoni tal-enzima CYP2C19 minn omeprazole u/jew il-metaboli tieghu (eż is-sulphone).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Il-metabolizmu ta' omeprazole f'pazjenti b'funzjoni hażina tal-fwied ikun imxekkel, u dan iwassal għal zieda fl-AUC. Omeprazole ma wera l-ebda tendenza li jakkumula b'dożi mogħtija darba kuljum.

Indeboliment fil-funzjoni tal-kilwa

Il-farmakokinetika ta' omeprazole, inkluż bijodisponibilità sistemika u rata ta' eliminazzjoni, ma jinbidlux f'pazjenti b'funzjoni renali mnaqqsa.

Anzjani

Ir-rata ta' metabolizmu ta' omeprazole hija xi ftit jew wisq imnaqqsa f'individwi anzjani (età minn 75-79 sena).

Pazjenti pedjatriċi

Waq t kura bid-dożi rakkomandati mogħtija lil tfal minn sena, konċentrazzjonijiet fil-plażma simili inkisbu meta mqabbla ma' adulti. Fi tfal taħt is-6 xhur, it-tnehhija ta' omeprazole tkun baxxa minhabba l-hila dgħajfa biex ikun metabolizzat omeprazole.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Iperplażja taċ-ċelluli-ECL fl-istonku u karċinojdi, dehru fi studji għal tul ta' haġja fil-firien ikkurati b'omeprazole. Dawn il-bidliet isehhu minhabba ipergastrinemija għal tul ta' żmien minhabba l-inibizzjoni tal-acidu. Sejbiet simili saru wara kura b'antagonisti tar-riċettur- H_2 , inibituri tal-pompa tal-proton u wara fundektomija parzjali. Għalhekk, dawn il-bidliet mhux gejjin minn effett dirett ta' xi susanza attiva partikolari.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Disodium hydrogen phosphate dihydrate,
hydroxypropylcellulose,
hydroxypropyl methylcellulose,
lactose anhydrous,
magnesium stearate,
mannitol,
methacrylic acid co-polymer,
microcrystalline cellulose,
macrogol (polyethylene glycol),
sodium lauryl sulphate,
iron oxide (E172),
titanium dioxide (E171),
gelatina,
linka ta' l-istampar (li fiha shellac, ammonium hydroxide, potassium hydroxide u iron oxide iswed)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jghoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C

Flixxun: Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa' mill-umdità.

Folja: Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Flixxun HDPE b'tapp b'kamin li jagħlaq sew tal-polypropylene li jkollu kapsula li tnixxef.

10 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula.

20 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60, 100 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula.

40 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 60 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula.

Folja tal-aluminju.

10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 35, 50, 56, 84 kapsula.

20 mg 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60, 84 kapsula.

40 mg 7, 14, 15, 28, 30 kapsula.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema <u għal immaniġġar ieħor>

L-ebda htigijiet speċjali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta': {isem ta' MS/Aġenzija}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg pilloli gastroreżistenti

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10 mg: Kull pillola gastroreżistenti fiha 10.3 mg omeprazole magnesium ekwivalenti għal 10 mg omeprazole.

20 mg: Kull pillola gastroreżistenti fiha 20.6 mg omeprazole magnesium ekwivalenti għal 20 mg omeprazole.

40 mg: Kull pillola gastroreżistenti fiha 41.3 mg omeprazole magnesium ekwivalenti għal 40 mg omeprazole.

Sustanza mhux attiva:

10 mg: Kull pillola gastro-reżistenti fiha 19–20 mg sucrose.

20 mg: Kull pillola gastro-reżistenti fiha 19–20 mg sucrose.

40 mg: Kull pillola gastro-reżistenti fiha 39–41 mg sucrose

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola gastroreżistenti.

Losec 10 mg pilloli gastroreżistenti: pilloli roża ċari, oblongi, konvessi fuq iż-żewġ naħat, miksijin b'rita imnaqqxin b'  jew  fuq naħa waħda u b'10 mg fuq in-naħa l-oħra li fihom pritikuni b'kisja enterika.

Losec 20 mg pilloli gastroreżistenti: pilloli roża, oblongi, konvessi fuq iż-żewġ naħat, miksijin b'rita, imnaqqxin b'  jew  fuq naħa waħda u b'20 mg fuq in-naħa l-oħra li fihom pritikuni b'kisja enterika.

Losec 40 mg pilloli gastroreżistenti: pilloli ħomor skuri fil-kannella, oblongi, konvessi fuq iż-żewġ naħat, miksijin b'rita, imnaqqxin b'  jew  fuq naħa waħda u b'40 mg fuq in-naħa l-oħra li fihom pritikuni b'kisja enterika.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-pilloli gastroreżistenti Losec huma indikati:

Adulti

- Għall-kura ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-kura ta' ulċera tal-istonku
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tal-istonku

- Flimkien ma' antibiotiċi xierqa, għat-tnehhija għalkollox ta' *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) f'mard ta' ulċera peptika
- Għall-kura ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID
- Għall-prevenzjoni ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li huma f'riskju
- Għall-kura ta' esofaġite tar-rifluss
- Għall-immaniġġjar fit-tul ta' pazjenti b'esofaġite tar-rifluss mfejqa
- Għall-kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi
- Għall-kura tas-sindrome Zollinger-Ellison

Użu pedjatriku

Tfal 'l fuq minn sena u ≥ 10 kg

- Kura ta' esofaġite tar-rifluss
- Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u ta' meta jerga' jitla' l-aċidu mill-istonku f'mard ta' rifluss gastro-esofagali.

Tfal u adolexxenti 'l fuq minn 4 snin

- Flimkien ma' antibijotiċi fil-kura ta' ulċera tad-duwodenu ikkawżata minn *H. pylori*

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija fl-adulti

Kura ta' ulċeri tad-duwodenu

Id-doża rrakkomandata f'pazjenti b'ulċera attiva tad-duwodenu hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejqa isehh fi żmien ġimagħtejn. Għal dawg il-pazjenti li ma jkunux fiequ għal kollox wara l-ewwel kors, il-fejqa isehh waqt il-perjodu ta' kura għal ġimagħtejn ohra. F'pazjenti b'ulċera tad-duwodenu li jkollhom rispons dgħajjed Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejqa is-soltu jinkiseb fi żmien erba' ġimgħat.

Prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu

Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċera tad-duwodenu f'pazjenti negattivi għal *H. pylori* jew meta t-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* mhijiex possibbli, id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. F'xi pazjenti doża ta' 10 mg kuljum tista' tkun biżżejjed. F'każ ta' falliment tal-kura, id-doża tista' tiżdied għal 40 mg.

Kura ta' ulċeri gastrici

Id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejqa isehh fi żmien erba' ġimgħat. Għal dawg il-pazjenti li jista' jkun li ma jkunux fiequ għal kollox wara l-ewwel kors, il-fejqa s-soltu jsehħ waqt il-perjodu ta' kura għal erba' ġimgħat ohra. F'pazjenti b'ulċera gastrika li jkollhom rispons dgħajjed Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejqa is-soltu jinkiseb fi żmien tmien ġimgħat.

Prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri gastrici

Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċera gastrika f'pazjenti b'rispons dgħajjed id-doża rrakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Jekk ikun hemm bżonn id-doża tista' tiżdied għal Losec 40 mg darba kuljum.

*It-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* f'mard ta' ulċera peptika*

Għat-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* l-għażla ta' antibijotiċi għandha tqis it-tolleranza individwali tal-pazjent għal mediċina, u għandha ssir skont il-modi tar-reżistenza nazzjonali, reġjonali u lokali u l-linji gwida tal-kura.

- Losec 20 mg + clarithromycin 500 mg + amoxicillin 1,000 mg, kull waħda minnhom darbtejn kuljum għal ġimgħa, jew

- Losec 20 mg + clarithromycin 250 mg (jew inkella 500 mg) + metronidazole 400 mg (jew 500 mg jew tinidazole 500 mg), kull waħda minnhom darbtejn kuljum għal ġimgha, jew
- Losec 40 mg darba kuljum ma' amoxicillin 500 mg u metronidazole 400 mg (jew 500 mg jew tinidazole 500 mg), it-tnejn li huma tliet darbiet kuljum għal ġimgha.

F'kull kors, jekk il-pazjent ikun għadu pozittiv għall-*H. pylori*, it-terapija tista' terġa tinghata.

Ulċeri gastrici u fid-duwodenu assoċjati ma' kura b'NSAID

Għall-kura ta' ulċeri gastrici u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID, id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejqa isehh fi żmien erba' ġimghat. Għal daww il-pazjenti li ma jkunux fiequ għalkollox wara l-ewwel kors, il-fejqa generalment isehh waqt il-perjodu ta' kura għal erba' ġimghat oħra.

Għall-prevenzjoni ta' ulċeri gastrici u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li jkollhom riskju
Għall-prevenzjoni ta' ulċeri gastrici u fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li jkollhom riskju (età > 60, passat ta' ulċeri gastrici jew fid-duwodenu, passat ta' fsada GI mill-parti ta' fuq) id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum.

Kura ta' esofagite tar-rifluss

Id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg darba kuljum. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti l-fejqa isehh fi żmien erba' ġimghat. Għal daww il-pazjenti li ma jkunux fiequ għalkollox wara l-ewwel kors, il-fejqa is-soltu isehh waqt il-perjodu kura għal 4 ġimghat oħra.

F'pazjenti b'esofagite severa Losec 40 mg darba kuljum huwa rakkomandat u l-fejqa is-soltu jinkiseb fi żmien tmien ġimghat.

Treġġija fit-tul ta' pazjenti li jkunu fiequ minn esofagite tar-rifluss

Għall-Treġġija fit-tul ta' pazjenti li jkunu fiequ minn esofagite tar-rifluss id-doża rakkomandata hija Losec 10 mg darba kuljum. Jekk ikun hemm bżonn, id-doża tista' tiżdied għal Losec 20-40 mg darba kuljum.

Kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi

Id-doża rakkomandata hija Losec 20 mg kuljum. Il-pazjenti jistgħu jkollhom rispons xieraq b'10 mg kuljum, u għalhekk għandu jiġi kkunsidrat it-tidil tad-doża fuq bażi individwali.

Jekk il-kontroll tas-sintomi jkun għadu ma nkisibx fi żmien 4 ġimghat ta' kura b'Losec 20 mg kuljum, huwa rakkomandat li jsiru aktar investigazzjonijiet.

Kura tas-sindrome Zollinger-Ellison

F'pazjenti bis-sindrome Zollinger-Ellison id-doża għandha tiġi aġġustata b'mod individwali u l-kura għandha titkompla sakemm ikun indikat b'mod kliniku. Id-doża tal-bidu rakkomandata hija Losec 60 mg kuljum. Il-pazjenti kollha b'mard sever u li ma kellhomx rispons xieraq għal terapija oħrajn kienu kontrollati b'mod effettiv u aktar minn 90% tal-pazjenti mmannta fuq dożi ta' Losec 20-120 mg kuljum. Meta d-doża taqbeż Losec 80 mg kuljum, id-doża għandha tinqasam u tinghata darbtejn kuljum.

Požoloġija fit-tfal

Tfal 'l fuq minn sena u ≥ 10 kg

Kura ta' esofagite tar-rifluss

Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu mill-istonku f'mard tar-rifluss gastro-esofagali

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-pożoloġija huma kif ġej:

Età	Piż	Požoloġija
età ≥ sena	10-20 kg	10 mg darba kuljum. Id-doża tista' tiżdied għal 20 mg darba kuljum jekk ikun hemm bżonn.
età ≥ sentejn	> 20 kg	20 mg darba kuljum. Id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum jekk ikun hemm bżonn.

Esofagite tar-rifluss: Iż-żmien ta' kura huwa 4-8 ġimghat.

Kura tas-sintomi ta' hruq ta' stonku u rigurgitazzjoni tal-aċidu mill-istonku f'mard ta' rifluss gastroesofagali: Iż-żmien ta' kura huwa 2-4 ġimghat. Jekk il-kontroll tas-sintomi jkun għadu ma nkisibx wara 2-4 ġimghat il-pazjent għandu jiġi eżaminat aktar.

Tfal u adoloxxenti li għandhom 'l fuq minn erba' snin

Kura ta' ulċera fid-duwodenu kkawżata minn H. pylori

Meta tkun qed tintgħażel it-terapija kombinata xierqa, għandhom jitqiesu l-linji gwida nazzjonali reġjonali u lokali dwar ir-reżistenza tal-batteri, tul ta' żmien tal-kura (l-aktar komuni 7 ijiem iżda xi kultant sa 14-il jum), u l-użu xieraq ta' sustanzi kontra l-batteri.

Irid ikun hemm superviżjoni tal-kura minn speċjalista.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-pożoloġija huma kif ġej:

Piż	Pożoloġija
15–30 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 10 mg, amoxicillin 25 mg/kg piż tal-ġisem u clarithromycin 7.5 mg/kg piż tal-ġisem jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgha.
31–40 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 20 mg, amoxicillin 750 mg u clarithromycin 7.5 mg/kg piż tal-ġisem jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgha.
>40 kg	Taħlita b'żewġ antibijotiċi: Losec 20 mg, amoxicillin 1 g u clarithromycin 500 mg jingħataw kollha flimkien darbtejn kuljum għal ġimgha.

Popolazzjonijiet speċjali

Funzjoni renali indebolita

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f'pazjenti b'funzjoni renali indebolita (ara sezzjoni 5.2).

Funzjoni epatika indebolita

F'pazjenti b'funzjoni epatika indebolita doża ta' 10-20 mg kuljum tista' tkun biżżejjed (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani(>65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta' kif jingħata

Huwa rrakkomandat li tiegħu l-pilloli Losec filgħodu u tiblagħhom shaħ ma nofs tazza ilma. Il-pilloli m'għandhomx jintmagħdu jew jitfarrku.

Għall-pazjenti li ma jistgħux jibilgħu u għal tfal li jistgħu jixorbu jew jibilgħu ikel artab

Il-pazjenti jistgħu jaqsmu l-pillola u jferrxuha f'mgħarfa ilma mhux bil-gass u jekk huma jixtiequ, jhalltuha ma' xi meraq tal-frott jew pure tat-tuffieħ. Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija li t-taħlita għandha tittiehed mill-ewwel (jew fi żmien 30 minuta) u dejjem għandha titthawwad qabel tinxtorob u warajha għandha terġa' tinxtorob nofs tazza ilma. **TUŻAX** halib jew ilma bil-gass. Il-pritkuni b'kisja enterika m'għandhomx jintmagħdu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal omeprazole, għal benzimidazoles sostitwiti jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Bħal inibituri tal-pompa tal-proton ohrajn omeprazole m'għandux jintuza flimkien ma' nelfinavir (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Malli jkun hemm xi sintomu li jkanqal suspett (eż telf tal-piż sinifikanti mingħajr intenzjoni, rimettar ta' spiss, uġiġh biex tibla', rimettar ta' demm jew melenja) u meta jkun hemm suspett jew ikun magħruf li hemm ulċera fl-istonku, mard malinn għandu jiġi eskluż, minhabba li l-kura tista' sserrah is-sintomi u tittardja d-dijanjożi.

L-għoti flimkien ta' atazanavir u inibituri tal-pompa tal-proton mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5). Jekk ikunhemm opinjoni li t-tahlita ta' atazanavir u impeditur tal-pompa tal-proton ma tistax tiġi evitata, sorveljanza klinika mill-qrib (eż. tagħbija tal-virus) hija rrakkomandata flimkien ma' zieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma' 100 mg ta' ritonavir; id-doża ta' omeprazole 20 mg m'għandiex tinqabeż.

Omeprazole bħal kull mediċina oħra li timblokka l-aċidu, jista' jnaqqas l-assorbiment tal-vitamina B₁₂ (cyanocobalamin) minhabba li jew ikun kemm livell imnaqqas hafna ta' aċidu fl-istonku jew ma jkun hemm l-ebda aċidu fl-istonku. Dan għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti bi tnaqqis fil-hażna li jkollhom f'għisimhom jew fatturi ta' riskju għal tnaqqis fl-assorbiment ta' vitamina B₁₂ u li qegħdin fuq terapija fit-tul.

Omeprazole huwa impeditur ta' CYP2C19. Meta tibda jew tispiċċa kura b'omeprazole, il-possibbiltà ta' interazzjonijiet b'mediċini mmetabolizzati permezz ta' CYP2C19 għandu jiġi kkunsidrat. Interazzjoni hija osservata bejn clopidogrel u omeprazole (ara sezzjoni 4.5). Ir-rilevanza klinika ta' din l-interazzjoni mhijiex ċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole u clopidogrel għandu jiġi skoraggut.

Xi tfal b'mard kroniku jistgħu jehtieġu kura fuq perjodu twil għalkemm dan mhux irrakkomandat.

Il-pilloli gastrozistenti Losec fihom is-sucrose. Pazjenti bi problemi eriditarji rari ta' intolleranza għal fructose, malassorbiment tal-glucose-galactose jew insuffiċjenza ta' sucrase-isomaltase m'għandhomx jiehdu din il-mediċina.

Kura b'inibituri tal-pompa tal-proton tista' twassal għal kemxejn zieda fir-riskju ta' infezzjonijiet gastrointestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter* (ara sezzjoni 5.1).

Bħal kull kura oħra għal tul ta' żmien, speċjalment meta jinqabeż perjodu ta' sena ta' kura, il-pazjenti għadhom jinżammu taħt sorveljanza regolari.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta' omeprazole fuq il-farmakokinetika ta' sustanzi attivi oħra

Sustanzi attivi b'assorbiment dipendenti fuq il-pH

It-tnaqqis fl-aċidità ġol-istonku waqt kura b'omeprazole tista' żżid jew tnaqqas l-assorbiment ta' sustanzi attivi b'assorbiment mill-istonku li jiddependi fuq il-pH.

Nelfinavir, atazanavir

Il-livelli ta' nelfinavir u atazanavir fil-plasma jonqsu f'każ ta' għoti flimkien ma' omeprazole.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u nelfinavir huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) naqqas l-esponiment medju għal nelfinavir b'madwar 40% u l-esponiment medju tal-meabolit attiv b'mod farmakoloġiku M8 tnaqqas b'madwar 75-90%. L-interazzjoni tista' tinvolvi wkoll l-inibizzjoni ta' CYP2C19 inhibition.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u atazanavir mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) u atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera

b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' 75% mill-esponiment ta' atazanavir. Iż-żieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma kkompensatx għall-impatt ta' omeprazole fuq l-esponiment ta' atazanavir. L-ghoti flimkien ta' omeprazole (20 mg darba kuljum) ma' atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' madwar 30% fl-esponiment atazanavir meta mqabbel ma' atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg darba kuljum.

Digoxin

Kura b'omeprazole (20 mg kuljum) flimkien ma' digoxin f'individwi b'saħħithom zied il-bijodisponibilità ta' digoxin b'10%. Tossicità b'digoxin kienet irrappurtata b'mod rari. Madankollu għandha tintuża l-kawtela meta omeprazole jingħata f'doži għoljin lill-pazjenti anzjani. Is-sorveljanza terapewtika tal-medicina għal digoxin għandha imbagħad tissaħħa.

Clopidogrel

Fi studju kliniku crossover, clopidogrel (doża kbira fil-bidu ta' 300 mg segwita minn 75 mg/kuljum) wahdu u ma' omeprazole (80 mg fl-istess hin ma' clopidogrel) ingħataw għal 5 ijiem. L-esponiment għall-metaboliti attivi ta' clopidogrel tnaqqas b'46% (Jum 1) u b'42% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta' tagħqid ta' plejtlits (IPA) tnaqqset b'47% (24 siegħa) u bi 30% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. Fi studju ieħor intwera li l-ghoti ta' clopidogrel u omeprazole f'hinijiet differenti ma' żammx l-interazzjoni, li x'aktarx tigri minhabba l-effett inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19, milli ssehh. Id-dejta inkonsistenti fuq l-implikazzjonijiet kliniċi ta' din l-interazzjoni PK/PD f'dawk li huma każijiet kardjovaskulari serji kienet rrappurtata minn studji ta' osservazzjoni u kliniċi.

Sustanzi attivi oħra

L-assorbiment ta' posaconazole, erlotinib, ketoconazol u itraconazol jitnaqqas b'mod sinifikanti u b'hekk l-effikaċja klinika tista' tiddgħajjef. Għal posaconazol u erlotinib l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat.

Sustanzi attivi mmetabolizzati minn CYP2C19

Omeprazole huwa inibitur moderat ta' CYP2C19, l-enzima prinċipali li timmetabloizza omeprazole. B'dan il-mod, il-metaboliżmu ta' sustanzi attivi mogħtija flimkien miegħu li huma wkoll immetabolizzati minn CYP2C19, jista' jonqos u l-esponiment sistemiku għal dawn is-sustanzi jiżdied. Eżempji ta' medicini bħal dawn huma R-warfarin u antagonisti oħra tal-vitamina K, cilostazol, diazepam u phenytoin.

Cilostazol

Omeprazole, mogħti f'doži ta' 40 mg lill-individwi b'saħħithom fi studju inkroċjat, zied is- C_{max} u l-AUC għal cilostazol bi 18% u 26% rispettivament, u wiehed mill-metaboliti attivi tiegħu b'29% u 69% rispettivament.

Phenytoin

Is-sorveljanza tal-konċentrazzjonijiet ta' phenytoin fil-plasma huwa rrakkomandat waqt l-ewwel ġimagħtejn wara minn meta tinbeda kura b'omeprazole u, jekk isir aġġustament fid-doża ta' phenytoin, sorveljanza u aktar aġġustamenti fid-doża għandhom isiru mal-waqfa mill-kura b'omeprazole.

Mekkaniżmu mhux magħruf

Saquinavir

L-ghoti flimkien ta' omeprazole u saquinavir/ritonavir wassal għal zidiet fil-livelli tal-plażma sa madwar 70% għal saquinavir li kienu assoċjati ma' tollerabilità tajba f'pazjenti infettati bl-HIV.

Tacrolimus

L-ghoti flimkien ma' omeprazole ġie rrappurtat li jżid il-livelli ta' tacrolimus fis-serum. Għandhom isiru sorveljanzi msahha tal-konċentrazzjonijiet ta' tacrolimus kif ukoll tal-funzjoni tal-kliwi (tnehhija tal-kreatinina), u d-doża ta' tacrolimus għandha tiġi aġġustata jekk ikun meħtieġ.

L-effetti ta' sustanzi attivi ohra fuq il-farmakokinetika ta' omeprazole

Inibituri ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Minhabba li omeprazole huwa metabolizzat permezz ta' CYP2C19 u CYP3A4, sustanzi attivi li huma magħrufa li jinibixxu CYP2C19 jew CYP3A4 (bħal clarithromycin u voriconazole) jistgħu jwasslu għal zieda fil-livelli ta' omeprazole fis-serum billi jnaqqsu r-rata ta' metabolizmu ta' omeprazole. Il-kura b'voriconazole fl-istess ħin wasslet għall-esponiment ta' omeprazole ta' aktar mid-doppju. Minhabba li doži għoljin ta' omeprazole kienu tollerati sew, tibdil fid-doża ta' omeprazole ġeneralment ma tkunx meħtieġa. Madankollu, aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'indeboliment qawwi tal-fwied u jekk tkun indikata kura għal żmien twil.

Indutturi ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Sustanzi attivi li huma magħrufa li jinduċu CYP2C19 jew CYP3A4 jew it-tnejn li huma (bħal rifampicin u St John's wort) jistgħu jwasslu għal livelli mnaqqsa ta' omeprazole fis-serum billi jżidu r-rata tal-metabolizmu ta' omeprazole.

4.6 Tqala u treddigh

Ir-riżultati minn tlett studji prospettivi epidemjoloġiċi (aktar minn 1000 riżultat ta' esponiment) ma jindikaw l-ebda effetti avversi ta' omeprazole fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija li tkun għada kif twieldet. Omeprazole jista' jintuża waqt it-tqala.

Omeprazole johroġ mal-ħalib tas-sider iżda mhux probabbli li jkollu effett fuq it-tarbija meta jingħataw doži terapewtiċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Losec mhux probabbli li jeffettwa il-hila biex issuq u thaddem magni. Reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jseħħu (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjenti jiġu affettwati huma m'għandhomx isuq jew ihaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar effetti sekondarji komuni (minn 1-10% tal-pazjenti) huma uġigh ta' ras, uġigh addominali, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku u tqalligh/rimettar.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina li ġejjin kienu identifikati jew suspettati fil-programm ta' provi kliniċi għal omeprazole u wara li tqiegħed fis-suq. L-ebda minnhom ma nstabu li kienu relatati mad-doża. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond il-frekwenza u l-Klassi tas-Sistemi u tal-Organi (SOC). Il-kategoriji ta' frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni (ħafna ($\geq 1/10$), Komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), Mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), Rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), Rari ħafna ($< 1/10,000$), Mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data diaponibbli).

SOC/frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika	
Rari:	Lewkopenija, tromboċitopenija
Rari ħafna:	Agranuloċitosi, panċitopenija
Disturbi fis-sistema immuni	
Rari:	Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva eż. deni, anġjoedima u xokk/reazzjoni anafilattiku/a
Disturbi fil-metabolizmu u n-nutrizzjoni	
Rari:	Iponatrimija
Rari ħafna	Ipomagnesimja
Disturbi psikjatriċi	
Mhux komuni:	Insomnija
Rari:	Aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni

Rari hafna:	Aggressjoni, allucinazzjonijiet
Disturbi fis-sistema nervuża	
Komuni:	Ugħigh ta' ras
Mhux komuni:	Sturdament, parestesija, hedla tan-nghas
Rari:	Disturb fit-togħma
Disturbi fl-ghajnejn	
Rari:	Vista mċajpra
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika	
Mhux komuni:	Vertiġini
Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali	
Rari:	Bronkospazmu
Disturbi gastro-intestinali	
Komuni:	Ugħigh addominali, stitikezza, dijarea, gass, tqalligh/rimettar
Rari:	Halq xott, stomatite, kandidjasi gastrointestinali
Disturbi fil-fwied u fil-marrara	
Mhux komuni:	Żieda fl-enzimi tal-fwied
Rari:	Epatite bis-suffejra jew mingħajrha
Rari hafna:	Falliment epatiku, encefalopatija f'pazjenti b'mard tal-fwied diġà eżistenti
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda	
Mhux komuni:	Deramtite, ħakk, raxx, urtikarja
Rari:	Alopeċja, fotosensittività
Rari hafna:	Eritema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolisi epidermali tossika (TEN)
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi	
Rari:	Artralġja, mijalġja
Rari hafna:	Dghufija fil-muskoli
Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja	
Rari:	Nefrite tal-interstizju
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider	
Rari hafna:	Ġinekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata	
Mhux komuni:	Telqa tal-ġisem, edima periferali
Rari:	Żieda fil-hruġ tal-ġharaq

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà ta' omeprazole kienet evalwata f'totali ta' 310 tifel u tifla ta' età minn 0 sa 16-il sena b'mard relatat mal-aċidu. Hemm dejta limitata dwar l-użu fit-tul minn 46 tifel u tifla li rċievew terapija ta' manteniment b'omeprazole waqt studju kliniku għal esofaġite erożiva severa sa mhux aktar minn 749 jum. Il-profil ta' effetti avversi kien b'mod ġenerali l-istess bħal dak għall-adulti kemm għall-kura li ma ddumx kif ukoll għall-użu fit-tul. M'hemmx dejta dwar l-effetti bl-użu fit-tul tal-kura b'omeprazole fuq il-pubertà u l-kobor.

4.9 Doża eċċessiva

Hemm informazzjoni limitata dwar l-effetti ta' dozi eċċessivi ta' omeprazole fil-bnedmin. Fil-letteratura medika, dozi sa 560 mg ġew deskritti, u nkisbu rapporti rari meta dozi waħdiet mill-halq laħqu sa 2,400 mg omeprazole (120 darba d-doża klinika li soltu tkun rrakkomandata). Tqalligh, rimettar, sturdament, ugħigh fl-addome, dijarea u ugħigh ta' ras kienu rrapportati. Ukoll apatija, depressjoni u konfużjoni kienu deskritti f'kazijiet waħdiet.

Is-sintomi deskritti b'konnessjoni ma' doża eċċessiva ta' omeprazole kienu mumentanji, u l-ebda effett serju ma kien irrappurtat. Ir-rata ta' eliminazzjoni ma nbidlitx (kinetika *first order*) b'dozi aktar għoljin. Kura, jekk meħtieġa, hija kura tas-sintomi.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibitur tal-Pompa tal-Proton, Kodiċi ATC: A02BC01

Kif jaħdem

Omeprazole, taħlita ta' numru ugwali ta' żewġ enantiomeri li jiduru lejn il-lemin u lejn ix-xellug inaqas is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku permezz ta' mekkaniżmu speċifiku ħafna. Huwa inibitur speċifiku tal-pompa tal-aċidu fiċ-ċellola parjetali. Jaħdem malajr ħafna u jipprovdi kontroll permezz ta' inibizzjoni reversibbli tal-aċidu fl-istonku b'doża mogħtija darba kuljum.

Omeprazole huwa bażi dgħajef u jiġi kkonċentrat u mibdul fil-forma attiva fl-ambjent aċiduż ħafna tal-kanalikuli fiċ-ċelluli ta' goċ-ċelluli parjetali, fejn jinibixxi l-enzima $H^+ K^+$ -ATPase - il-pompa tal-aċidu. Dan l-effett fuq l-aħħar pass tal-proċess ta' kif jiġi forma l-aċidu fl-istonku jiddependi mid-doża u jipprovdi inibizzjoni effettiva ħafna kemm tas-sekrezzjoni tal-aċidu bażali kif ukoll s-sekrezzjoni ta' l-aċidu stimulata, irrispettivament mill-istimolu.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti farmakodinamiċi kollha li deheru jistgħu jiġu spjegati bl-effett ta' omeprazole fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu.

Effett fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku

Għoti ta' dozi ta' omeprazole orali darba kuljum jipprovdi inibizzjoni malajr u effettiva tas-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku waqt il-jum u bil-lejl b'effett massimu jinkiseb fi żmien 4 ijiem ta' kura. B'omeprazole 20 mg, tnaqqis medju ta' mill-anqas 80% tal-aċidità fl-istonku fuq perjodu ta' 24-siegħa imbagħad jinżamm f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu, bi tnaqqis medju fl-ogħla punt fejn johroġ l-aċidu wara stimolazzjoni ta' pentagastrin ikun madwar 70% 24 siegħa wara li tingħata d-doża.

Għoti ta' dozi ta' omeprazole 20 mg jżomm pH fl-istonku ta' ≥ 3 għal medja ta' 17-il siegħa mill-perjodu ta' 24-siegħa f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu.

B'konsegwenza tat-tnaqqis fis-sekrezzjoni tal-aċidu u tal-aċidità fl-istonku, omeprazole inaqas/iġib lura għan-normal l-esponiment tal-esofagu għall-aċidu b'mod dipendenti mad-doża f'pazjenti b'mard ta' rifluss gastro-esofagali. L-inibizzjoni ta' sekrezzi tal-aċidu huwa relatat mal-erja taħt il-kurva bejn il-konċentrazzjoni fil-plażma- hin (AUC) ta' omeprazole u mhux mal-konċentrazzjoni fil-plażma infisha f'hin partikolari.

L-ebda takifilassi ma ġiet osservata waqt kura b'omeprazole.

*Effett fuq *H. pylori**

H. pylori hija assoċjata ma' mard ta' ulċera fl-istonku, li jinkludi mard ta' ulċera fid-duwodenu u fl-istonku. *H. pylori* hija fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite. *H. pylori* flimkien ma' aċidu fl-istonku huma fatturi ewlenin fl-iżvilupp ta' mard ta' ulċera fl-istonku. *H. pylori* huwa fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite atrofika li hija assoċjata ma' riskju akbar fl-iżvilupp ta' kanċer fl-istonku.

It-tneħħija għalkollox ta' *H. pylori* b'omeprazole u sustanzi kontra l-mikrobi hija assoċjata ma' rati għoljin ta' fejqan u l-ghejbien fit-tul ta' mard ta' ulċeri fl-istonku.

Kuri b'żewġ mediċini ġew ittestjati u nstabu li kienu anqas effettivi minn kuri bi tlett mediċini. Madankollu huma jistgħu jiġu kkunsidrati f'każijiet fejn sensittività eċċessiva magħrufa ma tippermettix l-użu ta' taħlita ta' tliet mediċini.

Effetti oħrajn relatati mal-inibizzjoni tal-aċidu

Waqt kura fit-tul ċesti glandulari fl-istonku kienu rrapportati bi frekwenza x'aktarx oghla. Dawn il-bidliet huma konsegwenza fiżjoloġika ta' inibizzjoni qawwija tal-aċidu fl-istonku, huma beninni u jidher li huma reversibbli.

Tnaqqis fl-aċidità bi kwalunkwe mezz inkluz bl-inibituri tal-pompa tal-proton, iżid l-ghadd ta' batteri li normalment jinsab fil-passaġġ gastro-intestinali. Kura b'mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku jista' jwassal għal riskju ftit akbar ta' infezzjonijiet gastro-intestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter*.

Użu pedjatriku

Fi studju mhux kontrollat fi tfal (1 sa 16-il sena) b'rifluss esofagali sever, omeprazole b'dozi minn 0.7 sa 1.4 mg/kg tejjeb il-livell ta' esofagite f'90 % tal-każijiet u naqqas b'mod sinifikanti s-sintomi tar-rifluss. Fi studju *single-blind*, tfal minn 0-24 xahar b'mard ta' rifluss gastroesofagali li kien dijanjostikat b'mod kliniku kienu ikkurati b'0.5, 1.0 jew 1.5 mg omeprazole/kg. Il-frekwenza ta' rimettar/episodji ta' rigurgitar naqqsu b'50% wara 8 ġimghat irrispettivament mid-doża.

Tnehhija għalkollox ta' H. pylori fit-tfal:

Studju kliniku randomised, double blind (studju Hélot) ikkonkluda li omeprazole flimkien ma' żewġ antibjotiċi (amoxicillin u clarithromycin), kien sigur u effettiv fil-kura ta' infezzjoni b'*H. pylori* fi tfal minn 4 snin 'l fuq b'gastrite: Rata ta' tnehhija ta' *H. pylori*: 74.2% (23/31 pazjent) b'omeprazole + amoxicillin + clarithromycin kontra 9.4% (3/32 pazjent) b'amoxicillin + clarithromycin. Madankollu, ma kienx hemm evidenza ta' xi benefiċċju kliniku rigward is-sintomi ta' indigestjoni. Dan l-istudju ma jagħti l-ebda tagħrif dwar tfal taħt l-4 snin.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Omeprazole u omeprazole magnesium jtkissru fl-aċidu u għalhekk jingħataw b'mod orali bħala granuli b'kisja enterika f'kapsuli jew pilloli. L-assorbiment ta' omeprazole isehh malajr, bl-oghla livelli fil-plażma isehhu madwar siegħa-sagħtejn wara d-doża. L-assorbiment ta' omeprazole isehh fl-musrana ż-żgħira u normalment jintemm fi żmien 3-6 sigħat. It-teħid tal-ikel miegħu m'għandu l-ebda effett fuq il-bijodisponibilità. Id-disponibilità sistemika (bijodisponibilità) ta' omeprazole minn doża wahda orali ta' omeprazole hija madwar 40%. Wara dozi ripetuti mogħtija darba kuljum, il-bijodisponibilità tizdied għal madwar 60%.

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni apparenti f'individwi b'saħħithom huwa madwar 0.3 l/kg piż tal-ġisem. Omeprazole huwa 97% imwaħħal mal-proteina fil-plażma.

Il-bijoequivalenza bejn il-kapsuli Losec u l-pilloli gastroreżistenti Losec, ibbażata kemm fuq l-erja taħt il-kuva tal-konċentrazzjoni ta' omeprazole fil-plażma u l-hin (AUC) kif ukoll fuq l-oghla konċentrazzjoni ta' omeprazole fil-plażma (C_{max}), intweriet bid-dozi kollha, 10 mg, 20 mg u 40 mg.

Metaboliżmu

Omeprazole jiġi metabolizzat għal kolli bis-sistema cytochrome P450 (CYP). Il-parti l-kbira tal-metaboliżmu tiegħu jiddependi fuq CYP2C19 li jiġi espress b'mod polimorfiku, responsabbli għall-formazzjoni ta' hydroxyomeprazole, il-metabolu ewlieni fil-plażma. Il-parti li jibqa' tiddependi fuq iżoforma oħra speċifika, CYP3A4, responsabbli għall-formazzjoni ta' omeprazole sulphone. B'konsegwenza ta' l-affinità għolja ta' omeprazole għal CYP2C19, jista' jkun hemm inibizzjoni kompetittiva u interazzjonijiet metabolici bejn il-mediċini ma' sottostrati oħra ta' CYP2C19. Madankollu, minhabba affinità baxxa għal CYP3A4, omeprazole ma jistax jinibixxi l-metaboliżmu ta' sottostrati oħra ta' CYP3A4. Flimkien ma' dan, omeprazole m'għandux effett inibitorju fuq l-enzimi prinċipali CYP.

Madwar 3% tal-popolazzjoni Kawkaż u 15-20% tal-popolazzjonijiet Ażjatiċi m'għandhomx enzima CYP2C19 li taħdem u jissejhu metabolizzaturi dgħajfin. F'individwi bħal dawn il-metaboliżmu ta' omeprazole x'aktarx jiġi katalizzat b'CYP3A4. Waqt li jingħata 20 mg omeprazole darba kuljum b'mod ripetut, l-AUC medja kienet minn 5 sa 10 darbiet oghla f'metabolizzaturi dgħajfin meta mqabbla ma' individwi li għandhom l-enzima CYP2C19 li taħdem (metabolizzaturi estensivi). Il-medja tal-oghla konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu wkoll oghla, bi 3 sa 5 darbiet. Dawn is-sejbiet m'għandhomx effett fuq il-pożoloġija ta' omeprazole.

Tnehhija

Il-half life ta' l-eliminazzjoni mill-plażma ta' omeprazole is-soltu tkun iqsar minn siegħa kemm għal doża waħda kif ukoll għal doži ripetuti mogħtija darba kuljum. Omeprazole jitneħħa għal kollox mill-plażma bejn id-doži u m'għandu l-ebda tendenza li jakkumula meta jingħata darba kuljum. Kważi 80% ta' doża orali ta' omeprazole titneħħa bħala metaboli fl-awrina, il-bqija fl-ippurgar, l-aktar li jkun gēj mis-sekrezzjoni tal-bila.

L-AUC ta' omeprazole tiżdied meta jingħata b'mod ripetut. Din iż-żieda tiddependi mid-doża u twassal għal relazzjoni bejn id-doża-AUC mhux lineari wara li jingħata b'mod ripetut. Din id-dipendenza mal-hin u mad-doża sseħħ minhabba li l-metabolizmu first-pass u t-tneħħija sistemika jonqsu probabbli minhabba inibizzjoni tal-enzima CYP2C19 minn omeprazole u/jew il-metaboli tiegħu (eż is-sulphone).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Il-metabolizmu ta' omeprazole f'pazjenti b'funzjoni hażina tal-fwied ikun imxeġkel, u dan iwassal għal żieda fl-AUC. Omeprazole ma wer l-ebda tendenza li jakkumula b'doži mogħtija darba kuljum.

Indeboliment fil-funzjoni tal-kilwa

Il-farmakokinetika ta' omeprazole, inkluż bijodisponibilità sistemika u rata ta' eliminazzjoni, ma jinbidlux f'pazjenti b'funzjoni renali mnaqqsa.

Anzjani

Ir-rata ta' metabolizmu ta' omeprazole hija xi ftit jew wisq imnaqqsa f'individwi anzjani (età minn 75-79 sena).

Pazjenti pedjatriċi

Waqt kura bid-doži rakkomandati mogħtija lil tfal minn sena, konċentrazzjonijiet fil-plażma simili inkisbu meta mqabbla ma' adulti. Fi tfal taħt is-6 xhur, it-tneħħija ta' omeprazole tkun baxxa minhabba l-hila dgħajfa biex ikun metabolizzat omeprazole.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Iperplażja taċ-ċelluli-ECL fl-istonku u karċinojdi, dehru fi studji għal tul ta' hajja fil-firien ikkurati b'omeprazole. Dawn il-bidliet isehħu minhabba ipergastrinemija għal tul ta' żmien minhabba l-inibizzjoni tal-acidu. Sejbiet simili saru wara kura b'antagonisti tar-riċettur- H_2 , inibituri tal-pompa tal-proton u wara fundektomija parzjali. Għalhekk, dawn il-bidliet mhux gējjin minn effett dirett ta' xi susanza attiva partikolari.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Microcrystalline cellulose,
glyceryl monostearate,
hydroxypropylcellulose,
hydroxypropyl methylcellulose,
magnesium stearate,
methacrylic acid co-polymer,
sferi taz-zokkor,
paraffin,
macrogol (polyethylene glycol),
polysorbate,
polyvinylpyrrolidone crosslinked,

sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH),
sodium stearyl fumarate,
talc,
triethyl citrate,
iron oxide,
titanium dioxide

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Flixxun: Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa' mill-umdità.

Folja: Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Flixxun HDPE b'tapp b'kamin li jagħlaq sew tal-polypropylene li jkollu kapsula li tnixxef.

10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 100 pillola; pakkett għall-isptar ta' 140 pillola.

20 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 100 pillola; pakketti għall-isptar ta' 140, 200 jew 280 pillola.

40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 100 pillola.

Folja tal-aluminju.

10 mg: 5, 7, 10, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 pillola; pakkett għall-isptar ta' 560 tablets.

20 mg: 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 pillola; pakkett għall-isptar ta' 560 pillola.

40 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 100 pillola; pakkett għall-isptar ta' 560 pillola

Folja mtaqqba biex tinqata doża wahda (pakkett għall-isptar):

10 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1 pillola.

20 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 100 x 1 pillola.

40 mg: 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema <u għal immaniġġar ieħor>

L-ebda htigijiet speċjali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta': {isem ta' MS/Aġenzija}

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-infużjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih omeprazole sodium 42.6 mg ekwivalenti għal omeprazole 40 mg. Wara r-rikonstituzzjoni, 1 ml ikun fih omeprazole sodium 0.426 mg, ekwivalenti għal omeprazole 0.4 mg

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni (Trab għall-infużjoni)

L-intervall tal-pH fil-glucose huwa madwar 8.9 sa 9.5 u fis-sodium chloride 0.9%, 9.3-10.3

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Losec għal użu ġol-vini huwa indikat bħala alternattiva għal terapija orali għall-indikazzjonijiet li ġejjin:

Adulti

- Għall-kura ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-kura ta' ulċera tal-istonku
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tal-istonku
- Flimkien ma' antibiotiċi xierqa, għat-tnehhija għalkollox ta' *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) f'mard ta' ulċera peptika
- Għall-kura ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID
- Għall-prevenzjoni ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li huma f'riskju
- Għall-kura ta' esofagite tar-rifluss
- Għall-immaniġġjar fit-tul ta' pazjenti b'esofagite tar-rifluss mfejqa
- Għall-kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi
- Għall-kura tas-sindrome ta' Zollinger-Ellison

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Alternattiva għal terapija orali

F'pazjenti fejn l-użu ta' prodotti mediċinali orali mhuwiex xieraq, huwa rrakkomandat Losec IV 40 mg darba kuljum. F'pazjenti bis-sindrome ta' Zollinger-Ellison id-doża rakkomandata li biha għandu jinbada Losec mogħti ġol-vina hija ta' 60 mg kuljum. Doži oghla jisgħu jinhtiegu u d-doża għandha tigi aġġustata b'mod individwali. Meta d-doži jaqbżu s-60 mg kuljum, id-doża għandha tinqasam u tingħata darbtejn kuljum.

Losec għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vina għal 20-30 minuta.

Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

Popolazzjonijiet speċjali

Funzjoni indebolita tal-kliewi

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f'pazjenti b'funzjoni indebolita tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Funzjoni indebolita tal-fwied

F'pazjenti b'funzjoni indebolita tal-fwied id-doża ta' 10-20 mg kuljum tista' tkun biżżejjed (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani(>65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti pedjatriċi

Hemm esperjenza limitata b'Losec għal użu għol-vini fit-tfal.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal omeprazole, għal benzimidazoles sostitwiti jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Bħal inibituri tal-pompa tal-proton (PPI's) ohrajn omeprazole m'għandux jintuża flimkien ma' nelfinavir (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Malli jkun hemm xi sintomu li jqanqal suspett (eż. telf tal-piż sinifikanti mingħajr intenzjoni, rimettar ta' spiss, ugiġh biex tibla', rimettar ta' demm jew meleni) u meta jkun hemm suspett jew ikun magħruf li hemm ulċera fl-istonku, mard malinn għandu jiġi eskluż, minhabba li l-kura tista' sserraħ is-sintomi u tittardja d-dijanjożi.

L-ghoti flimkien ta' atazanavir u inibituri tal-pompa tal-proton mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5). Jekk ikunhemm opinjoni li t-taħlita ta' atazanavir u impeditur tal-pompa tal-proton ma tistax tiġi evitata, sorveljanza klinika mill-qrib (eż. tagħbija tal-virus) hija rrakkomandata flimkien ma' zieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma' 100 mg ta' ritonavir; id-doża ta' omeprazole 20 mg m'għandiex tinqabeż.

Omeprazole bħal kull medikament oħra li timblokka l-aċidu, jista' jnaqqas l-assorbiment tal-vitamina B₁₂ (cyanocobalamin) minhabba li jew ikun kemm livell imnaqqas hafna ta' aċidu fl-istonku jew ma jkun hemm l-ebda aċidu fl-istonku. Dan għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti bi tnaqqis fil-hażna li jkollhom f'għisimhom jew fatturi ta' riskju għal tnaqqis fl-assorbiment ta' vitamina B₁₂ u li qegħdin fuq terapija fit-tul.

Omeprazole huwa impeditur ta' CYP2C19. Meta tibda jew tispiċċa kura b'omeprazole, il-possibbiltà ta' interazzjonijiet b'medikamenti mmetabolizzati permezz ta' CYP2C19 għandu jiġi kkunsidrat. Interazzjoni hija osservata bejn clopidogrel u omeprazole (ara sezzjoni 4.5). Ir-rilevanza klinika ta' din l-interazzjoni mhijiex ċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole u clopidogrel għandu jiġi skoraggut.

Kura b'inibituri tal-pompa tal-proton tista' twassal għal kemxejn zieda fir-riskju ta' infezzjonijiet gastrointestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter* (ara sezzjoni 5.1).

Bħal kull kura oħra għal tul ta' żmien, speċjalment meta jinqabeż perjodu ta' sena ta' kura, il-pazjenti għadhom jinżammu taħt sorveljanza regolari.

4.5 Prodotti medicinali ohra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet ohra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta' omperazole fuq il-farmakokinetika ta' sustanzi attivi ohra

Sustanzi attivi b'assorbiment dipendenti fuq il-pH

It-tnaqqis fl-aċidità ġol-istonku waqt kura b'omeprazole tista' żżid jew tnaqqas l-assorbiment ta' sustanzi attivi b'assorbiment mill-istonku li jiddependi fuq il-pH.

Nelfinavir, atazanavir

Il-livelli ta' nelfinavir u atazanavir fil-plasma jonqsu f'każ ta' għoti flimkien ma' omeprazole.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u nelfinavir huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) naqqas l-esponiment medju għal nelfinavir b'madwar 40% u l-esponiment medju tal-meabolit attiv b'mod farmakoloġiku M8 tnaqqas b'madwar 75-90%. L-interazzjoni tista' tinvolvi wkoll l-inibizzjoni ta' CYP2C19 inhibition.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u atazanavir mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) u atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' 75% mill-esponiment ta' atazanavir. Iż-żieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma kkompensax għall-impatt ta' omeprazole fuq l-esponiment ta' atazanavir. L-għoti flimkien ta' omeprazole (20 mg darba kuljum) ma' atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' madwar 30% fl-esponiment atazanavir meta mqabbel ma' atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg darba kuljum.

Digoxin

Kura b'omeprazole (20 mg kuljum) flimkien ma' digoxin f'individwi b'saħħithom zied il-bijodisponibilità ta' digoxin b'10%. Tossicità b'digoxin kienet irrappurtata b'mod rari. Madankollu għandha tintuża l-kawtela meta omperazole jingħata f'doži għoljin lill-pazjenti anzjani. Is-sorveljanza terapewtika tal-medicina għal digoxin għandha imbagħad tissaħħa.

Clopidogrel

Fi studju kliniku crossover, clopidogrel (doża kbira fil-bidu ta' 300 mg segwita minn 75 mg/kuljum) wahdu u ma' omeprazole (80 mg fl-istess hin ma' clopidogrel) ingħataw għal 5 ijiem. L-esponiment għall-metaboliti attivi ta' clopidogrel tnaqqas b'46% (Jum 1) u b'42% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta' tagħqid ta' plejtlits (IPA) tnaqqset b'47% (24 siegħa) u bi 30% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. Fi studju ieħor intwera li l-għoti ta' clopidogrel u omeprazole f'hinijiet differenti ma' żammx l-interazzjoni, li x'aktarx tigri minhabba l-effett inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19, milli ssehh. Id-dejta inkonsistenti fuq l-implikazzjonijiet kliniċi ta' din l-interazzjoni PK/PD f'dawk li huma każijiet kardjovaskulari serji kienet rappurtata minn studji ta' osservazzjoni u kliniċi.

Sustanzi attivi ohra

L-assorbiment ta' posaconazole, erlotinib, ketoconazol u itraconazol jitnaqqas b'mod sinifikanti u b'hekk l-effikaċja klinika tista' tiddgħajef. Għal posaconazol u erlotinib l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat.

Sustanzi attivi mmetabolizzati minn CYP2C19

Omeprazole huwa inibitur moderat ta' CYP2C19, l-enzima prinċipali li timmetabolizza omeprazole B'dan il-mod, il-metaboliżmu ta' sustanzi attivi mogħtija flimkien miegħu li huma wkoll immetabolizzati minn CYP2C19, jista' jonqos u l-esponiment sistemiku għal dawn is-sustanzi jiżdied. Eżempji ta' medicini bħal dawn huma R-warfarin u antagonisti ohra tal-vitamina K, cilostazol, diazepam u phenytoin.

Cilostazol

Omeprazole, mogħti f'dozi ta' 40 mg lill-individwi b'saħħithom fi studju inkroċjat, żied is- C_{max} u l-AUC għal cilostazol bi 18% u 26% rispettivament, u wiehed mill-metaboliti attivi tiegħu b'29% u 69% rispettivament.

Phenytoin

Is-sorveljanza tal-konċentrazzjonijiet ta' phenytoin fil-plasma huwa rrakkomandat waqt l-ewwel ġimagħtejn wara minn meta tinbeda kura b'omeprazole u, jekk isir aġġustament fid-doża ta' phenytoin, sorveljanza u aktar aġġustamenti fid-doża għandhom isiru mal-waqfa mill-kura b'omeprazole.

Mekkaniżmu mhux magħruf

Saquinavir

L-ġhoti flimkien ta' omeprazole u saquinavir/ritonavir wassal għal żidiet fil-livelli tal-plażma sa madwar 70% għal saquinavir li kienu assoċjati ma' tollerabilità tajba f'pazjenti infettati bl-HIV.

Tacrolimus

L-ġhoti flimkien ma' omeprazole ġie rrapportat li jżid il-livelli ta' tacrolimus fis-serum. Għandhom isiru sorveljanzi msahħa tal-konċentrazzjonijiet ta' tacrolimus kif ukoll tal-funzjoni tal-kliewi (tneħħija tal-kreatinina), u d-doża ta' tacrolimus għandha tiġi aġġustata jekk ikun meħtieġ.

L-effetti ta' sustanzi attivi oħra fuq il-farmakokinetika ta' omeprazole

Inibituri ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Minhabba li omeprazole huwa metabolizzat permezz ta' CYP2C19 u CYP3A4, sustanzi attivi li huma magħrufa li jinibixxu CYP2C19 jew CYP3A4 (bħal clarithromycin u voriconazole) jistgħu jwasslu għal żieda fil-livelli ta' omeprazole fis-serum billi jnaqqsu r-rata ta' metabolizmu ta' omeprazole. Il-kura b'voriconazole fl-istess hin wasslet għall-esponiment ta' omeprazole ta' aktar mid-doppju. Minhabba li dozi għoljin ta' omeprazole kienu tollerati sew, tibdil fid-doża ta' omeprazole ġeneralment ma tkunx meħtieġa. Madankollu, aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'indeboliment qawwi tal-fwied u jekk tkun indikata kura għal żmien twil.

Indutturi ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Sustanzi attivi li huma magħrufa li jinduċu CYP2C19 jew CYP3A4 jew it-tnejn li huma (bħal rifampicin u St John's wort) jistgħu jwasslu għal livelli mnaqqsa ta' omeprazole fis-serum billi jżidu r-rata tal-metabolizmu ta' omeprazole.

4.6 Tqala u treddigh

Ir-riżultati minn tlett studji prospettivi epidemjoloġiċi (aktar minn 1000 riżultat ta' esponiment) ma jindikaw l-ebda effetti avversi ta' omeprazole fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija li tkun għada kif twieldet. Omeprazole jista' jintuza waqt it-tqala.

Omeprazole johroġ mal-halib tas-sider iżda mhux probabbli li jkollu effett fuq it-tarbija meta jingħataw dozi terapewtiċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Losec mhux probabbli li jeffettwa il-hila biex issuq u thaddem magni. Reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jseħħu (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjenti jiġu affettwati huma m'għandhomx isuqu jew ihaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar effetti sekondarji komuni (minn 1-10% tal-pazjenti) huma uġiġh ta' ras, uġiġh addominali, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku u tqalligh/rimettar.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina li ġejjin kienu identifikati jew suspettati fil-programm ta' provi kliniċi għal omeprazole u wara li tqiegħed fis-suq. L-ebda minnhom ma nstabu li kienu relatati mad-doża. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond il-frekwenza u l-Klassi tas-Sistemi u tal-Organi (SOC). Il-kategoriji ta' frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna ($\geq 1/10$), Komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), Mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), Rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), Rari ħafna ($< 1/10,000$), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data diaponibbli).

SOC/frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika	
Rari:	Lewkopenija, tromboċitopenija
Rari ħafna:	Agranuloċitosi, panċitopenija
Disturbi fis-sistema immuni	
Rari:	Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva eż. deni, angjoedima u xokk/reazzjoni anafilattiku/a
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	
Rari:	Iponatrimija
Rari ħafna:	Ipomagnesimja
Disturbi psikjatriċi	
Mhux komuni:	Insomnija
Rari:	Aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni
Rari ħafna:	Aggressjoni, allucinazzjonijiet
Disturbi fis-sistema nervuża	
Komuni:	Uġiġħ ta' ras
Mhux komuni:	Sturdament, parestesija, hedla tan-nġhas
Rari:	Disturb fit-togħma
Disturbi fl-għajnejn	
Rari:	Vista mċajpra
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika	
Mhux komuni:	Vertiġini
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali	
Rari:	Bronkospazmu
Disturbi gastro-intestinali	
Komuni:	Uġiġħ addominali, stitikezza, dijarea, gass, tqalligh/rimettar
Rari:	Ħalq xott, stomatite, kandidjasi gastrointestinali
Disturbi fil-fwied u fil-marrara	
Mhux komuni:	Żieda fl-enzimi tal-fwied
Rari:	Epatite bis-suffeġra jew mingħajrha
Rari ħafna:	Falliment epatiku, encefalopatija f'pazjenti b'mard tal-fwied diġà eżistenti
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda	
Mhux komuni:	Deramtitte, ħakk, raxx, urtikarja
Rari:	Alopeċja, fotosensittività
Rari ħafna:	Eritema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolisi epidermali tossika (TEN)
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi	
Rari:	Artralġja, mijalġja
Rari ħafna:	Dgħufija fil-muskoli
Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja	
Rari:	Nefrite tal-interstizju
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider	
Rari ħafna:	Ġinekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata	
Mhux komuni:	Telqa tal-ġisem, edima periferali
Rari:	Żieda fil-hruġ tal-ġaraq

Hsara irriversibbli fil-vista kienet irrappurtata f'każijiet iżolati ta' pazjenti morda b'mod kritiku li rċievew injezzjoni ta' omeprazole ġol-vini, speċjalment f'dożi kbar, iżda l-ebda relazzjoni każwali ma ġiet stabbilita.

4.9 Doża eċċessiva

Hemm informazzjoni limitata dwar l-effetti ta' dożi eċċessivi ta' omeprazole fil-bnedmin. Fil-letteratura medika, dożi sa 560 mg ġew deskritti, u nkisbu rapporti rari meta dożi waħdiet mill-ħalq laħqu sa 2,400 mg omeprazole (120 darba d-doża klinika li soltu tkun rrakkomandata). Tqalligh, rimettar, sturdament, uġiġh fl-addome, dijarea u uġiġh ta' ras kienu rrappurtati. Ukoll apatija, depressjoni u konfużjoni kienu deskritti f'każijiet waħdiet.

Is-sintomi deskritti kienu mumentanji, u l-ebda effett serju ma kien irrappurtat. Ir-rata ta' eliminazzjoni ma nbidlitx (kinetika *first order*) b'dożi aktar għoljin. Kura, jekk meħtieġa, hija kura tas-sintomi.

Dożi sa 270 mg f'jum wiehed u sa 650 mg fuq perjodu ta' tlett ijiem ingħataw fi provi kliniċi mingħajr l-ebda reazzjonijiet avversi relatati mad-doża.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibituri tal-Pompa tal-Proton, Kodiċi ATC: A02BC01

Kif jaħdem

Omeprazole, taħlita ta' numru ugwali ta' żewġ enantjomeri li jduru lejn il-lemin u lejn ix-xellug inaqas is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku permezz ta' mekkaniżmu speċifiku ħafna. Huwa inibitur speċifiku tal-pompa tal-aċidu fiċ-ċellola parjetali. Jaħdem malajr ħafna u jipprovdi kontroll permezz ta' inibizzjoni reversibbli tal-aċidu fl-istonku b'doża mogħtija darba kuljum.

Omeprazole huwa bażi dgħajef u jiġi kkonċentrat u mibdul fil-forma attiva fl-ambjent aċiduż ħafna tal-kanalikuli fiċ-ċelluli ta' ġoċ-ċelluli parjetali, fejn jinibixxi l-enzima $H^+ K^+$ -ATPase - il-pompa tal-aċidu. Dan l-effett fuq l-aħħar pass tal-proċess ta' kif jiġi forma l-aċidu fl-istonku jiddependi mid-doża u jipprovdi inibizzjoni effettiva ħafna kemm tas-sekrezzjoni tal-aċidu bażali kif ukoll s-sekrezzjoni ta' l-aċidu stimulata, irrappettivament mill-istimolu.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti farmakodinamiċi kollha li deħru jistgħu jiġu spjegati bl-effett ta' omeprazole fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu.

Effett fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku

Omeprazole ġol-vina jipprovdi inibizzjoni li tiddependi mid-doża ta' sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku fin-nies. Sabiex jinkiseb tnaqqis simili ta' aċidu ġol-istonku bħal meta tagħti dożi repetuti ta' 20 mg orali, bħala l-ewwel doża hija rrakkomandata doża ta' 40 mg ġol-vina. Dan jirriżulta fi tnaqqis immedjat ta' aċidu ġo l-istonku u tnaqqis medju ta' madwar 90% fuq perjodu ta' 24 siegħa kemm għall-injezzjoni kif ukoll għall-infużjoni ġol-vina.

L-inibizzjoni ta' sekrezzjoni tal-aċidu huwa relatat mal-erja taħt il-kurva bejn il-konċentrazzjoni fil-plażma- ħin (AUC) ta' omeprazole u mhux mal-konċentrazzjoni fil-plażma innifisha f'ħin partikolari.

L-ebda takifilassi ma ġiet osservata waqt kura b'omeprazole.

Effett fuq H. pylori

H. pylori hija assoċjata ma' mard ta' ulċera fl-istonku, li jinkludi mard ta' ulċera fid-duwodenu u fl-istonku. *H. pylori* hija fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite. *H. pylori* flimkien ma' aċidu fl-istonku

huma fatturi ewlenin fl-iżvilupp ta' mard ta' ulċera fl-istonku. *H. pylori* huwa fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite atrofica li hija assoċjata ma' riskju akbar fl-iżvilupp ta' kanċer fl-istonku.

It-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* b'omeprazole u sustanzi kontra l-mikrobi hija assoċjata ma' rati għoljin ta' fejqan u l-ghejbien fit-tul ta' mard ta' ulċeri fl-istonku.

Effetti oħrajn relatati mal-inibizzjoni tal-aċidu

Waq t kura fit-tul ċesti glandulari fl-istonku kienu rrapportati bi frekwenza x'aktarx oghla. Dawn il-bidliet huma konsegwenza fiżjoloġika ta' inibizzjoni qawwija tal-aċidu fl-istonku, huma beninni u jidher li huma reversibbli.

Tnaqqis fl-aċidità bi kwalunkwe mezz inkluz bl-inibituri tal-pompa tal-proton, iżid l-ghadd ta' batteri li normalment jinsab fil-passaġġ gastro-intestinali. Kura b'mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku jista' jwassal għal riskju fit akbar ta' infezzjonijiet gastro-intestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter*.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni apparenti f'individwi b'saħħithom huwa madwar 0.3 l/kg piż tal-ġisem. Omeprazole huwa 97% imwahaal mal-proteina fil-plażma.

Metabolizmu

Omeprazole jiġi metabolizzat għal kollox bis-sistema cytochrome P450 (CYP). Il-parti l-kbira tal-metabolizmu tiegħu jiddependi fuq CYP2C19 li jiġi espress b'mod polimorfiku, responsabbli għall-formazzjoni ta' hydroxyomeprazole, il-metabolu ewlieni fil-plażma. Il-parti li jibqa' tiddependi fuq iżoforma oħra speċifika, CYP3A4, responsabbli għall-formazzjoni ta' omeprazole sulphone. B'konsegwenza ta' l-affinità għolja ta' omeprazole għal CYP2C19, jista' jkun hemm inibizzjoni kompetittiva u interazzjonijiet metabolici bejn il-mediċini ma' sottostrati oħra ta' CYP2C19. Madankollu, minhabba affinità baxxa għal CYP3A4, omeprazole ma jistax jinibixxi l-metabolizmu ta' sottostrati oħra ta' CYP3A4. Flimkien ma' dan, omeprazole m'għandux effett inibitorju fuq l-enzimi prinċipali CYP.

Madwar 3% tal-popolazzjoni Kawkaża u 15-20% tal-popolazzjonijiet Azjatiċi m'għandhomx enzima CYP2C19 li taħdem u jissejhu metabolizzaturi dgħajfin. F'individwi bħal dawn il-metabolizmu ta' omeprazole x'aktarx jiġi katalizzat b'CYP3A4. Waqt li jingħata 20 mg omeprazole darba kuljum b'mod ripetut, l-AUC medja kienet minn 5 sa 10 darbiet oghla f'metabolizzaturi dgħajfin meta mqabbla ma' individwi li għandhom l-enzima CYP2C19 li taħdem (metabolizzaturi estensivi). Il-medja tal-oghla konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu wkoll oghla, bi 3 sa 5 darbiet. Dawn is-sejbiet m'għandhomx effett fuq il-pożoloġija ta' omeprazole.

Tnehhija

It-tnehhija totali mill-plażma hija madwar 30–40 l/siegha wara doża waħda. Il-half-life tal-eliminazzjoni mill-plażma ta' omeprazole is-soltu tkun iqsar minn siegha kemm għal doża waħda kif ukoll għal dozi ripetuti mogħtija darba kuljum. Omeprazole jitneħħa għal kollox mill-plażma bejn id-dozi ingħajr l-ebda tendenza li jakkumula b'għoti darba kuljum. Kważi 80% ta' doża ta' omeprazole titneħħa bħala metaboli fl-awrina, il-bqija fl-ippurgar, l-aktar li jkun ġej mis-sekrezzjoni tal-bila.

L-AUC ta' omeprazole tiżdied meta jingħata b'mod ripetut. Din iż-żieda tiddependi mid-doża u twassal għal relazzjoni mhux lineari bejn id-doża u l-AUC wara għoti ripetuti. Din id-dipendenza fuq il-hin u d-doża hija minhabba tnaqqis fil-metabolizmu first pass u tnaqqis fit-tnehhija sistemika probabbli kkawżata minhabba inibizzjoni tal-enzima CYP2C19 minn omeprazole u/jew il-metaboli tiegħu (eż. is-sulphone).

L-ebda metabolit ma nstab li kellu xi effett fuq is-sekrezzjoni ta' aċidu mill-istonku.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Il-metaboliżmu ta' omeprazole f'pazjenti b'funzjoni hażina tal-fwied ikun imxekkel, u dan iwassal għal zieda fl-AUC. Omeprazole ma wera l-ebda tendenza li jakkumula b'dożi mogħtija darba kuljum.

Indeboliment fil-funzjoni tal-kilwa

Il-farmakokinetika ta' omeprazole, inkluż bijodisponibilità sistemika u rata ta' eliminazzjoni, ma jinbidlux f'pazjenti b'funzjoni renali mnaqqsa.

Anzjani

Ir-rata ta' metaboliżmu ta' omeprazole hija xi ftit jew wisq imnaqqsa f'individwi anzjani (età minn 75-79 sena).

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-medicina

Iperplazja taċ-ċelluli-ECL fl-istonku u karċinojdi, dehru fi studji għal tul ta' haġja fil-firien ikkurati b'omeprazole. Dawn il-bidliet isehhu minhabba ipergastrinemija għal tul ta' żmien minhabba l-inibizzjoni tal-aċidu. Sejbiet simili saru wara kura b'antagonisti tar-riċettur- H_2 , inibituri tal-pompa tal-proton u wara fundektomija parzjali. Għalhekk, dawn il-bidliet mhux ġejjin minn effett dirett ta' xi susanza attiva partikolari.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Disodium edetate
sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma prodotti mediċinali oħra hlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Pakketti mhux miftuħa: sentejn.

Soluzzjoni rrikostitwita:

Stabbiltà kimika u fizika waqt l-użu kienet pruvata għal 12-il siegħa f'temperatura ta' 25°C wara r-rikostuzzjoni b'soluzzjoni għall-infużjoni ta' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) u għal 6 sigħat f'temperatura ta' 25°C wara rikostuzzjoni b'soluzzjoni għall-infużjoni ta' glucose 50 mg/ml (5%).

Minn aspekk mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament sakemm ma kienx rrikostitwit taht kundizzjonijiet aseptiċi validati u kkontrollati.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl. Il-kunjetti jistgħu madankollu jinħażnu barra mill-kaxxa esposti għal dawl normali ta' ġewwa għal mhux aktar minn 24 siegħa.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kunjett ta' 10 ml magħmul minn hġieġ borosilicate trasparenti, tat-tip I. Tapp magħmul minn lastku bromobutyl, sigill magħmul mill-aluminju u għatu tal-plastic magħmul mill-plastik tal-polypropylene.

Daqsijiet tal-pakkett: Kunjetti 1x40 mg, 5x40 mg and 10x40 mg.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-kontenut kollu ta' kull kunjett għandu jinhall f'madwar 5 ml u mbagħad għandu jiġi ddilwit immedjatament għal 100 ml. Għandhom jintużaw soluzzjoni ta' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall-infużjoni jew soluzzjoni ta' glucose 50 mg/ml (5%) għall-infużjoni. L-istabbiltà ta' omeprazole hija influwenzata mill-pH tas-soluzzjoni għall-infużjoni, li hija r-raġuni għaliex l-ebda solvent ieħor jew kwantitajiet oħra m'għandhom jintużaw għad-dilwizzjoni.

Kif wiehed jipprepara

1. B'siringa iġbed 5 ml ta' soluzzjoni tal-infużjoni mill-flixxun jew il-borża tal-infużjoni ta' 100 ml.
2. Żid dan il-volum għol-kunjett bl-omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar, hallat sewwa filwaqt li tiżgura li l-omeprazole inhall kollu..
3. Iġbed is-soluzzjoni ta' omeprazole lura fis-siringa.
4. Ittrasferixxi s-soluzzjoni għal għol-borża jew il-flixxun ta' soluzzjoni għall-infużjoni.
5. Irrepeti l-istruzzjonijiet minn 1-4 biex tiżgura li l-omeprazole kollu jiġi ttrasferit mill-kunjett għal għol borża jew il-flixxun tal-infużjoni.

Peparazzjoni alternattiva ta' infużjonijiet għo kontenituri flessibbli

1. Uża labra li ttaqqab miż-żewġ naħat u titrasferixxi u wahaalha mal-membrana tal-injezzjoni tal-borża tal-infużjoni. Wahaal in-naha l-oħra tal-labra mill-kunjett li fih omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar.
2. Holl is-sustanza ta' omeprazole billi tippompja s-soluzzjoni tal-infużjoni min-naha għall-oħra mill-borża tal-infużjoni għal għol-kunjett.
3. Aċċerta ruhek li l-omeprazole kollu jkun inhall.

Is-soluzzjoni għall-infużjoni għandha tingħata b'infużjoni għol-vina għal 20-30 minuta.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta': {isem ta' MS/Aġenzija}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett ta' trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni fih omeprazole sodium 42.6 mg ekwivalenti għal omeprazole 40 mg. Wara r-rikonstituzzjoni, 1 ml ikun fih omeprazole sodium 4.26 mg, ekwivalenti għal omeprazole 4 mg

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni (Trab għall-injezzjoni, u Solvent għall-injezzjoni)

pH 8.8 sa 9.2

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Losec għal użu ġol-vini huwa indikat bħala alternattiva għal terapija orali għall-indikazzjonijiet li ġejjin:

Adulti

- Għall-kura ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tad-duwodenu
- Għall-kura ta' ulċera tal-istonku
- Għall-prevenzjoni ta' rikaduta ta' ulċeri tal-istonku
- Flimkien ma' antibiotiċi xierqa, għat-tnehhija għalkollox ta' *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) f'mard ta' ulċera peptika
- Għall-kura ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID
- Għall-prevenzjoni ta' ulċeri fl-istonku jew fid-duwodenu assoċjati mal-NSAID f'pazjenti li huma f'riskju
- Għall-kura ta' esofagite tar-rifluss
- Għall-immaniġġjar fit-tul ta' pazjenti b'esofagite tar-rifluss mfejqa
- Għall-kura ta' mard ta' rifluss gastro-esofagali bis-sintomi
- Għall-kura tas-sindrome ta' Zollinger-Ellison

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Alternattiva għal terapija orali

F'pazjenti fejn l-użu ta' prodotti mediċinali orali mhuwiex xieraq, huwa rrakkomandat Losec IV 40 mg darba kuljum. F'pazjenti bis-sindrome ta' Zollinger-Ellison id-doża rakkomandata li biha għandu jinbeda Losec mogħti ġol-vina hija ta' 60 mg kuljum. Doži oghla jisgħu jinhtiegu u d-doża għandha tigi aġġustata b'mod individwali. Meta d-doži jaqbżu s-60 mg kuljum, id-doża għandha tinqasam u tingħata darbtejn kuljum.

Is-soluzzjoni Losec għall-injezzjoni għandha tinghata biss bħala injezzjoni fil-vina u ma tistax tiġi miżjuda ma' soluzzjonijiet għall-infużjoni. Wara r-rikostituzzjoni l-injezzjoni għandha tinghata bil-mod fuq perjodu ta' mill-anqas żewġ minuti u nofs b'rata massima ta' 4 ml kull minuta. Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott qabel jinghata, ara sezzjoni 6.6.

Popolazzjonijiet speċjali

Funzjoni indebolita tal-kliwi

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f'pazjenti b'funzjoni indebolita tal-kliwi (ara sezzjoni 5.2).

Funzjoni indebolita tal-fwied

F'pazjenti b'funzjoni indebolita tal-fwied id-doża ta' 10-20 mg kuljum tista' tkun biżżejjed (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani(> 65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti pedjatriċi

Hemm esperjenza limitata b'Losec għal użu ġol-vini fit-tfal.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal omeprazole, għal benzimidazoles sostitwiti jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Bhal inibituri tal-pompa tal-proton (PPI's) ohrajn omeprazole m'għandux jintuża flimkien ma' nelfinavir (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Malli jkun hemm xi sintomu li jqanqal suspett (eż. telf tal-piż sinifikanti mingħajr intenzjoni, rimettar ta' spiss, uġiġh biex tibla', rimettar ta' demm jew melena) u meta jkun hemm suspett jew ikun magħruf li hemm ulċera fl-istonku, mard malinn għandu jiġi eskluż, minhabba li l-kura tista' sserraħ is-sintomi u tittardja d-dijanjożi.

L-ġhoti flimkien ta' atazanavir u inibituri tal-pompa tal-proton mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5). Jekk ikunhemm opinjoni li t-taħlita ta' atazanavir u impeditur tal-pompa tal-proton ma tistax tiġi evitata, sorveljanza klinika mill-qrib (eż. tagħbija tal-virus) hija rrakkomandata flimkien ma' zieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma' 100 mg ta' ritonavir; id-doża ta' omeprazole 20 mg m'għandiex tinqabeż.

Omeprazole bħal kull mediċina oħra li timblokka l-aċidu, jista' jnaqqas l-assorbiment tal-vitamina B₁₂ (cyanocobalamin) minhabba li jew ikun kemm livell imnaqqas hafna ta' aċidu fl-istonku jew ma jkun hemm l-ebda aċidu fl-istonku. Dan għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti bi tnaqqis fil-ħażna li jkollhom f'ġisimhom jew fatturi ta' riskju għal tnaqqis fl-assorbiment ta' vitamina B₁₂ u li qegħdin fuq terapija fit-tul.

Omeprazole huwa impeditur ta' CYP2C19. Meta tibda jew tispiċċa kura b'omeprazole, il-possibbiltà ta' interazzjonijiet b'mediċini mmetabolizzati permezz ta' CYP2C19 għandu jiġi kkunsidrat. Interazzjoni hija osservata bejn clopidogrel u omeprazole (ara sezzjoni 4.5). Ir-rilevanza klinika ta' din l-interazzjoni mhijiex ċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole u clopidogrel għandu jiġi skoraġġut. Kura b'inibituri tal-pompa tal-proton tista' twassal għal kemxejn zieda fir-riskju ta' infezzjonijiet gastrointestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter* (ara sezzjoni 5.1).

Bhal kull kura oħra għal tul ta' żmien, speċjalment meta jinqabeż perjodu ta' sena ta' kura, il-pazjenti għadhom jinżammu taħt sorveljanza regolari.

4.5 Prodotti medicinali ohra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet ohra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta' omperazole fuq il-farmakokinetika ta' sustanzi attivi ohra

Sustanzi attivi b'assorbiment dipendenti fuq il-pH

It-tnaqqis fl-aċidità ġol-istonku waqt kura b'omeprazole tista' żżid jew tnaqqas l-assorbiment ta' sustanzi attivi b'assorbiment mill-istonku li jiddependi fuq il-pH.

Nelfinavir, atazanavir

Il-livelli ta' nelfinavir u atazanavir fil-plasma jonqsu f'każ ta' għoti flimkien ma' omeprazole.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u nelfinavir huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) naqqas l-esponiment medju għal nelfinavir b'madwar 40% u l-esponiment medju tal-meabolit attiv b'mod farmakoloġiku M8 tnaqqas b'madwar 75-90%. L-interazzjoni tista' tinvolvi wkoll l-inibizzjoni ta' CYP2C19 inhibition.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u atazanavir mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) u atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' 75% mill-esponiment ta' atazanavir. Iż-żieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma kkompensatx għall-impatt ta' omeprazole fuq l-esponiment ta' atazanavir. L-għoti flimkien ta' omeprazole (20 mg darba kuljum) ma' atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' madwar 30% fl-esponiment atazanavir meta mqabbel ma' atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg darba kuljum.

Digoxin

Kura b'omeprazole (20 mg kuljum) flimkien ma' digoxin f'individwi b'saħħithom zied il-bijodisponibilità ta' digoxin b'10%. Tossicità b'digoxin kienet irrappurtata b'mod rari. Madankollu għandha tintuża l-kawtela meta omperazole jingħata f'doži għoljin lill-pazjenti anzjani. Is-sorveljanza terapewtika tal-medicina għal digoxin għandha imbagħad tissaħħa.

Clopidogrel

Fi studju kliniku crossover, clopidogrel (doża kbira fil-bidu ta' 300 mg segwita minn 75 mg/kuljum) wahdu u ma' omeprazole (80 mg fl-istess hin ma' clopidogrel) ingħataw għal 5 ijiem. L-esponiment għall-metaboliti attivi ta' clopidogrel tnaqqas b'46% (Jum 1) u b'42% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta' tagħqid ta' plejtlits (IPA) tnaqqset b'47% (24 siegħa) u bi 30% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. Fi studju ieħor intwera li l-għoti ta' clopidogrel u omeprazole f'hinijiet differenti ma' żammx l-interazzjoni, li x'aktarx tigri minhabba l-effett inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19, milli ssehh. Id-dejta inkonsistenti fuq l-implikazzjonijiet kliniċi ta' din l-interazzjoni PK/PD f'dawk li huma każijiet kardjovaskulari serji kienet rrappurtata minn studji ta' osservazzjoni u kliniċi.

Sustanzi attivi ohra

L-assorbiment ta' posaconazole, erlotinib, ketoconazol u itraconazol jitnaqqas b'mod sinifikanti u b'hekk l-effikaċja klinika tista' tiddgħajef. Għal posaconazol u erlotinib l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat.

Sustanzi attivi mmetabolizzati minn CYP2C19

Omeprazole huwa inibitur moderat ta' CYP2C19, l-enzima prinċipali li timmetabloizza omeprazole B'dan il-mod, il-metaboliżmu ta' sustanzi attivi mogħtija flimkien miegħu li huma wkoll immetabolizzati minn CYP2C19, jista' jonqos u l-esponiment sistemiku għal dawn is-sustanzi jiżdied. Eżempji ta' medicini bħal dawn huma R-warfarin u antagonisti ohra tal-vitamina K, cilostazol, diazepam u phenytoin.

Cilostazol

Omeprazole, mogħti f'dozi ta' 40 mg lill-individwi b'saħħithom fi studju inkroċjat, żied is- C_{max} u l-AUC għal cilostazol bi 18% u 26% rispettivament, u wiehed mill-metaboliti attivi tiegħu b'29% u 69% rispettivament.

Phenytoin

Is-sorveljanza tal-konċentrazzjonijiet ta' phenytoin fil-plasma huwa rrakkomandat waqt l-ewwel ġimagħtejn wara minn meta tinbeda kura b'omeprazole u, jekk isir aġġustament fid-doża ta' phenytoin, sorveljanza u aktar aġġustamenti fid-doża għandhom isiru mal-waqfa mill-kura b'omeprazole.

Mekkaniżmu mhux magħruf

Saquinavir

L-ġhoti flimkien ta' omeprazole u saquinavir/ritonavir wassal għal żidiet fil-livelli tal-plażma sa madwar 70% għal saquinavir li kienu assoċjati ma' tollerabilità tajba f'pazjenti infettati bl-HIV.

Tacrolimus

L-ġhoti flimkien ma' omeprazole ġie rrapportat li jżid il-livelli ta' tacrolimus fis-serum. Għandhom isiru sorveljanzi msahħa tal-konċentrazzjonijiet ta' tacrolimus kif ukoll tal-funzjoni tal-kliwi (tneħħija tal-kreatinina), u d-doża ta' tacrolimus għandha tiġi aġġustata jekk ikun meħtieġ.

L-effetti ta' sustanzi attivi oħra fuq il-farmakokinetika ta' omeprazole

Inibituri ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Minhabba li omeprazole huwa metabolizzat permezz ta' CYP2C19 u CYP3A4, sustanzi attivi li huma magħrufa li jinibixxu CYP2C19 jew CYP3A4 (bħal clarithromycin u voriconazole) jistgħu jwasslu għal żieda fil-livelli ta' omeprazole fis-serum billi jnaqqsu r-rata ta' metabolizmu ta' omeprazole. Il-kura b'voriconazole fl-istess ħin wasslet għall-esponiment ta' omeprazole ta' aktar mid-doppju. Minhabba li dozi għoljin ta' omeprazole kienu tollerati sew, tibdil fid-doża ta' omeprazole ġeneralment ma tkunx meħtieġa. Madankollu, aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'indeboliment qawwi tal-fwied u jekk tkun indikata kura għal żmien twil.

Indutturi ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Sustanzi attivi li huma magħrufa li jinduċu CYP2C19 jew CYP3A4 jew it-tnejn li huma (bħal rifampicin u St John's wort) jistgħu jwasslu għal livelli mnaqqsa ta' omeprazole fis-serum billi jżidu r-rata tal-metabolizmu ta' omeprazole.

4.6 Tqala u treddigh

Ir-riżultati minn tlett studji prospettivi epidemjoloġiċi (aktar minn 1000 riżultat ta' esponiment) ma jindikaw l-ebda effetti avversi ta' omeprazole fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija li tkun għada kif twieldet. Omeprazole jista' jintuza waqt it-tqala.

Omeprazole johroġ mal-halib tas-sider iżda mhux probabbli li jkollu effett fuq it-tarbija meta jingħataw dozi terapewtiċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Losec mhux probabbli li jeffettwa il-hila biex issuq u thaddem magni. Reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jseħħu (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjenti jiġu affettwati huma m'għandhomx isuqu jew ihaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar effetti sekondarji komuni (minn 1-10% tal-pazjenti) huma uġiġh ta' ras, uġiġh addominali, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku u tqalligh/rimettar.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina li ġejjin kienu identifikati jew suspettati fil-programm ta' provi kliniċi għal omeprazole u wara li tqiegħed fis-suq. L-ebda minnhom ma nstabu li kienu relatati mad-doża.

Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond il-frekwenza u l-Klassi tas-Sistemi u tal-Organi (SOC). Il-kategoriji ta' frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni (≥1/10), Komuni (≥1/100 sa <1/10), Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), Rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), Rari hafna (<1/10,000), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data diaponibbli).

SOC/frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika	
Rari:	Lewkopenija, tromboċitopenija
Rari hafna:	Agranuloċitosi, panċitopenija
Disturbi fis-sistema immuni	
Rari:	Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva eż. deni, angjoedima u xokk/reazzjoni anafilattiku/a
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	
Rari:	Iponatrimija
Rari hafna:	Ipomagnesimja
Disturbi psikjatriċi	
Mhux komuni:	Insomnija
Rari:	Aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni
Rari hafna:	Aggressjoni, allucinazzjonijiet
Disturbi fis-sistema nervuża	
Komuni:	Ugħigħ ta' ras
Mhux komuni:	Sturdament, parestesija, hedla tan-nghas
Rari:	Disturb fit-togħma
Disturbi fl-ġhajnejn	
Rari:	Vista mċajpra
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika	
Mhux komuni:	Vertiġini
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali	
Rari:	Bronkospazmu
Disturbi gastro-intestinali	
Komuni:	Ugħigħ addominali, stitikezza, dijarea, gass, tqalligħ/rimettar
Rari:	Ħalq xott, stomatite, kandidjasi gastrointestinali
Disturbi fil-fwied u fil-marrara	
Mhux komuni:	Żieda fl-enzimi tal-fwied
Rari:	Epatite bis-suffejra jew mingħajrha
Rari hafna:	Falliment epatiku, encefalopatija f'pazjenti b'mard tal-fwied diġà eżistenti
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda	
Mhux komuni:	Deramtitte, ħakk, raxx, urtikarja
Rari:	Alopeċja, fotosensittività
Rari hafna:	Eritema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolisi epidermali tossika (TEN)
Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi	
Rari:	Artralġja, mijalġja
Rari hafna:	Dgħufija fil-muskoli
Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja	
Rari:	Nefrite tal-interstizju
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider	
Rari hafna:	Ġinekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata	
Mhux komuni:	Telqa tal-ġisem, edima periferali

Rari:	Żieda fil-hruġ tal-gharaq
-------	---------------------------

Hsara irriversibbli fil-vista kienet irrappurtata f'każijiet iżolati ta' pazjenti morda b'mod kritiku li rċievew injezzjoni ta' omeprazole ġol-vini, speċjalment f'dożi kbar, iżda l-ebda relazzjoni każwali ma ġiet stabbilita.

4.9 Doża eċċessiva

Hemm informazzjoni limitata dwar l-effetti ta' doži eċċessivi ta' omeprazole fil-bnedmin. Fil-letteratura medika, doži sa 560 mg ġew deskritti, u nkisbu rapporti rari meta doži waħdiet mill-ħalq laħqu sa 2,400 mg omeprazole (120 darba d-doża klinika li soltu tkun rrakkomandata). Tqalligh, rimettar, sturdament, uġiġh fl-addome, dijarea u uġiġh ta' ras kienu rrappurtati. Ukoll apatija, depressjoni u konfużjoni kienu deskritti f'każijiet waħdiet.

Is-sintomi deskritti kienu mumentanji, u l-ebda effett serju ma kien irrappurtat. Ir-rata ta' eliminazzjoni ma nbidlitx (kinetika *first order*) b'doži aktar għoljin. Kura, jekk meħtieġa, hija kura tas-sintomi.

Doži sa 270 mg f'jum wieħed u sa 650 mg fuq perjodu ta' tlett ijiem ingħataw fi provi kliniċi mingħajr l-ebda reazzjonijiet avversi relatati mad-doża.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibituri tal-Pompa tal-Proton, Kodiċi ATC: A02BC01

Kif jaħdem

Omeprazole, taħlita ta' numru ugwali ta' żewġ enantjomeri li jdur u lejn il-lemin u lejn ix-xellug inaqas is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku permezz ta' mekkaniżmu speċifiku ħafna. Huwa inibitur speċifiku tal-pompa tal-aċidu fiċ-ċellola parjetali. Jaħdem malajr ħafna u jipprovdi kontroll permezz ta' inibizzjoni reversibbli tal-aċidu fl-istonku b'doża mogħtija darba kuljum.

Omeprazole huwa bażi dghajef u jiġi kkonċentrat u mibdul fil-forma attiva fl-ambjent aċiduż ħafna tal-kanalikuli fiċ-ċelluli ta' goċ-ċelluli parjetali, fejn jinibixxi l-enzima $H^+ K^+ -ATPase$ - il-pompa tal-aċidu. Dan l-effett fuq l-aħħar pass tal-proċess ta' kif jifforma l-aċidu fl-istonku jiddependi mid-doża u jipprovdi inibizzjoni effettiva ħafna kemm tas-sekrezzjoni tal-aċidu bażali kif ukoll s-sekrezzjoni ta' l-aċidu stimulata, irrappettivament mill-istimolu.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti farmakodinamiċi kollha li deħru jistgħu jiġu spjegati bl-effett ta' omeprazole fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu.

Effett fuq is-sekrezzjoni tal-aċidu mill-istonku

Omeprazole ġol-vina jipprovdi inibizzjoni li tiddependi mid-doża ta' sekrezzi joni tal-aċidu mill-istonku fin-nies. Sabiex jinkiseb tnaqqis simili ta' aċidu ġol-istonku bħal meta tagħti doži repetuti ta' 20 mg orali, bħala l-ewwel doża hija rrakkomandata doża ta' 40 mg ġol-vina. Dan jirriżulta fi tnaqqis immedjat ta' aċidu ġo l-istonku u tnaqqis medju ta' madwar 90% fuq perjodu ta' 24 siegħa kemm għall-injezzjoni kif ukoll għall-infużjoni ġol-vina.

L-inibizzjoni ta' sekrezzi joni tal-aċidu huwa relatat mal-erja taħt il-kurva bejn il-konċentrazzjoni fil-plażma- ħin (AUC) ta' omeprazole u mhux mal-konċentrazzjoni fil-plażma innifisha f'ħin partikolari.

L-ebda takifilassi ma ġiet osservata waqt kura b'omeprazole.

Effett fuq H. pylori

H. pylori hija assoċjata ma' mard ta' ulċera fl-istonku, li jinkludi mard ta' ulċera fid-duwodu u fl-istonku. *H. pylori* hija fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite. *H. pylori* flimkien ma' aċidu fl-istonku huma fatturi ewlenin fl-iżvilupp ta' mard ta' ulċera fl-istonku. *H. pylori* huwa fattur ewlieni fl-iżvilupp ta' gastrite atrofika li hija assoċjata ma' riskju akbar fl-iżvilupp ta' kanċer fl-istonku.

It-tnehhija għalkollox ta' *H. pylori* b'omeprazole u sustanzi kontra l-mikrobi hija assoċjata ma' rati għoljin ta' fejqan u l-għejbien fit-tul ta' mard ta' ulċeri fl-istonku.

Effetti oħrajn relatati mal-inibizzjoni tal-aċidu

Waq t kura fit-tul ċesti glandulari fl-istonku kienu rrapportati bi frekwenza x'aktarx oghla. Dawn il-bidliet huma konsegwenza fiżjoloġika ta' inibizzjoni qawwija tal-aċidu fl-istonku, huma beninni u jidher li huma reversibbli.

Tnaqqis fl-aċidità bi kwalunkwe mezz inkluz bl-inibituri tal-pompa tal-proton, iżid l-ghadd ta' batteri li normalment jinsab fil-passaġġ gastro-intestinali. Kura b'mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku jista' jwassal għal riskju fit akbar ta' infezzjonijiet gastro-intestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter*.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni apparenti f'individwi b'saħħithom huwa madwar 0.3 l/kg piż tal-ġisem. Omeprazole huwa 97% imwahaal mal-proteina fil-plażma.

Metabolizmu

Omeprazole jiġi metabolizzat għal kollox bis-sistema cytochrome P450 (CYP). Il-parti l-kbira tal-metabolizmu tiegħu jiddependi fuq CYP2C19 li jiġi espress b'mod polimorfiku, responsabbli għall-formazzjoni ta' hydroxyomeprazole, il-metabbolu ewlieni fil-plażma. Il-parti li jibqa' tiddependi fuq iżoforma oħra speċifika, CYP3A4, responsabbli għall-formazzjoni ta' omeprazole sulphone. B'konsegwenza ta' l-affinità għolja ta' omeprazole għal CYP2C19, jista' jkun hemm inibizzjoni kompetittiva u interazzjonijiet metabolici bejn il-mediċini ma' sottostrati oħra ta' CYP2C19. Madankollu, minhabba affinità baxxa għal CYP3A4, omeprazole ma jistax jinibixxi l-metabolizmu ta' sottostrati oħra ta' CYP3A4. Flimkien ma' dan, omeprazole m'għandux effett inibitorju fuq l-enzimi prinċipali CYP.

Madwar 3% tal-popolazzjoni Kawkaża u 15-20% tal-popolazzjonijiet Azjatiċi m'għandhomx enzima CYP2C19 li taħdem u jissejhu metabolizzaturi dgħajfin. F'individwi bħal dawn il-metabolizmu ta' omeprazole x'aktarx jiġi katalizzat b'CYP3A4. Waqt li jingħata 20 mg omeprazole darba kuljum b'mod ripetut, l-AUC medja kienet minn 5 sa 10 darbiet oghla f'metabolizzaturi dgħajfin meta mqabbla ma' individwi li għandhom l-enzima CYP2C19 li taħdem (metabolizzaturi estensivi). Il-medja tal-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu wkoll oghla, bi 3 sa 5 darbiet. Dawn is-sejbiet m'għandhomx effett fuq il-pożoloġija ta' omeprazole.

Tnehhija

It-tnehhija totali mill-plażma hija madwar 30–40 l/siegha wara doża waħda. Il-half-life tal-eliminazzjoni mill-plażma ta' omeprazole is-soltu tkun iqsar minn siegha kemm għal doża waħda kif ukoll għal dozi ripetuti mogħtija darba kuljum. Omeprazole jitneħħa għal kollox mill-plażma bejn id-dozi. Kważi 80% ta' doża ta' omeprazole titneħħa bħala metaboli fl-awrina, il-bqija fl-ippurgar, l-aktar li jkun ġej mis-sekrezzjoni tal-bila.

L-AUC ta' omeprazole tiżdied meta jingħata b'mod ripetut minhabba tnaqqis fit-tnehhija sistemika probabbli kkawżata minhabba inibizzjoni tal-enzima CYP2C19 minn omeprazole u/jew il-metaboli tiegħu (eż. is-sulphone).

L-ebda metabolit ma nstab li kellu xi effett fuq is-sekrezzjoni ta' aċidu mill-istonku.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Il-metaboliżmu ta' omeprazole f'pazjenti b'funzjoni hażina tal-fwied ikun imxekkel, u dan iwassal għal zieda fl-AUC. Omeprazole ma werja l-ebda tendenza li jakkumula b'dożi mogħtija darba kuljum.

Indeboliment fil-funzjoni tal-kilwa

Il-farmakokinetika ta' omeprazole, inkluż bijodisponibilità sistemika u rata ta' eliminazzjoni, ma jinbidlux f'pazjenti b'funzjoni renali mnaqqsa.

Anzjani

Ir-rata ta' metaboliżmu ta' omeprazole hija xi ftit jew wisq imnaqqsa f'individwi anzjani (età minn 75-79 sena).

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-medicina

Iperplazja taċ-ċelluli-ECL fl-istonku u karċinojdi, dehru fi studji għal tul ta' haġja fil-firien ikkurati b'omeprazole. Dawn il-bidliet isehhu minhabba ipergastrinemija għal tul ta' żmien minhabba l-inibizzjoni tal-aċidu. Sejbiet simili saru wara kura b'antagonisti tar-riċettur- H_2 , inibituri tal-pompa tal-proton u wara fundektomija parzjali. Għalhekk, dawn il-bidliet mhux ġejjin minn effett dirett ta' xi susanza attiva partikolari.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Kunjett tas-sustanza attiva

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal- pH)

Ampulla bis-solvent

Citric acid monohydrate (għal aġġustament tal-pH)

macrogol 400

ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma prodotti mediċinali oħra hlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Pakketti mhux miftuħa: sentejn.

Soluzzjoni rrikostitwita:

Stabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu kienet pruvata għal 4 sigħat f'temperatura ta' 25°C wara r-rikostuzzjoni.

Minn aspekk mikrobijologiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament sakemm ma kienx rikostitwit taħt kundizzjonijiet aseptiċi validati u kkontrollati.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Żomm il-kontenituri fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl. Il-kunjetti jistgħu madankollu jinħażnu barra mill-kaxxa esposti għal dawl normali ta' ġewwa għal mhux aktar minn 24 siegħa.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm go fih

Pakkett imhallat (I+II):

I: Sustanza niexfa f'kunjett ta' 10 ml magħmul minn ħġieġ borosilicate trasparenti, tat-tip I. Tapp magħmul minn lastku bromobutyl, siġill magħmul mill-aluminju u għatu tal-plastic magħmul mill-plastik tal-polypropylene.

II: 10 ml solvent f'ampulla (ħġieġ borosilicate trasparenti).

Daqsijiet tal-pakkett: 1x40 mg (I+II), 5x40 mg (I+II) and 10x40 mg (I+II).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema u għal immaniġġar iehor

Is-soluzzjoni Losec għall-injezzjoni tinkiseb billi wiehed iħoll is-sustanza mnixxa permezz tal-iffriżar fis-solvent li jiġi magħha. L-ebda solvent iehor m'għandu jintuza.

L-istabbiltà ta' omeprazole hija influwenzata mill-pH tas-soluzzjoni għall-injezzjoni, li hija r-raġuni għaliex l-ebda solvent iehor jew kwantitajiet oħra m'għandhom jintużaw għad-dilwizzjoni. Soluzzjonijiet li ma jiġux ippreparati sewwa jistgħu jiġu identifikati minn kulur isfar sa kannella u m'għandhomx jintużaw. Uża biss soluzzjonijiet ċari, mingħajr kulur jew sofor fil-kannella ċari ħafna.

Kif wiehed jipprepara

NOTA: Istruzzjonijiet minn 1 sa 5 għandhom isiru eżatt wara xulxin:

1. B'siringa iġbed is-solvent kollu mill-ampulla (10 ml).
2. Żid madwar 5 ml mis-solvent ġol-kunjett li fih omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar.
3. Iġbed kemm tista' arja mill-kunjett lura għal ġos-siringa. Dan jgħin biex iżżid is-solvent li jkun fadal b'mod aktar faċli.
4. Żid is-solvent li jkun għad fadal għal ġol-kunjett, aċċerta ruhek li s-siringa tkun vojta.
5. Dawwar u ħawwad il-kunjett biex tiżgura li l-omeprazole kollu mnixxef permezz tal-iffriżar inhall.

Is-soluzzjoni ta' Losec għall-injezzjoni għandha tingħata biss bħala injezzjoni ġol-vina u m'għandiex tiżdied ma' soluzzjonijiet għall-infużjoni. Wara r-rikostituzzjoni l-injezzjoni għandha tingħata bil-mod fuq perjodu ta' mill-anqas żewġ minuti u nofs b'rata massima ta' 4 ml kull minuta.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta': {isem ta' MS/Aġenzija}

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

SOMMARJU TAL-KRATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Għall-prodotti mediċinali li jingħataw mingħajr riċetta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10 mg: Kull pillola gastroreżistenti fiha 10.3 mg omeprazole magnesium ekwivalenti għal 10 mg omeprazole.

20 mg: Kull pillola gastroreżistenti fiha 20.6 mg omeprazole magnesium ekwivalenti għal 20 mg omeprazole.

Sustanza mhux attiva:

10 mg: Kull pillola gastro-reżistenti fiha 19–20 mg sucrose.

20 mg: Kull pillola gastro-reżistenti fiha 19–20 mg sucrose.

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola gastroreżistenti.

Losec 10 mg pilloli gastroreżistenti: pilloli roża ċari, oblongi, konvessi fuq iż-żewġ naħat, miksijin b'rita imnaqqxin b'  jew  fuq naħa waħda u b' 10 mg fuq in-naħa l-oħra li fihom pritkuni b'kisja enterika.

Losec 20 mg pilloli gastroreżistenti: pilloli roża, oblongi, konvessi fuq iż-żewġ naħat, miksijin b'rita, imnaqqxin b'  jew  fuq naħa waħda u b' 20 mg fuq in-naħa l-oħra li fihom pritkuni b'kisja enterika.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-pilloli gastroreżistenti Losec huma indikati għall-kura ta' sintomi ta' rifluss (eż. hruq ta' stonku, rigurgitazzjoni tal-aċidu) fl-adulti.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija fl-adulti

Id-doża rrakkomandata hija 20 mg darba kuljum għal 14-il jum.

Jista' jkun meħtieġ li tiehu l-pilloli għal bejn 2-3 ijiem konsekuttivi biex tikseb titjib fis-sintomi.

Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti kisbu serħan għalkollox mill-hruq ta' stonku fi żmien 7 ijiem. Ladarba jkun hemm serħan għalkollox mis-sintomi, il-kura għandha titwaqqaf.

Popolazzjonijiet speċjali

Funzjoni renali indebolita

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f'pazjenti b'funzjoni renali indebolita (ara sezzjoni 5.2).

Funzjoni epatika indebolita

Pazjenti b'funzjoni epatika indebolita għandhom jingħataw parir minn tabib qabel jieħdu Losec (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani(>65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta' kif jingħata

Huwa rrakkomandat li tiegħu l-pilloli Losec filgħodu u tiblaxxhom shah ma nofs tazza ilma. Il-pilloli m'għandhomx jintmagħdu jew jinfarrku.

Għall-pazjenti li ma jistgħux jibilgħu

Aqsam il-pillola u ferrixha f'mgħarfa ilma mhux bil-gass - jekk tixtieq, hallatha ma' xi meraq tal-frott jew pure tat-tuffieħ. It-taħlita għandha tittiehed mill-ewwel (jew fi żmien 30 minuta). It-taħlita għandha titħawwad qabel tinxtorob u warajha għandha terġa' tinxtorob nofs tazza ilma. **TUŻAX** halib jew ilma bil-gass. Il-pretikuni b'kisja enterika m'għandhomx jintmagħdu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal omeprazole, għal benzimidazoles sostitwiti jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Bħal inibituri tal-pompa tal-proton oħrajn omeprazole m'għandux jintuża flimkien ma' nelfinavir (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Malli jkun hemm xi sintomu li jkannaq suspett (eż telf tal-piż sinifikanti mingħajr intenzjoni, rimettar ta' spiss, ugiġi biex tibla', rimettar ta' demm jew melena) u meta jkun hemm suspett jew ikun magħruf li hemm ulċera fl-istonku, mard malinn għandu jiġi eskluż, minhabba li l-kura tista' sserraħ is-sintomi u tittardja d-dijanjożi.

L-ghoti flimkien ta' atazanavir u inibituri tal-pompa tal-proton mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5). Jekk ikunhemm opinjoni li t-taħlita ta' atazanavir u impeditur tal-pompa tal-proton ma tistax tiġi evitata, sorveljanza klinika mill-qrib (eż. tagħbija tal-virus) hija rrakkomandata flimkien ma' zieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma' 100 mg ta' ritonavir; id-doża ta' omeprazole 20 mg m'għandiex tinqabeż.

Omeprazole huwa impeditur ta' CYP2C19. Meta tibda jew tispiċċa kura b'omeprazole, il-possibbiltà ta' interazzjonijiet b'mediċini mmetabolizzati permezz ta' CYP2C19 għandu jiġi kkunsidrat. Interazzjoni hija osservata bejn clopidogrel u omeprazole (ara sezzjoni 4.5). Ir-rilevanza klinika ta' din l-interazzjoni mhijiex ċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkometanti ta' omeprazole u clopidogrel għandu jiġi skoraggut.

Il-pilloli gastror-eżistenti Losec fihom is-sucrose. Pazjenti bi problemi eriditarji rari ta' intolleranza għal fructose, malassorbiment tal-glucose-galactose jew insuffiċjenza ta' sucrase-isomaltase m'għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Kura b'inibituri tal-pompa tal-proton tista' twassal għal kemxejn zieda fir-riskju ta' infezzjonijiet gastrointestinali bħal *Salmonella* u *Campylobacter* (ara sezzjoni 5.1).

Pazjenti b'sintomi ta' indigestjoni jew hruq ta' stonku rikorrenti u għal tul ta' żmien għandhom jaraw lit-tabib tagħhom f'intervalli regolari. Speċjalment pazjenti li għandhom aktar minn 55 sena li qed jieħdu kwalunkwe mediċina għal indigestjoni jew hruq ta' stonku kuljum mingħajr riċetta għandhom jinfurmaw lill-ispizjar jew lit-tabib tagħhom.

Il-pazjenti għandhom jiġu ordanti jikkonsultaw tabib jekk:

- Qabel diġà kellhom ulċera fl-istonku jew operazzjoni gastrointestinali.
- Huma ilhom jiehdu kura kontinwa għas-sintomi ta' indigestjoni jew ħruq ta' stonku għal 4 ġimgħat jew aktar.
- Huma għandhom is-suffejra jew mard qawwi tal-fwied.
- Jekk huma għandhom aktar minn 55 sena b'sintomi godda jew li nbidlu dan l-aħħar.

Il-pazjenti m'għandhomx jiehdu omeprazole bħala mediċina ta' prevenzjoni.

4.5 Prodotti mediċinali ohra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet ohra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta' omeprazole fuq il-farmakokinetika ta' sustanzi attivi ohra

Sustanzi attivi b'assorbiment dipendenti fuq il-pH

It-tnaqqis fl-aċidità ġol-istonku waqt kura b'omeprazole tista' żżid jew tnaqqas l-assorbiment ta' sustanzi attivi b'assorbiment mill-istonku li jiddependi fuq il-pH.

Nelfinavir, atazanavir

Il-livelli ta' nelfinavir u atazanavir fil-plasma jonqsu f'każ ta' għoti flimkien ma' omeprazole.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u nelfinavir huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) naqqas l-esponiment medju għal nelfinavir b'madwar 40% u l-esponiment medju tal-meabolit attiv b'mod farmakoloġiku M8 naqqas b'madwar 75-90%. L-interazzjoni tista' tinvolvi wkoll l-inibizzjoni ta' CYP2C19 inhibition.

L-għoti flimkien ta' omeprazole u atazanavir mhuwiex irrakkomandat (ara sezzjoni 4.4). L-għoti flimkien ta' omeprazole (40 mg darba kuljum) u atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' 75% mill-esponiment ta' atazanavir. Iż-żieda fid-doża ta' atazanavir għal 400 mg ma kkompensatx għall-impatt ta' omeprazole fuq l-esponiment ta' atazanavir. L-għoti flimkien ta' omeprazole (20 mg darba kuljum) ma' atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg lill-voluntiera b'saħħithom wassal għal tnaqqis ta' madwar 30% fl-esponiment atazanavir meta mqabbel ma' atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg darba kuljum.

Digoxin

Kura b'omeprazole (20 mg kuljum) flimkien ma' digoxin f'individwi b'saħħithom zied il-bijodisponibilità ta' digoxin b'10%. Tossicità b'digoxin kienet irrappurtata b'mod rari. Madankollu għandha tintuża l-kawtela meta omeprazole jingħata f'dozi għoljin lill-pazjenti anzjani. Is-sorveljanza terapewtika tal-mediċina għal digoxin għandha imbagħad tissaħħa.

Clopidogrel

Fi studju kliniku crossover, clopidogrel (doża kbira fil-bidu ta' 300 mg segwita minn 75 mg/kuljum) wahdu u ma' omeprazole (80 mg fl-istess hin ma' clopidogrel) ingħataw għal 5 ijiem. L-esponiment għall-metaboliti attivi ta' clopidogrel naqqas b'46% (Jum 1) u b'42% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta' tagħqid ta' plejtlits (IPA) tnaqqset b'47% (24 siegħa) u bi 30% (Jum 5) meta clopidogrel u omeprazole ingħataw flimkien. Fi studju ieħor intwera li l-għoti ta' clopidogrel u omeprazole f'hinijiet differenti ma' żammx l-interazzjoni, li x'aktarx tigris minhabba l-effett inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19, milli ssehh. Id-dejta inkonsistenti fuq l-implikazzjonijiet kliniċi ta' din l-interazzjoni PK/PD f'dawk li huma każijiet kardjovaskulari serji kienet rrapportata minn studji ta' osservazzjoni u kliniċi.

Sustanzi attivi ohra

L-assorbiment ta' posaconazole, erlotinib, ketoconazol u itraconazol jitnaqqas b'mod sinifikanti u b'hekk l-effikaċja klinika tista' tiddgħajef. Għal posaconazol u erlotinib l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat.

Sustanzi attivi mmetabolizzati minn CYP2C19

Omeprazole huwa inibitur moderat ta' CYP2C19, l-enzima prinċipali li timmetabloizza omeprazole B'dan il-mod, il-metaboliżmu ta' sustanzi attivi mogħtija flimkien miegħu li huma wkoll immetabolizzati minn CYP2C19, jista' jonqos u l-esponiment sistemiku għal dawn is-sustanzi jiżdied. Eżempji ta' mediċini bħal dawn huma R-warfarin u antagonisti oħra tal-vitamina K, cilostazol, diazepam u phenytoin.

Cilostazol

Omeprazole, mogħti f'dozi ta' 40 mg lill-individwi b'saħħithom fi studju inkroċjat, zied is- C_{max} u l-AUC għal cilostazol bi 18% u 26% rispettivament, u wiehed mill-metaboliti attivi tiegħu b'29% u 69% rispettivament.

Phenytoin

Is-sorveljanza tal-konċentrazzjonijiet ta' phenytoin fil-plasma huwa rrakkomandat waqt l-ewwel ġimagħtejn wara minn meta tinbeda kura b'omeprazole u, jekk isir aġġustament fid-doża ta' phenytoin, sorveljanza u aktar aġġustamenti fid-doża għandhom isiru mal-waqfa mill-kura b'omeprazole.

Mekkaniżmu mhux magħruf

Saquinavir

L-ġhoti flimkien ta' omeprazole u saquinavir/ritonavir wassal għal żidiet fil-livelli tal-plażma sa madwar 70% għal saquinavir li kienu assoċjati ma' tollerabilità tajba f'pazjenti infettati bl-HIV.

Tacrolimus

L-ġhoti flimkien ma' omeprazole ġie rrapportat li jżid il-livelli ta' tacrolimus fis-serum. Għandhom isiru sorveljanzi msahħa tal-konċentrazzjonijiet ta' tacrolimus kif ukoll tal-funzjoni tal-kliwi (tneħħija tal-kreatinina), u d-doża ta' tacrolimus għandha tiġi aġġustata jekk ikun meħtieġ.

L-effetti ta' sustanzi attivi oħra fuq il-farmakokinetika ta' omeprazole

Inibituri ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Minhabba li omeprazole huwa metabolizzat permezz ta' CYP2C19 u CYP3A4, sustanzi attivi li huma magħrufa li jinibixxu CYP2C19 jew CYP3A4 (bħal clarithromycin u voriconazole) jistgħu jwasslu għal zieda fil-livelli ta' omeprazole fis-serum billi jnaqqsu r-rata ta' metaboliżmu ta' omeprazole. Il-kura b'voriconazole fl-istess ħin wasslet għall-esponiment ta' omeprazole ta' aktar mid-doppju. Minhabba li dozi għoljin ta' omeprazole kienu tollerati sew, tibdil fid-doża ta' omeprazole ġeneralment ma tkunx meħtieġa. Madankollu, aġġustament fid-doża għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'indeboliment qawwi tal-fwied u jekk tkun indikata kura għal żmien twil.

Indutturi ta' CYP2C19 u/jew CYP3A4

Sustanzi attivi li huma magħrufa li jinduċu CYP2C19 jew CYP3A4 jew it-tnejn li huma (bħal rifampicin u St John's wort) jistgħu jwasslu għal livelli mnaqqsa ta' omeprazole fis-serum billi jzidu r-rata tal-metaboliżmu ta' omeprazole.

4.6 Tqala u treddigh

Ir-riżultati minn tlett studji prospettivi epidemjoloġiċi (aktar minn 1000 riżultat ta' esponiment) ma jindikaw l-ebda effetti avversi ta' omeprazole fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija li tkun għada kif twieldet. Omeprazole jista' jintuza waqt it-tqala.

Omeprazole johroġ mal-halib tas-sider iżda mhux probabbli li jkollu effett fuq it-tarbija meta jingħataw dozi terapewtiċi.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Losec mhux probabbli li jeffettwa il-hila biex issuq u thaddem magni. Reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jsehhu (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjenti jigu affettwati huma m'għandhomx isuqu jew ihaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar effetti sekondarji komuni (minn 1-10% tal-pazjenti) huma uġigh ta' ras, uġigh addominali, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku u tqalligh/rimettar.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina li ġejjin kienu identifikati jew suspettati fil-programm ta' provi kliniċi għal omeprazole u wara li tqiegħed fis-suq. L-ebda minnhom ma nstabu li kienu relatati mad-doża. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond il-frekwenza u l-Klassi tas-Sistemi u tal-Organi (SOC). Il-kategoriji ta' frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna ($\geq 1/10$), Komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), Mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), Rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), Rari ħafna ($< 1/10,000$), Mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data diaponibbli).

SOC/frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika	
Rari:	Lewkopenija, tromboċitopenija
Rari ħafna:	Agranuloċitosi, panċitopenija
Disturbi fis-sistema immuni	
Rari:	Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva eż. deni, angjoedima u xokk/reazzjoni anafilattiku/a
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni	
Rari:	Iponatrimija
Rari ħafna	Ipomagnesimja
Disturbi psikjatriċi	
Mhux komuni:	Insomnija
Rari:	Aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni
Rari ħafna:	Aggressjoni, alluċinazzjonijiet
Disturbi fis-sistema nervuża	
Komuni:	Uġigh ta' ras
Mhux komuni:	Sturdament, parestesija, hedla tan-nghas
Rari:	Disturb fit-togħma
Disturbi fl-għajnejn	
Rari:	Vista mċajpra
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika	
Mhux komuni:	Vertiġini
Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali	
Rari:	Bronkospazmu
Disturbi gastro-intestinali	
Komuni:	Uġigh addominali, stitikezza, dijarea, gass, tqalligh/rimettar
Rari:	Halq xott, stomatite, kandidjasi gastrointestinali
Disturbi fil-fwied u fil-marrara	
Mhux komuni:	Żieda fl-enzimi tal-fwied
Rari:	Epatite bis-suffejra jew mingħajrha
Rari ħafna:	Falliment epatiku, encefalopatija f'pazjenti b'mard tal-fwied diġà eżistenti
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda	
Mhux komuni:	Deramtitte, ħakk, raxx, urtikarja
Rari:	Alopeċja, fotosensittività
Rari ħafna:	Eritema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolisi epidermali tossika (TEN)
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi	
Rari:	Artralġja, mijalġja
Rari ħafna:	Dgħufija fil-muskoli

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinara	
Rari:	Nefrite tal-interstizju
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider	
Rari hafna:	Ġinekomastja
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jinghata	
Mhux komuni:	Telqa tal-ġisem, edima periferali
Rari:	Żieda fil-hruġ tal-gharaq

4.9 Doża eċċessiva

Hemm informazzjoni limitata dwar l-effetti ta' dozi eċċessivi ta' omeprazole fil-bnedmin. Fil-letteratura medika, dozi sa 560 mg ġew deskritti, u nkisbu rapporti rari meta dozi waħdiet mill-halq laħqu sa 2,400 mg omeprazole (120 darba d-doża klinika li soltu tkun rrakkomandata). Tqalligh, rimettar, sturdament, uġigh fl-addome, dijarea u uġigh ta' ras kienu rappurtati. Ukoll apatija, depressjoni u konfużjoni kienu deskritti f'kazijiet waħdiet.

Is-sintomi deskritti b'konnessjoni ma' doża eċċessiva ta' omeprazole kienu mumentanji, u l-ebda effett serju ma kien irrappurtat. Ir-rata ta' eliminazzjoni ma nbidlitx (kinetika *first order*) b'doži aktar għoljin. Kura, jekk meħtieġa, hija kura tas-sintomi.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Inibitur tal-Pompa tal-Proton, Kodiċi ATC: A02BC01

Kif jaħdem

Omeprazole, tahlita ta' numru ugwali ta' żewġ enantjomeri li jduru lejn il-lemin u lejn ix-xellug inaqas is-sekrezżjoni tal-aċidu mill-istonku permezz ta' mekkaniżmu speċifiku hafna. Huwa inibitur speċifiku tal-pompa tal-aċidu fiċ-ċellola parjetali. Jaħdem malajr hafna u jipprovdi kontroll permezz ta' inibizzjoni reversibbli tal-aċidu fl-istonku b'doża mogħtija darba kuljum.

Omeprazole huwa bażi dghajef u jiġi kkonċentrat u mibdul fil-forma attiva fl-ambjent aċiduż hafna tal-kanalikuli fiċ-ċelluli ta' goċ-ċelluli parjetali, fejn jinibixxi l-enzima $H^+ K^+ -ATPase$ - il-pompa tal-aċidu. Dan l-effett fuq l-aħhar pass tal-proċess ta' kif jiġi forma l-aċidu fl-istonku jiddependi mid-doża u jipprovdi inibizzjoni effettiva hafna kemm tas-sekrezżjoni tal-aċidu bażali kif ukoll s-sekrezżjoni ta' l-aċidu stimulata, irrispettivament mill-istimolu.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti farmakodinamiċi kollha li deħru jistgħu jiġu spjegati bl-effett ta' omeprazole fuq is-sekrezżjoni tal-aċidu.

Effett fuq is-sekrezżjoni tal-aċidu mill-istonku

Għoti ta' doži ta' omeprazole orali darba kuljum jipprovdi inibizzjoni malajr u miżmuma tas-sekrezżjoni tal-aċidu mill-istonku waqt il-jum u bil-lejl b'effett massimu jinkiseb fi żmien 4 ijiem ta' kura. B'omeprazole 20 mg, tnaqqis medju ta' mill-anqas 80% tal-aċidità fl-istonku fuq perjodu ta' 24-sieġha imbagħad jinżamm f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu, bi tnaqqis medju fl-oghla punt fejn johroġ l-aċidu wara stimolazzjoni ta' pentagastrin ikun madwar 70% 24 sieġha wara li tinghata d-doża.

Għoti ta' doži ta' omeprazole 20 mg jżomm pH fl-istonku ta' ≥ 3 għal medja ta' 17-il sieġha mill-perjodu ta' 24-sieġha f'pazjenti b'ulċera fid-duwodenu.

B'konsegwenza tat-tnaqqis fis-sekrezżjoni tal-aċidu u tal-aċidità fl-istonku, omeprazole inaqas/iġib lura għan-normal l-esponiment tal-esofagu għall-aċidu b'mod dipendenti mad-doża f'pazjenti b'mard ta' rifluss gastroesofagali. L-inibizzjoni ta' sekrezżjoni tal-aċidu huwa relatat mal-erja taħt il-kurva

bejn il-konċentrazzjoni fil-plażma- hin (AUC) ta' omeprazole u mhux mal-konċentrazzjoni fil-plażma infisha f'hin partikolari.

L-ebda takifilassi ma giet osservata waqt kura b'omeprazole.

Effetti ohrajn relatati mal-inibizzjoni tal-aċidu

Waqt kura fit-tul ċesti glandulari fl-istonku kienu rrapportati bi frekwenza x'aktarx oghla. Dawn il-bidliet huma konsegwenza fiżjoloġika ta' inibizzjoni qawwija tal-aċidu fl-istonku, huma beninni u jidher li huma reversibbli.

Tnaqqis fl-aċidità bi kwalunkwe mezz inkluz bl-inibituri tal-pompa tal-proton, iżid l-ghadd ta' batteri li normalment jinsab fil-passaġġ gastro-intestinali. Kura b'mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku jista' jwassal ghal riskju ftit akbar ta' infezzjonijiet gastro-intestinali bhal *Salmonella* u *Campylobacter*.

Omeprazole bhal mediċini l-ohra li jibblokkaw l-aċidu jistgħu jnaqqsu l-assorbiment tal-vitamina B₁₂ (Cyanocobalamin) minhabba l-pożizzjoni ta' akloridrija. Dan għandu jġi meqjus f'pazjenti b' nuqqas ta' hażna fil-ġisem jew fatturi ta' riskju għal tnaqqis fl-assorbiment tal-vitamina B₁₂ fuq terapija għal tul ta' żmien

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Omeprazole u omeprazole magnesium jtkissru fl-aċidu u għalhekk jingħataw b'mod orali bħala granuli b'kisja enterika f'kapsuli jew pilloli. L-assorbiment ta' omeprazole isehh malajr, bl-oghla livelli fil-plażma isehhu madwar siegħa-sagħtejn wara d-doża. L-assorbiment ta' omeprazole isehh fil-musrana ż-żgħira u normalment jintemm fi żmien 3-6 sigħat. It-tehid tal-ikel miegħu m'għandu l-ebda effett fuq il-bijodisponibilità. Id-disponibilità sistemika (bijodisponibilità) ta' omeprazole minn doża waħda orali ta' omeprazole hija madwar 40%. Wara doži ripetuti mogħtija darba kuljum, il-bijodisponibilità tizdied għal madwar 60%.

Distribuzzjoni

Il-volum ta' distribuzzjoni apparenti f'individwi b'saħħithom huwa madwar 0.3 l/kg piż tal-ġisem. Omeprazole huwa 97% imwahaal mal-proteina fil-plażma.

Metaboliżmu

Omeprazole jġi metabolizzat għal kollox bis-sistema cytochrome P450 (CYP). Il-parti l-kbira tal-metaboliżmu tiegħu jiddependi fuq CYP2C19 li jġi espress b'mod polimorfiku, responsabbli għall-formazzjoni ta' hydroxyomeprazole, il-metabbolu ewlieni fil-plażma. Il-parti li jibqa' tiddependi fuq iżoforma ohra speċifika, CYP3A4, responsabbli għall-formazzjoni ta' omeprazole sulphone. B'konsegwenza ta' l-affinità għolja ta' omeprazole għal CYP2C19, jista' jkun hemm inibizzjoni kompetittiva u interazzjonijiet metabolici bejn il-mediċini ma' sottostrati ohra ta' CYP2C19. Madankollu, minhabba affinità baxxa għal CYP3A4, omeprazole ma jistax jinibixxi l-metaboliżmu ta' sottostrati ohra ta' CYP3A4.

Madwar 3% tal-popolazzjoni Kawkaża u 15-20% tal-popolazzjonijiet Azjatiċi m'għandhomx enzima CYP2C19 li taħdem u jissejhu metabolizzaturi dgħajfin. F'individwi bhal dawn il-metaboliżmu ta' omeprazole x'aktarx jġi katalizzat b'CYP3A4. Waqt li jingħata 20 mg omeprazole darba kuljum b'mod ripetut, l-AUC medja kienet minn 5 sa 10 darbiet oghla f'metabolizzaturi dgħajfin meta mqabbla ma' individwi li għandhom l-enzima CYP2C19 li taħdem (metabolizzaturi estensivi). Il-medja tal-oghla konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu wkoll oghla, bi 3 sa 5 darbiet. Dawn is-sejbiet m'għandhomx effett fuq il-pożoloġija ta' omeprazole. Flimkien ma' dan, omeprazole m'għandux effett inibitorju fuq l-enzimi prinċipali CYP.

Tnehhija

Il-half life ta' l-eliminazzjoni mill-plażma ta' omeprazole is-soltu tkun iqsar minn siegħa kemm għal doża waħda kif ukoll għal doži ripetuti mogħtija darba kuljum. Omeprazole jitneħħa għal kollox mill-plażma bejn id-doži u m'għandu l-ebda tendenza li jakkumula meta jingħata darba kuljum. Kważi

80% ta' doża orali ta' omeprazole titnehha bhala metaboli fl-awrina, il-bqija fl-ippurgar, l-aktar li jkun geġ mis-sekrezżjoni tal-bila.

L-AUC ta' omeprazole tiżdied meta jinghata b'mod ripetut. Din iż-żieda tiddependi mid-doża u twassal għal relazzjoni bejn id-doża-AUC mhux lineari wara li jinghata b'mod ripetut. Din id-dipendenza mal-hin u mad-doża ssehh minhabba li l-metaboliżmu first-pass u t-tnehhija sistemika jonqsu probabbli minhabba inibizzjoni tal-enzima CYP2C19 minn omeprazole u/jew il-metaboli tiegħu (eż is-sulphone).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Il-metaboliżmu ta' omeprazole f'pazjenti b'funzjoni hażina tal-fwied ikun imxekkel, u dan iwassal għal żieda fl-AUC. Omeprazole ma wera l-ebda tendenza li jakkumula b'doži mogħtija darba kuljum.

Indeboliment fil-funzjoni tal-kilwa

Il-farmakokinetika ta' omeprazole, inkluż bijodisponibilità sistemika u rata ta' eliminazzjoni, ma jinbidlux f'pazjenti b'funzjoni renali mnaqsa.

Anzjani

Ir-rata ta' metaboliżmu ta' omeprazole hija xi ftit jew wisq imnaqsa f'individwi anzjani (età minn 75-79 sena).

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Iperplazja taċ-ċelluli-ECL fl-istonku u karċinojdi, dehru fi studji għal tul ta' hajja fil-firien ikkurati b'omeprazole. Dawn il-bidliet isehhu minhabba ipergastrinemija għal tul ta' żmien minhabba l-inibizzjoni tal-acidu. Sejbiet simili saru wara kura b'antagonisti tar-riċettur- H_2 , inibituri tal-pompa tal-proton u wara fundektomija parzjali. Għalhekk, dawn il-bidliet mhux gejjin minn effett dirett ta' xi susanza attiva partikolari.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.2 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Microcrystalline cellulose,
glyceryl monostearate,
hydroxypropylcellulose,
hydroxypropyl methylcellulose,
magnesium stearate,
methacrylic acid co-polymer,
sferi taz-zokkor,
paraffin,
macrogol (polyethylene glycol),
polysorbate,
polyvinylpyrrolidone crosslinked,
sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH),
sodium stearyl fumarate,
talc,
triethyl citrate,
iron oxide,
titanium dioxide

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Folja: Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folja tal-aluminju.

10 mg: 7, 14, 28 pillola.

20 mg: 7, 14 pillola

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema <u għal immaniġġar ieħor>

L-ebda htigijiet speċjali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL- PAKKETT TA' BARRA U L-PAKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA GHALL-FOLJA
KARTUNA GHALL-FLIXKUN
TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg kapsuli ibsin
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg kapsuli ibsin
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg kapsuli ibsin
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula fiha 10 mg omeprazole
Kull kapsula fiha 20 mg omeprazole.
Kull kapsula fiha 40 mg omeprazole.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar taghrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin

Folja:

7 kapsuli
14-il kapsula
15-il kapsula
28 kapsula
30 kapsula
35 kapsula (10 mg biss)
50 kapsula (10 mg u 20 mg biss)
56 kapsula (10 mg biss)
60 kapsula (20 mg biss)
84 kapsula (10 mg u 20 mg biss)

Flixkun HDPE:

5 kapsuli
7 kapsuli
10 kapsuli (10 mg u 20 mg biss)
14-il kapsula
15-il kapsula
28 kapsula
30 kapsula
50 kapsula (10 mg u 20 mg biss)
56 kapsula (10 mg biss)
60 kapsula

100 kapsula (10 mg u 20 mg biss)
140 kapsula
280 kapsula
700 kapsula

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra il-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

Għal użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA' JINTLAHAQX U MA' JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma' jintlahaqx u ma' jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

Kartuna għall-folja: Ahžen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.

Kartuna għall-flixxun u t-tikketta: Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR- RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT – TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

12. NUMRU(I) TA' L- AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL- LOTT

Lot

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali jinghata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg

Pakkett għall-isptar: Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDICINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg kapsuli
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg kapsuli
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg kapsuli
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL- PAKKETT TA' BARRA U L-PAKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA GHALL-FLIXKUN
KARTUNA GHALL-FOLJA
PORTAFOLL
TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg pilloli gastroreżistenti
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola gastroreżistenti fiha 10 mg omeprazole
Kull pillola gastroreżistenti fiha 20 mg omeprazole.
Kull pillola gastroreżistenti fiha 40 mg omeprazole.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli gastroreżistenti

Folja:

5 pilloli

7 pilloli

10 pilloli (10 mg biss)

14-il pillola

15-il pillola

25 pillola

28 pillola

30 pillola

50 pillola

56 pillola

60 pillola

84 pillola (10 mg u 20 mg biss)

90 pillola (10 mg u 20 mg biss)

98 pillola (20 mg biss)

100 pillola

560 pillola

Folja mtaqqba biex tinqata doża wahda

25 pillola x 1

28 pillola x 1

50 pillola x 1

56 pillola x 1 (10 mg u 20 mg biss)
100 pillola x 1 (20 mg biss)

Flixxun HDPE:

7 pilloli
14-il pillola
15-il pillola
28 pillola
30 pillola
50 pillola (10 mg u 20 mg biss)
56 pillola (20 mg biss)
100 pillola
140 pillola (10 mg u 20 mg biss)
200 pillola (20 mg biss)
280 pillola (20 mg biss)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra il-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA' JINTLAHAQX U MA' JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma' jintlaħaqx u ma' jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Kartuna għall-folja u l-portafoll: Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità
Kartuna għall-flixxun u t-tikketta: Żomm il-kontenitur magħluq sew sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR- RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT – TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

12. NUMRU(I) TA' L- AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL- LOTT

Lot

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg

Pakkett għall-isptar: Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluz il-Braille hija aċċettata

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
--

FOLJA

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDICINALI
--

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg pilloli gastroreżistenti
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL- PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab għal soluzzjoni għall-infużjoni
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kunjett fih omeprazole sodium ekwivalenti għal 40 mg omeprazole

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Kull kunjett fih disodium edetate u sodium hydroxide.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

kunjett wiehed x 40 mg

5 kunjetti x40 mg

10 kunjetti x40 mg

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Użu għal gol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA' JINTLAHAQX U MA' JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma' jintlahaqx u ma' jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR- RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT – TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

12. NUMRU(I) TA' L- AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL- LOT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali jinghata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pakkett għall-isptar: Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ II-PAKKETTI Ż- ŻGHAR EWLENIN KUNJETT

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA
--

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab għall-infużjoni
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole
iv

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA
--

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI
--

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL- PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni (I+II)
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kunjett fih omeprazole sodium ekwivalenti għal 40 mg omeprazole

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

I. Trab għall-injezzjoni
Kull kunjett fih sodium hydroxide.

II. Solvent għall-injezzjoni
Kull ampulla fiha citric acid monohydrate, macrogol 400 u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 x 40 mg
5x40 mg
10x40 mg

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra il-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA' JINTLAHAQX U MA' JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma' jintlahaqx u ma' jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR- RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT – TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

12. NUMRU(I) TA' L- AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL- LOT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

N/A (Pakkett għall-isptar)

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ II-PAKKETTI Ż- ŻGHAR EWLENIN KUNJETT

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA
--

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab għall-injezzjoni
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole
iv

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA
--

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI
--

6. OHRAJN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż- ŻGHAR EWLENIN AMPULLA

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA
--

Solvent għar-rikostituzzjoni ta' Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) soluzzjoni għall-injezzjoni
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
iv

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA
--

3. DATA META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI
--

10 ml

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL- PAKKETT TA' BARRA U L-PAKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

**KARTUNA GHALL-PRODOTT LI JINGHATA MINGHAJR RIĊETTA (OTC) GHALL-FLIXKUN KARTUNA GHALL-FOLJA PORTAFOLL
TIKKETTA GHALL-FLIXKUN**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola gastroreżistenti fiha 10 mg omeprazole
Kull pillola gastroreżistenti fiha 20 mg omeprazole.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli gastroreżistenti

Folja:

7 pilloli

14-il pillola

28 pillola (10 mg biss)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA' JINTLAHAQX U MA' JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma' jintlahaqx u ma' jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Kartuna għall-folja Ahżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR- RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT – TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

12. NUMRU(I) TA' L- AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL- LOTT

Lot

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali jinghata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-kura fuq perjodu qasir ta' sintomi ta' rifluss (eż. hruq ta' stonku, rigurgitazzjoni tal-aċidu) fl-adulti.

Hu pillola waħda ta' 20 mg jew żewġ pilloli ta' 10 mg darba kuljum għal 14-il jum. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk inti jkun għad għandek is-sintomi wara dan il-perjodu.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDICINALI

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti
[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
omeprazole

2. ISEM TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT –TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

3. DATA TA' META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

FULJETTI TA' TAGHRIF

Ghall-prodotti mediċinali li jinghataw b'riċetta

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg kapsuli ibsin

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg kapsuli ibsin

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg kapsuli ibsin

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Omeprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terga taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek.
- Din il-medicina giet moghtija lilek. M'ghandekx tghaddiha lill persuni ohra. Tista' tagħmlilhom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tieghek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib, jew lill-ispizjar tieghek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Losec u għal xiex jintuża
2. Qabel ma tiehu Losec
3. Kif għandek tiehu Losec
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif tahzen Losec
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU LOSEC U GHALXIEX JINTUŻA

Losec fih is-sustanza attiva msejha omeprazole. Din tippartjeni għal grupp ta' medicini li jissejhu 'inibituri tal-pompa tal-proton'. Huma jahdmu billi jnaqqsu l-ammont ta' acidu li jipproduci l-istonku tieghek.

Losec jintuża biex jikkura il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Fl-adulti:

- 'Mard ta' rifluss gastroesofagali' (GERD). Dan huwa fejn l-acidu mill-istonku jagħddi gewwa l-gerżuma tal-ikel (it-tubu li jaqqgħad il-grizmejn mal-istonku tieghek) u jikkawża uġiġh, infjammazzjoni u hruq ta'stonku.
- Ulċeri fil-parti ta' fuq tal-intestini (ulċera duodenali) jew tal-istonku (ulċera gastrika).
- Ulċeri li huma infettati minn batterji msejha '*Helicobacter pylori*'. Jekk għandek din il-kundizzjoni it-tabib tieghek jista' wkoll jiktiblek antibijotiċi biex tikkura l-infezzjoni u b'hekk l-ulċera tfiq.
- Ulċeri kkawżati minn medicini jissejhu NSAIDs (Medicini Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi). Losec jista' jintuża wkoll biex iwaqqaf ulċeri milli jiffurmaw jekk tkun qed tiehu l-NSAIDs
- Indigestjoni ta' acidu li jista' jikkawża uġiġh u skonfort fl-istonku (dispepsja)
- Hafna acidu fl-istonku ikkawżat minn tkabbir żejjed ta' ċelluli fil-frixa (sindrome ta' Zollinger-Ellison).

Fit-tfal:

Tfal li għandhom aktar minn sena u jiżnu ≥ 10 kg

- 'Mard ta' rifluss gastroesofagali' (GERD). Dan huwa fejn l-acidu mill-istonku jagħddi gewwa l-gerżuma tal-ikel (it-tubu li jaqqgħad il-grizmejn mal-istonku tieghek) u jikkawża uġiġh, infjammazzjoni u hruq ta'stonku.
Fit-tfal is-sintomi ta' din il-kundizzjoni jistgħu jinkludu li ittella' l-ikel lura fil-halq mill-istonku (rigurġitazzjoni), tirremetti u ma żżidx fil-piż.

Tfal u adoloxxenti li għandhom aktar minn 4 snin

- Ulċeri li huma infettati minn batterji msejha '*Helicobacter pylori*'. Jekk ibnek/bintek għandhom din il-kundizzjoni it-tabib tiegħek jista' wkoll jikteb antibijotiċi biex tiġi kkurata l-infezzjoni u b'hekk l-ulċera tfiq.

2. QABEL MA TIEHU LOSEC

Tihux Losec

- jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal omeprazole jew sustanzi oħra ta' Losec.
- jekk int allergiku għal mediċini li fihom inibituri tal-pompa tal-proton (eż. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- jekk qed tiehu mediċina li fiha nelfinavir (użata għall-infezzjoni tal-HIV)

Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tiehu Losec.

Oqghod attent hafna b'Losec

Losec jista' jaħbi xi sintomi ta' mard iehor. Għalhekk jekk xi wahda minn dawn li ġejjin tiġri lilek, qabel ma tibda tiehu Losec jew waqt li qed tiehdu, kellem lit-tabib tiegħek minnufih:

- Titlef hafna piż għall-ebda raġuni u għandek problemi biex tibra'.
- Ikollok uġiġh fl-istonku jew indigestjoni.
- Tibda tirremetti l-ikel jew id-demm.
- Tgħaddi ppurgar iswed (ppurgar bid-demm).
- Jekk ikollok dijarea qawwiya jew persistenti, minhabba li omeprazole ġie assoċjat ma' zieda żgħirafid-dijarea minn infezzjoni.
- Jekk għandek problemi serji fil-fwied.

Jekk inti tiehu Losec għal tul ta' żmien (aktar minn sena) it-tabib tiegħek x'aktarx iżommok taħt sorveljanza regolari. Inti għandek tirrapporta kwalunkwe sintomi u ċirkustanzi godda jew eċċezzjonali kull meta tara lit-tabib tiegħek.

Meta tiehu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qieghed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki daww mingħajr riċetta. Dan għaliex Losec jista' jaffettwa l-mod kif jaħdmu xi mediċini, u xi mediċini jista' jkollhom effett fuq Losec.

M'għandekx tingħata Losec jekk qed tiehu mediċina li fiha **nelfinavir** (tintuża biex tikkura l-infezzjoni tal-HIV).

M'għandekx tiehu Losec jekk qed tiehu xi wahda minn dawn il-mediċini:

- Ketoconazole, itraconazole jew voriconazole (użati biex jikkuraw infezzjonijiet ikkawżati minn fungu).
- Digoxin (jintuża biex jikkura problemi tal-qalb).
- Diazepam (jintuża biex jikkura ansjetà, biex jirrilassa l-muskoli jew għall-epilessija).
- Phenytoin (jintuża għall-epilessija). Jekk qed tiehu phenytoin it-tabib tiegħek għandu jsegwik mill-qrib meta tibda tiehu jew twaqqaf Losec.
- Rifampicin (jintuża biex jikkura t-tuberkulożi)
- Atazanavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV)
- Tacrolimus (f'każi ta' trapjant tal-organi)
- St John's wort (*Hypericum perforatum*) (jintuża għall-kura ta' depressjoni hafifa)
- Cilostazol (jintuża għall-kura ta' intermittent claudication)
- Saquinavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV)
- Clopidogrel (jintuża biex ma jkunx hemm taqgħqid tad-demm (trombi))

Jekk it-tabib tiegħek ippreskriva l-antibiotiċi amoxicillin u clarithromycin kif ukoll Losec sabiex tikkura l-ulċeri kkawżati minn infezzjoni ta' *Helicobacter pylori*, huwa importanti ħafna li tgħid lit-tabib tiegħek dwar kwalunkwe mediċini oħra li qed tiehu.

Meta tiehu Losec ma' l-ikel u max-xorb

Tista tiehu l-pilloli mal-ikel jew fuq stonku vojta

Tqala u treddigh

Qabel ma tiehu Losec, għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, jew qed tipprova toħroġ tqila. It- tabib tiegħek jiddeciedi jekk inti tistax tiehu Losec f'dan iż-żmien.

It-tabib tiegħek jiddeciedi jekk inti tistax tiehu Losec jekk inti qed tredda'.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Losec m'għandux jaffetwa l-hila li ssuq jew tuża xi għodda jew magni. Reazzjonijiet avversi għall-mediċina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jsejtnu (ara sezzjoni 4). Jekk tiġi affettwat m'għandekx issuq jew thaddem magni.

Tgħarif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Losec

Il-kapsuli Losec fihom lactose. Jekk it-tabib qallek li għandek xi intolleranza għal xi tipi ta' zokkor, għamel kuntatt mat-tabib tiegħek qabel tiehu din il-mediċina

3. KIF GHANDEK TIEHU LOSEC

Dejjem għandek tiehu Losec skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jgħidlek kemm-il kapsula tiehu u għalkemm żmien tibqa' teħodhom. Dan jiddependi mill-kundizzjoni li għandek u kemm għandek żmien.

Id-dożi li s-soltu jingħataw huma mnizzla hawn taht.

Adulti:

Biex tikkura sintomi ta' GERD bħal **ħruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu**

- Jekk it-tabib tiegħek isib li t-tubu li jaqqgħad il-grizmejn mal-istonku tiegħek(il-gerżuma tal-ikel) sarlu f'tit tal-ħsara, id-doża li s-soltu tingħata hija 20mg darba kuljum għal 4-8 ġimgħat. It-tabib jista jgħidlek tiehu doża ta' 40 mg għal 8 ġimgħat oħra jekk it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ikun għadu ma fieq.
- Id-doża normali la darba it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ikun fieq hija ta' 10 mg darba kuljum.
- Jekk it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ma saritlux ħsara, id-doża normali hija 10 mg darba kuljum.

Biex tikkura **ulċeri fl-parti ta' fuq tal-intestini** (ulċera duwodenali)

- Id-doża normali hija ta' 20 mg darba kuljum għal ġimgħatejn. It-tabib jista jgħidlek biex tiehu l-istess doża għal ġimgħatejn oħra jekk l-ulċera tiegħek tkun għada ma fiqitx.
- Jekk l-ulċera ma tfieqx kompletament , id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum għal 4 ġimgħat.

Biex tikkura **ulċeri fl-istonku** (ulċera gastrika)

- Id-doża normali hija ta' 20 mg darba kuljum għal 4 ġimgħat. It-tabib jista' jgħidlek biex tiehu l-istess doża għal ġimgħatejn oħra jekk l-ulċera tiegħek tkun għada ma fiqitx
- Jekk l-ulċera ma tfieqx kompletament, id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum għal 8 ġimgħat.

Biex **tipprevjeni ulċeri duwodenali u fl-istonku** milli jergħu ifiġġu

- Id-doża normali hija ta' 10mg jew 20mg darba kuljum. It-tabib jista iżidlek id-doża għal 40mg darba kuljum

Biex tikkura **ulċeri** duwodenali u fl-istonku **kkawżati minn NSAIDs** (Mediċini Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi)

- Id-doża li s-soltu tinghata hija ta' 20 mg darba kuljum għal bejn 4 u 8 ġimgħat.

Biex **tipprevjeni ulċeri** duwodenali u fl-istonku jekk qed tiehu **NSAIDs** (Mediċini Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi)

- Id-doża li s-soltu tinghata hija ta' 20 mg darba kuljum.

Biex tikkura **ulċeri kkawżati minn** infezzjoni ta' ***Helicobacter pylori*** u twaqqafhom milli jergħu jfiġġu

- Id-doża li s-soltu tinghata hija 20 mg Losec darbtejn kuljum għal ġimgħa.
- It-tabib jgħidlek ukoll biex tiehu żewġ antibijotiċi minn amoxicillin, clarithromycin u metronidazole.

Biex tikkura ħafna aċidu fl-istonku ikkawżat minn **tkabbir żejjed ta' ċelluli fil-frixa (Zollinger-Ellison syndrome)**

- Id-doża li s-soltu tinghata hija 60 mg kuljum.
- It-tabib jista' jaġġusta d-doża skont il-bżonnijiet tiegħek u jiddeċiedi għal kemm żmien għandek bżonn tiehu din il-mediċina

Tfal:

Biex tikkura sintomi ta' GERD **bħal hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu**

- Tfal il-fuq minn sena u piż tal-ġisem aktar minn 10 kg jistgħu jiehdu Losec. Id-doża għat-tfal hija ibbażata fuq il-piż tat-tfal u t-tabib jiddeċiedi d-doża korretta.

Biex tikkura **ulċeri kkawżati minn** infezzjoni ta' ***Helicobacter pylori*** sabiex twaqqaf milli jergħu ifiġġu

- Tfal aktar minn 4 snin jistgħu jiehdu Losec. Id-doża għat-tfal hija bbażata fuq il-piż tat-tfal u t-tabib jiddeċiedi d-doża korretta.
- It-tabib se jippreskrivi wkoll żewġ antibijotiċi jisimhom amoxicillin u clarithromycin għal-ibnek bintek.

Meta tiehu din il-mediċina

- Huwa rakkomandat li tiehu l-kapsuli filgħodu
- Tista' tiehu l-kapsuli mal-ikel jew fuq stonku vojta
- Ibla' il-kapsuli shaħ ma' nofs tazza ilma. Tomghodx jew tkisser il-kapsuli. Dan għaliex il-kapsuli fihom pritkuni miksijin li jipproteġu l-pilloli milli jitkissru mill-aċidu tal-istonku. Huwa importanti li ma ssirx ħsara lil pritkuni

X'għandek tagħmel jekk int jew it-tfal għandkom problema biex tibilgħu il-kapsuli

- jekk int jew ibnek/bintek għandkom problema biex tibilgħu l-kapsuli:
 - iftaħ il-kapsuli u ibla' l-kontenut direttament u wara hu nofs tazza ilma, jew itfa' l-kontenut ġo nofs tazza ilma (mhux bil-gass) u ixorbu, kull meraq tal-frott aċiduż (eż. tuffieħ, laring u pineapple) jew pure tat-tuffieħ.
 - Dejjem hawwad it-tahlita eżatt qabel tixrobha (it-tahlita tkun imdardra). Imbagħad ixrob it-tahlita minnufih jew fi żmien 30 minuta
 - Biex tkun ċert li xrobt il-mediċina kollha, lahlah it-tazza tajjeb ħafna b'nofs tazza ilma u ixrobha. Il-biċċiet solidi fihom il-mediċina - tomghodhomx u tkissirhomx

Jekk tiehu Losec aktar milli suppost

Jekk tiehu aktar kapsuli Losec milli ippriskrevilek it-tabib, kellem lit-tabib jew spizjar tiegħek minnufih.

Jekk tinsa tiehu Losec

Jekk tinsa tiehu doża, hudha malli tiftakar. Madankollu jekk ikun wasal il-hin għad-doża li jkun imissek, aqbeż id-doża li tkun insejt. M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull pillola doża li tkun insejt tiehu.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, Losec jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk tinnota xi effetti sekondarji rari iżda serji minn dawn li ġejjin, ieqaf iehu Losec u kkuntattja tabib minnufih:

- Tisfir f'daqqa fis-sider, nefha f'xofftejk, f'ilsienek u fi grisżmejk jew f'gismek, raxx, iħossok hażin jew ikollok diffikultajiet biex tibla' (reazzjoni allergika qawwija)
- Hmura fil-gilda b'infafet u tqaxxir. Jista' jkun hemm infafet severi u fsada mix-xofftejn, mill-ghajnejn, mill-halq, mill-immieher u mill-ġenitali. Din tista tkun 'sindrome ta' Stevens-Johnson' jew 'nekrolizi epidermali tossika'
- Gilda safra, awrina skura jew gheja li jistgħu jkunu sintomi ta' problemi tal-fwied

Effetti sekondarji jistgħu jseħhu b'ċerti frekwenzi, li huma ddefiniti kif ġej:

Komuni hafna:	jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 li jużawh
Komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 100 li jużawh
Mhux komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 1,000 li jużawh
Rari:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 10,000 li jużawh
Rari hafna:	affects less than 1 minn kull 10,000 li jużawh
Mhux magħruf:	il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Effetti sekondarji komuni

- Uġigh ta' ras
- Effetti fuq l-istonku jew l-imsaren: dijarea, uġigh fl-istonku, stitikezza, gass.
- Tqalligh (dardir) jew rimettar.

Effetti sekondarji mhux komuni

- Nefha fis-saqajn u fl-għekiesi.
- Disturb fl-irqad (insomnja).
- Sturdament, thoss tingiż f'idejk u saqajk, thossok trid torqod.
- Thoss rasek iddur bik (vertigini).
- Tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demmm li juru kif qed jaħdem il-fwied.
- Raxx fil-gilda, raxx bil-boċċi (horriqija) u ħakk fil-gilda.
- Thossok ma tiflaħx b'mod ġenerali u nuqqas ta' enerġija.

Effetti sekondarji rari

- Problemi fid-demmm bhal nuqqas ta' ċelloli bojod jew plejtlits. Dan jista jikkawża dgħufija, tbengil jew ikabbar il-possibiltà ta' infezzjonijiet.
- Reazzjonijiet allergiċi, xi kultant qawwija hafna, li tinkludi nefha fix-xofftejn, fl-ilsien u fil-grisżmejn, deni u tisfir fis-sider.
- Livelli baxxi ta' sodium fid-demmm. Dan jista' jikkawża dgħufija, rimettar u bughawwigijiet.
- Thossok aġitat, konfuż u depressat.
- Tibdilet fil mod kif ittiegħem.
- Problemi bil-vista bhal vista mċajpra.
- F'daqq wahda thoss tisfir f'sidrek jew qtugh ta' nifs (bronkospazmu).
- Halq xott.
- Infjammazzjoni fuq ġewwa tal-halq.
- Infezzjoni msejjha "thrush" li tista' taffetwa l-imsaren u hija kkawżata minn fungu.
- Problemi fil-fwied, li jinkludu suffeġra li tista' tikkawża sfurija fil-ġilda, awrina skura, u gheja.

- Xagħar li jehfief (alopecja).
- Raxx fil-ġilda meta tiġi esposta għax-xemx.
- Uġiġh fil-ġogi (artralġja) jew uġiġh fil-muskoli (mijalġja).
- Problemi qawwiya fil-kliewi (nefrite tal-interstizju).
- Żieda fl-gharaq.

Effetti sekondarji rari hafna

- Tibdil fl-ġhadd tad-demem li jinkludi agranuloċitosi (nuqqas ta' ċelloli bojod tad-demem).
- Aggressjoni.
- Tara', thoss u tisma affarijiet li ma jkunux hemm (allucinazzjonijiet).
- Problemi qawwiya fil-fwied li jwasslu għal insuffiċjenza tal-fwied u infjammazzjoni tal-mohħ.
- Raxx qawwi jew infafet jew tqaxxir tal-ġilda li jfiegġ f'daqqa waħda. Dan jista' jkun assoċjat ma' deni qawwi u uġiġh fil-ġogi (Erythema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekroliżi epidermali tossika).
- Dghufija fil-muskoli.
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Ipomagnesimja

Losec jista' f'każijiet rari jaffetwa ċ-ċelloli bojod tad-demem u jwassal għal immunità dghajfa. Jekk għandek xi infezzjoni b'sintomi bħal deni fejn il-kundizzjoni ġenerali tiegħek hija hażina **hafna** jew deni b'sintomi ta' infezzjoni lokali bħal uġiġh fl-ġhonq, fil-ġriżmejn jew fil-ħalq jew diffikultajiet biex tgħaddi l-awrina, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih, sabiex tiġi eskluża l-possibiltà li m'hemmx nuqqas ta' ċelloli bojod fid-demem (agranuloċitozi) permezz ta' test tad-demem. Huwa importanti li inti tagħti informazzjoni dwar il-medicina tiegħek f'dan il-waqt.

M'għandekx tkun mħasseb b'din il-lista ta' effetti sekondarji li huma possibbli. Jista' jkun li ma jkollok l-ebda waħda minnhom. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumx imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAHZEN LOSEC

- Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
- Tużax Losec wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett wara EXP. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar
- Tahzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
- Ahžen din il-medicina fil-pakkett originali (folja) jew żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità
- Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill ispiżjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx b'żonn. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Losec:

- Is-sustanza attiva hi omeprazole. Il-kapsuli Losec fihom 10 mg, 20 mg jew 40 mg ta' omeprazole.

- Is-sustanzi l-oħra huma disodium hydrogen phosphate dihydrate, hydroxypropylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose, lactose anhydrous, magnesium stearate, mannitol, methacrylic acid co-polymer, microcrystalline cellulose, macrogol (polyethylene glycol), sodium lauryl sulphate, iron oxide, titanium dioxide, ġelatina, linka tal-istampar (li fiha shellac, ammonium hydroxide, potassium hydroxide u iron oxide iswed).

Id-Dehra ta' Losec u l-kontenuti tal-pakkett:

- Kapsuli Losec 10 mg għandhom korp roża, immarkat 10 u għatu roża immarkata A/OS.
- Kapsuli Losec 20 mg għandhom korp roża immarkat 20 u għatu aħmar jagħti fil-kanella immarkat A/OM.
- Kapsuli Losec 40 mg għandhom korp aħmar jagħti fil-kanella immarkat 40 u għatu aħmar jagħti fil-kanella immarkat A/OL.

Daqs tal-pakketti:

- 10 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60 jew 100 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula
 - o Folji ta' 7, 14, 15, 28, 30, 35, 50, 60 jew 84 kapsula.
- 20 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 5, 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 60 jew 100 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula
 - o Folji ta' 7, 14, 15, 28, 30, 50, 60 jew 84 kapsula.
- 40 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 5, 7, 14, 15, 28, 30, jew 60 kapsula; pakketti għall-isptar ta' 140, 280 jew 700 kapsula
 - o Folji ta' 7, 14, 15, 28, jew 30, 50, 60 jew 84 kapsula.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroreżistenti

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroreżistenti

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg pilloli gastroreżistenti

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Omeprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek.
- Din il-medicina giet moghtija lilek. M'ghandekx tghaddiha lill-persuni ohra. Tista' taghmlihom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bhal tieghek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok ghid lit-tabib, jew lill-ispizjar tieghek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Losec u għal xiex jintuża
2. Qabel ma tiehu Losec
3. Kif għandek tiehu Losec
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif tahzen Losec
6. Aktar taghrif

1. X'INHU LOSEC U GHALXIEX JINTUŻA

Il-pilloli gastroreżistenti Losec fihom is-sustanza attiva msejha omeprazole. Din tippartjeni għal grupp ta' medicini li jissejhu 'inibituri tal-pompa tal-proton'. Huma jahdmu billi jnaqqsu l-ammont ta' acidu li jipproduci l-istonku tieghek.

Losec jintuża biex jikkura il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Fl-adulti:

- 'Mard ta' rifluss gastroesofagali' (GERD). Dan huwa fejn l-acidu mill-istonku jagħddi għewwa l-gerżuma tal-ikel (it-tubu li jaqqgħad il- grizmejn mal-istonku tieghek) u jikkawża uġiġh, infjammazzjoni u hruq ta' stonku.
- Ulċeri fil-parti ta' fuq tal-intestini (ulċera duodenali) jew tal-istonku (ulċera gastrika).
- Ulċeri li huma infettati minn batterji msejha '*Helicobacter pylori*'. Jekk għandek din il-kundizzjoni it-tabib tieghek jista' wkoll jiktiblek antibijotiċi biex tikkura l-infezzjoni u b'hekk l-ulċera tfiq.
- Ulċeri kkawżati minn medicini jissejhu NSAIDs (Medicini Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi). Losec jista' jintuża wkoll biex iwaqqaf ulċeri milli jiffurmaw jekk tkun qed tiehu l-NSAIDs
- Indigestjoni ta' acidu li jista jikkawża uġieħ u skonfort fl-istonku (dispepsja)
- Hafna acidu fl-istonku ikkawżat minn tkabbir żejjed ta' ċelluli fil-frixa (sindrome ta' Zollinger-Ellison).

Fit-tfal:

Tfal li għandhom aktar minn sena u jiżnu ≥ 10 kg

- 'Mard ta' rifluss gastroesofagali' (GERD). Dan huwa fejn l-acidu mill-istonku jagħddi għewwa l-gerżuma tal-ikel (it-tubu li jaqqgħad il- grizmejn mal-istonku tieghek) u jikkawża uġiġh, infjammazzjoni u hruq ta' stonku.
Fit-tfal is-sintomi ta' din il-kundizzjoni jistgħu jinkludu li ittella' l-ikel lura fil-halq mill-istonku (rigurgitazzjoni), tirremetti u ma żżidx fil-piż.

Tfal u adoloxxenti li għandhom aktar minn 4 snin

- Ulċeri li huma infettati minn batterji msejja *‘Helicobacter pylori’*. Jekk ibnek/bintek għandhom din il-kundizzjoni it-tabib tiegħek jista’ wkoll jikteb antibijotiċi biex tiġi kkurata l-infezzjoni u b’hekk l-ulċera tfiq.

2. QABEL MA TIEHU LOSEC

Tihux Losec

- jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal omeprazole jew sustanzi oħra ta’ Losec.
- jekk int allergiku għal mediċini li fihom inibituri tal-pompa tal-proton (eż. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- jekk qed tiehu mediċina li fiha nelfinavir (użata għall-infezzjoni tal-HIV)

Jekk m’intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tiehu Losec.

Oqghod attent hafna b’Losec

Losec jista’ jaħbi xi sintomi ta’ mard iehor. Għalhekk jekk xi wahda minn dawn li ġejjin tiġri lilek, qabel ma tibda tiehu Losec jew waqt li qed tiehdu, kellem lit-tabib tiegħek minnufih:

- Titled hafna piż għall-ebda raġuni u għandek problemi biex tibra’.
- Ikollok uġiġh fl-istonku jew indigestjoni.
- Tibda tirremetti l-ikel jew id-demm.
- Tgħaddi ppurgar iswed (ppurgar bid-demm).
- Jekk ikollok dijarea qawwija jew persistenti, minhabba li omeprazole ġie assoċjat ma’ zieda żgħira fid-dijarea minn infezzjoni.
- Jekk għandek problemi serji fil-fwied.

Jekk inti tiehu Losec għal tul ta’ żmien (aktar minn sena) it-tabib tiegħek x’aktarx iżommok taħt sorveljanza regolari. Inti għandek tirrapporta kwalunkwe sintomi u ċirkustanzi godda jew eċċezzjonali kull meta tara lit-tabib tiegħek.

Meta tiehu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qieghed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki daww mingħajr riċetta. Dan għaliex Losec jista’ jaffettwa l-mod kif jaħdmu xi mediċini, u xi mediċini jista’ jkollhom effett fuq Losec.

M’għandekx tingħata Losec jekk qed tiehu mediċina li fiha **nelfinavir** (tintuża biex tikkura l-infezzjoni tal-HIV).

M’għandekx tiehu Losec jekk qed tiehu xi wahda minn dawn il-mediċini:

- Ketoconazole, itraconazole jew voriconazole (użati biex jikkuraw infezzjonijiet ikkawżati minn fungu).
- Digoxin (jintuża biex jikkura problemi tal-qalb).
- Diazepam (jintuża biex jikkura ansjetà, biex jirrilassa l-muskoli jew għall-epilessija).
- Phenytoin (jintuża għall-epilessija). Jekk qed tiehu phenytoin it-tabib tiegħek għandu jsegwik mill-qrib meta tibda tiehu jew twaqqaf Losec.
- Rifampicin (jintuża biex jikkura t-tuberkulożi)
- Atazanavir (jintuża biex jikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)
- Tacrolimus (f’każi ta’ trapjant tal-organi)
- St John’s wort (*Hypericum perforatum*) (jintuża għall-kura ta’ depressjoni hafifa)
- Cilostazol (jintuża għall-kura ta’ intermittent claudication)
- Saquinavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV)
- Clopidogrel (jintuża biex ma jkunx hemm taqgħid tad-demm (trombi))

Jekk it-tabib tiegħek ippreskriva l-antibiotiċi amoxicillin u clarithromycin kif ukoll Losec sabiex tikkura l-ulċeri kkawżati minn infezzjoni ta' *Helicobacter pylori*, huwa importanti ħafna li tgħid lit-tabib tiegħek dwar kwalunkwe mediċini oħra li qed tiehu.

Meta tiehu Losec ma' l-ikel u max-xorb

Tista tiehu l-pilloli mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Tqala u treddigh

Qabel ma tiehu Losec, għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, jew qed tipprova toħroġ tqila. It- tabib tiegħek jiddeciedi jekk inti tistax tiehu Losec f'dan iż-żmien.

It-tabib tiegħek jiddeciedi jekk inti tistax tiehu Losec jekk inti qed tredda'.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Losec m'għandux jaffetwa l-hila li ssuq jew tuża xi għodda jew magni. Reazzjonijiet avversi għall-mediċina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jsehhu (ara sezzjoni 4). Jekk tiġi affettwat m'għandekx issuq jew thaddem magni.

Tgħarif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Losec

Il-pilloli gastroreżistenti Losec fihom sucrose. Jekk it-tabib qallek li għandek xi intolleranza għal xi tipi ta' zokkor, għamel kuntatt mat-tabib tiegħek qabel tiehu din il-mediċina.

3. KIF GHANDEK TIEHU LOSEC

Dejjem għandek tiehu Losec skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jgħidlek kemm-il pillola tiehu u għalkemm żmien tibqa' tehodhom. Dan jiddependi mill-kundizzjoni li għandek u kemm għandek żmien.

Id-dożi li s-soltu jingħataw huma mnizzla hawn taht.

Adulti:

Biex tikkura sintomi ta' GERD bħal **hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu**

- Jekk it-tabib tiegħek isib li t-tubu li jaqqgħad il-grizmejn mal-istonku tiegħek(il-gerżuma tal-ikel) sarlu ftit tal-ħsara, id-doża li s-soltu tingħata hija 20 mg darba kuljum għal 4-8 ġimgħat. It-tabib jista jgħidlek tiehu doża ta' 40 mg għal 8 ġimgħat oħra jekk it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ikun għadu ma fieq.
- Id-doża normali la darba it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ikun fieq hija ta' 10 mg darba kuljum.
- Jekk it-tubu tal-gerżuma tal-ikel ma saritlux ħsara, id-doża normali hija 10 mg darba kuljum.

Biex tikkura **ulċeri fl-parti ta' fuq tal-intestini** (ulċera duwodenali)

- Id-doża normali hija ta' 20 mg darba kuljum għal ġimagħtejn. It-tabib jista jgħidlek biex tiehu l-istess doża għal ġimagħtejn oħra jekk l-ulċera tiegħek tkun għada ma fiqitx.
- Jekk l-ulċera ma tfieqx kompletament, id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum għal 4 ġimgħat.

Biex tikkura **ulċeri fl-istonku** (ulċera gastrika)

- Id-doża normali hija ta' 20 mg darba kuljum għal 4 ġimgħat. It-tabib jista' jgħidlek biex tiehu l-istess doża għal ġimgħatejn oħra jekk l-ulċera tiegħek tkun għada ma fiqitx.
- Jekk l-ulċera ma tfieqx kompletament, id-doża tista' tiżdied għal 40 mg darba kuljum għal 8 ġimgħat.

Biex **tipprevjeni ulċeri duwodenali u fl-istonku** milli jergħu ifiġġu

- Id-doża normali hija ta' 10 mg jew 20 mg darba kuljum. It-tabib jista iżidlek id-doża għal 40 mg darba kuljum

Biex tikkura **ulċeri** duwodenali u fl-istonku **kkawżati minn NSAIDs** (Mediċini Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi)

- Id-doża li s-soltu tinghata hija ta' 20 mg darba kuljum għal bejn 4 u 8 ġimgħat.

Biex **tipprevjeni ulċeri** duwodenali u fl-istonku jekk qed tiehu **NSAIDs** (Mediċini Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi)

- Id-doża li s-soltu tinghata hija ta' 20 mg darba kuljum.

Biex tikkura **ulċeri kkawżati minn** infezzjoni ta' ***Helicobacter pylori*** u twaqqafhom milli jergħu jfiġġu

- Id-doża li s-soltu tinghata hija 20 mg Losec darbtejn kuljum għal ġimgħa.
- It-tabib jgħidlek ukoll biex tiehu żewġ antibijotiċi minn amoxicillin, clarithromycin u metronidazole.

Biex tikkura ħafna aċidu fl-istonku ikkawżat minn **tkabbir żejjed ta' ċelluli fil-frixa (Zollinger-Ellison syndrome)**

- Id-doża li s-soltu tinghata hija 60 mg kuljum.
- It-tabib jista' jaġġusta d-doża skont il-bżonnijiet tiegħek u jiddeċiedi għal kemm żmien għandek bżonn tiehu din il-mediċina

Tfal:

Biex tikkura sintomi ta' GERD **bħal hruq ta' stonku u rigurġitazzjoni tal-aċidu**

- Tfal il-fuq minn sena u piż tal-ġisem aktar minn 10 kg jistgħu jiehdu Losec. Id-doża għat-tfal hija ibbażata fuq il-piż tat-tfal u t-tabib jiddeċiedi d-doża korretta.

Biex tikkura **ulċeri kkawżati minn** infezzjoni ta' ***Helicobacter pylori*** sabiex twaqqaf milli jergħu ifiġġu

- Tfal aktar minn 4 snin jistgħu jiehdu Losec. Id-doża għat-tfal hija bbażata fuq il-piż tat-tfal u t-tabib jiddeċiedi d-doża korretta.
- It-tabib se jippreskrivi wkoll żewġ antibijotiċi jisimhom amoxicillin u clarithromycin għal-ibnek bintek.

Meta tiehu din il-mediċina

- Huwa rakkomandat li tiehu l-pilloli filgħodu
- Tista' tiehu l-pilloli mal-ikel jew fuq stonku vojta
- Ibla' il-kapsuli shah ma' nofs tazza ilma. Tomghodx jew tkisser il-pilloli. Dan għaliex il-kapsuli fihom pritkuni miksijin li jipproteġu l-pilloli milli jtkissru mill-aċidu tal-istonku. Huwa importanti li ma ssirx hsara lil pritkuni

X'għandek tagħmel jekk int jew it-tfal għandkom problema biex tibilgħu l-pilloli

- jekk int jew ibnek/bintek għandkom problema biex tibilgħu l-pilloli:
 - kisser il-pillola u ferrex il-kontenut direttament go mgħarfa ilma (mhux bil-gass) kwalunkwe meraq tal-frott aċiduż (eż. tuffieħ, laring u pineapple) jew pure tat-tuffieħ.
 - Dejjem hawwad it-tahlita eżatt qabel tixrobha (it-tahlita tkun imdardra). Imbagħad ixrob it-tahlita minnufih jew fi żmien 30 minuta
 - Biex tkun ċert li xrobt il-mediċina kollha, lahlah it-tazza tajjeb ħafna b'nofs tazza ilma u ixrobha. Tużax halib jew ilma bil-gass. Il-biċċiet solidi fihom il-mediċina - tomghodhomx u tkissirhomx

Jekk tiehu Losec aktar milli suppost

Jekk tiehu aktar kapsuli Losec milli ippriskrevilek it-tabib, kellem lit-tabib jew spizjar tiegħek minnufih.

Jekk tinsa tiehu Losec

Jekk tinsa tiehu doża, hudha malli tiftakar. Madankollu jekk ikun wasal il-hin għad-doża li jkun imissek, aqbeż id-doża li tkun insejt. M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull pillola doża li tkun insejt tiehu.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, Losec jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk tinnota xi effetti sekondarji rari iżda serji minn dawn li ġejjin, ieqaf iehu Losec u kkuntattja tabib minnufih:

- Tisfir f'daqqa fis-sider, nefha f'xofftejk, f'ilsienek u fi grisżmejk jew f'gismek, raxx, iħossok hażin jew ikollok diffikultajiet biex tibla' (reazzjoni allergika qawwija)
- Hmura fil-gilda b'infafet u tqaxxir. Jista' jkun hemm infafet severi u fsada mix-xofftejn, mill-ghajnejn, mill-halq, mill-immieher u mill-ġenitali. Din tista tkun 'sindrome ta' Stevens-Johnson' jew 'nekrolizi epidermali tossika'
- Gilda safra, awrina skura jew gheja li jistgħu jkunu sintomi ta' problemi tal-fwied

Effetti sekondarji jistgħu jseħhu b'ċerti frekwenzi, li huma ddefiniti kif ġej:

Komuni hafna:	jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 li jużawh
Komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 100 li jużawh
Mhux komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 1,000 li jużawh
Rari:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 10,000 li jużawh
Rari hafna:	affects less than 1 minn kull 10,000 li jużawh
Mhux magħruf:	il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Effetti sekondarji komuni

- Uġigh ta' ras
- Effetti fuq l-istonku jew l-imsaren: dijarea, uġigh fl-istonku, stitikezza, gass.
- Tqalligh (dardir) jew rimettar.

Effetti sekondarji mhux komuni

- Nefha fis-saqajn u fl-għekiesi.
- Disturb fl-irqad (insomnja).
- Sturdament, thoss tingiż f'idejk u saqajk, thossok trid torqod.
- Thoss rasek iddur bik (vertigini).
- Tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demem li juru kif qed jaħdem il-fwied.
- Raxx fil-gilda, raxx bil-boċċi (horriqija) u ħakk fil-gilda.
- Thossok ma tiflaħx b'mod ġenerali u nuqqas ta' enerġija.

Effetti sekondarji rari

- Problemi fid-demem bhal nuqqas ta' ċelloli bojod jew plejtlits. Dan jista jikkawża dgħufija, tbenġil jew ikabbar il-possibiltà ta' infezzjonijiet.
- Reazzjonijiet allergiċi, xi kultant qawwija hafna, li tinkludi nefha fix-xofftejn, fl-ilsien u fil-grizmejn, deni u tisfir fis-sider.
- Livelli baxxi ta' sodium fid-demem. Dan jista' jikkawża dgħufija, rimettar u bughawwigijiet.
- Thossok aġitat, konfuż u depressat.
- Tibdilet fil mod kif ittiegħem.
- Problemi bil-vista bhal vista mċajpra.
- F'daqq wahda thoss tisfir f'sidrek jew qtugħ ta' nifs (bronkospazmu).
- Halq xott.
- Infjammazzjoni fuq ġewwa tal-halq.
- Infezzjoni msejjha "thrush" li tista' taffetwa l-imsaren u hija kkawżata minn fungu.
- Problemi fil-fwied, li jinkludu suffejra li tista' tikkawża sfurija fil-gilda, awrina skura, u gheja.

- Xagħhar li jehfief (alopecja).
- Raxx fil-ġilda meta tiġi esposta għax-xemx.
- Uġiġh fil-ġogi (artralġja) jew uġiġh fil-muskoli (mijalġja).
- Problemi qawwiya fil-kliewi (nefrite tal-interstizju).
- Żieda fl-gharaq.

Effetti sekondarji rari hafna

- Tibdil fl-ġhadd tad-demem li jinkludi agranuloċitosi (nuqqas ta' ċelloli bojod tad-demem).
- Aggressjoni.
- Tara', thoss u tisma affarijiet li ma jkunux hemm (allucinazzjonijiet).
- Problemi qawwiya fil-fwied li jwasslu għal insuffiċjenza tal-fwied u infjammazzjoni tal-mohħ.
- Raxx qawwi jew infafet jew tqaxxir tal-ġilda li jfiegġ f'daqqa waħda. Dan jista' jkun assoċjat ma' deni qawwi u uġiġh fil-ġogi (Erythema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolizi epidermali tossika).
- Dghufija fil-muskoli.
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Ipomagnesimja

Losec jista' f'każijiet rari jaffetwa ċ-ċelloli bojod tad-demem u jwassal għal immunità dgħajfa. Jekk għandek xi infezzjoni b'sintomi bħal deni fejn il-kundizzjoni ġenerali tiegħek hija hażina **hafna** jew deni b'sintomi ta' infezzjoni lokali bħal uġiġh fl-ġhonq, fil-ġriżmejn jew fil-ħalq jew diffikultajiet biex tgħaddi l-awrina, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih, sabiex tiġi eskluża l-possibiltà li m'hemmx nuqqas ta' ċelloli bojod fid-demem (agranuloċitozi) permezz ta' test tad-demem. Huwa importanti li inti tagħti informazzjoni dwar il-medicina tiegħek f'dan il-waqt.

M'għandekx tkun mħasseb b'din il-lista ta' effetti sekondarji li huma possibbli. Jista' jkun li ma jkollok l-ebda waħda minnhom. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumx imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦZEN LOSEC

- Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
- Tużax Losec wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett ta' ġewwa u ta' barra wara EXP. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar gurnata ta' dak ix-xahar
- Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.
- Aħżen din il-medicina fil-pakkett oriġinali (folja) jew żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità
- Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx b'żonn. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Losec:

- Is-sustanza attiva hi omeprazole. Il-pilloli gastrorezistenti Losec fihom omeprazole magnesium ekwivalenti għal 10 mg, 20 mg jew 40 mg ta' omeprazole.

- Is-sustanzi l-oħra huma microcrystalline cellulose, glyceryl monostearate, hydroxypropylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, methacrylic acid co-polymer, sferi taz-zokkor, paraffin, macrogol (polyethylene glycol), polysorbate, polyvinylpyrrolidone crosslinked, sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH), sodium stearyl fumarate, talc, triethyl citrate, iron oxide, titanium dioxide.

Id-Dehra ta' Losec u l-kontenuti tal-pakkett:

- Il-pilloli gastroreżistenti Losec 10 mg huma pilloli roża ċari b'  jew  fuq naħa waħda u b' 10 mg fuq in-naħa l-oħra
- Il-pilloli gastroreżistenti Losec 20 mg huma pilloli roża b'  jew  fuq naħa waħda u b' 20 mg fuq in-naħa l-oħra.
- Il-pilloli gastroreżistenti Losec 40 mg huma pilloli ħomor skuri fil-kannella b'  jew  fuq naħa waħda u b' 40 mg fuq in-naħa l-oħra.

Daqs tal-pakketti:

- 10 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 7, 14, 15, 28, 30, 50, 100 pillola; pakketti għall-isptar ta' 140 pillola
 - o Folji ta' 5, 7, 10, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 pillola; pakketti għall-isptar ta' 560 pillola.
 - o Folja mtaqqba biex tinqata doża waħda (pakkett għall-isptar) ta' 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1 pillola
- 20 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 100 pillola; pakketti għall-isptar ta' 140, 200, 280 pillola
 - o Folji ta' 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 pillola.
 - o Folja mtaqqba biex tinqata doża waħda (pakkett għall-isptar) ta' 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 100 x 1 pillola.
- 40 mg:
 - o Fliexken HDPE ta' 7, 14, 15, 28, 30, 100 pillola.
 - o Folji ta' 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 100 pillola; pakketti għall-isptar ta' 560 pillola.
 - o Folja mtaqqba biex tinqata doża waħda (pakkett għall-isptar) ta' 25 x 1, 28 x 1, 50 x 1, pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg għal soluzzjoni għall-infużjoni
[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
Omeprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk joghgbok għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Losec u għal xiex jintuża
2. Qabel ma jinghatalek Losec
3. Kif għandu jinghatalek Losec
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif tahzen Losec
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU LOSEC U GHALXIEX JINTUŻA

Losec fih is-sustanza attiva msejha omeprazole. Din tippartjeni għal grupp ta' medicini li jissejhu 'inibituri tal-pompa tal-proton'. Huma jahdmu billi jnaqqsu l-ammont ta' aċidu li jipproduci l-istonku tiegħek.

It-trab Losec għal soluzzjoni għall-infużjoni jista' jintuża bħala alternattiva għal terapija orali.

2. QABEL MA JINGHATALEK LOSEC

M'għandux jinghatalek Losec

- jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal omeprazole jew sustanzi oħra ta' Losec.
- jekk int allergiku għal medicini oħra inibituri tal-pompa tal-proton (eż. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- jekk qed tiehu medicina li fiha nelfinavir (użata għall-infezzjoni tal-HIV)

Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tinghatalek din il-medicina.

Oqghod attent hafna b'Losec

Losec jista' jahbi xi sintomi ta' mard iehor. Għalhekk jekk xi wahda minn dawn li ġejjin tigri lilek, qabel ma jinghatalek Losec jew wara li jinghatalek, kellem lit-tabib tiegħek minnufih:

- Titlef hafna piż għall-ebda raġuni u għandek problemi biex tibra'.
- Ikollok uġiġh fl-istonku jew indigestjoni.
- Tibda tirremetti l-ikel jew id-demm.
- Tgħaddi ppurgar iswed (ppurgar bid-demm).
- Jekk ikollok dijarea qawwija jew persistenti, minhabba li omeprazole ġie assoċjat ma zieda zghira fid-dijarea minn infezzjoni.
- Jekk għandek problemi serji fil-fwied.

Meta tuża medicini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-ahħar xi mediċini ohra, anki dawk mingħajr riċetta. Dan għaliex Losec jista' jaffettwa l-mod kif jahdmu xi mediċini, u xi mediċini jista jkollhom effett fuq Losec.

M'għandekx tinghata Losec jekk qed tinghata mediċina li fiha **nelfinavir** (tintuża biex tikkura l-infezzjoni tal-HIV).

M'għandekx tinghata Losec jekk qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini:

- Ketoconazole, itraconazole jew voriconazole (użati biex jikkuraw infezzjonijiet ikkawżati minn fungu).
- Digoxin (jintuża biex jikkura problemi tal-qalb).
- Diazepam (jintuża biex jikkura ansjetà, biex jirrilassa l-muskoli jew għall-epilessija).
- Phenytoin (jintuża għall-epilessija). Jekk qed tiehu phenytoin it-tabib tiegħek għandu jsegwik mill-qrib meta tibda tiehu jew twaqqaf Losec.
- Rifampicin (jintuża biex jikkura t-tuberkulożi).
- Atazanavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV).
- Tacrolimus (f'każi ta' trapjant tal-organi).
- St John's wort (*Hypericum perforatum*) (jintuża għall-kura ta' depressjoni hafifa).
- Cilostazol (jintuża għall-kura ta' intermittent claudication).
- Saquinavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV)
- Clopidogrel (jintuża biex ma jkunx hemm taqgħid tad-demem (trombi))

Jekk it-tabib tiegħek ippreskriva l-antibiotiċi amoxicillin u clarithromycin kif ukoll Losec sabiex tikkura l-ulċeri kkawżati minn infezzjoni ta' *Helicobacter pylori*, huwa importanti hafna li tghid lit-tabib tiegħek dwar kwalunkwe mediċini ohra li qed tiehu.

Tqala u treddigh

Qabel ma tinghata Losec, għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, jew qed tipprova toħroġ tqila. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti għandekx tinghata Losec f'dan iż-żmien.

It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti tistax tiehu Losec jekk inti qed tredda'.

Sewqan u thaddim ta' magni

Losec m'għandux jaffettwa l-hila li ssuq jew tuża xi għodda jew magni. Reazzjonijiet avversi għall-mediċina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jsejnhu (ara sezzjoni 4). Jekk tiġi affettwat m'għandekx issuq jew thaddem magni.

3. KIF GHANDEK TINGHATA LOSEC

- Losec jista' jinghata lill-adulti inkluz l-anzjani
- Hemm esperjanza limitata b'Losec għal-użu għol-vini fit-tfal.

Meta tinghata Losec

- Losec jinghatalek minn tabib li jiddeċiedi kemm għandek bżonn
- Il-mediċina tinghatalek bħala infużjoni f'wahda mill-vini.

Jekk tinghata Losec aktar milli suppost

Jekk tahseb li inghatajt iżżejjed Losec, kellek lit-tabib tiegħek minnufih.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull mediċina ohra, Losec jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk tinnota xi effetti sekondarji rari iżda serji minn dawn li ġejjin, ieqaf uża Losec u kkuntattja tabib minnufih:

- Tisfir f'daqqa fis-sider, nefha f'xofftejk, f'ilsienek u fi grisżmejk jew f'ġismek, raxx, iħossok hażin jew ikollok diffikultajiet biex tibla' (reazzjoni allergika qawwija)
- Hmura fil-ġilda b'infafet u tqaxxir. Jista' jkun hemm infafet severi u fsada mix-xofftejn, mill-ghajnejn, mill-halq, mill-imnieher u mill-ġenitali. Din tista tkun 'sindrome ta' Stevens-Johnson' jew 'nekrolizi epidermali tossika'
- Ġilda safra, awrina skura jew gheja li jistgħu jkunu sintomi ta' problemi tal-fwied

Effetti sekondarji jistgħu jsehhu b'ċerti frekwenzi, li huma ddefiniti kif ġej:

Komuni hafna:	jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 li jużawh
Komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 100 li jużawh
Mhux komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 1,000 li jużawh
Rari:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 10,000 li jużawh
Rari hafna:	affects less than 1 minn kull 10,000 li jużawh
Mhux maghruf:	il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Effetti sekondarji komuni

- Uġigh ta' ras
- Effetti fuq l-istonku jew l-imsaren: dijarea, uġigh fl-istonku, stitikezza, gass.
- Tqalligh (dardir) jew rimettar.

Effetti sekondarji mhux komuni

- Nefha fis-saqajn u fl-ġhekiesi.
- Disturb fl-irqad (insomnija).
- Sturdament, thoss tingiż f'idejk u saqajk, thossok trid torqod.
- Thoss rasek iddur bik (vertigini).
- Tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demmi li juru kif qed jahdem il-fwied.
- Raxx fil-ġilda, raxx bil-boċċi (horriqija) u ħakk fil-ġilda.
- Thossok ma tiflaħx b'mod ġenerali u nuqqas ta' enerġija.

Effetti sekondarji rari

- Problemi fid-demmi bħal nuqqas ta' ċelloli bojod jew plejtlits. Dan jista jikkawża dghufija, tbengiġ jew ikabbar il-possibiltà ta' infezzjonijiet.
- Reazzjonijiet allergiċi, xi kultant qawwija hafna, li tinkludi nefha fix-xofftejn, fl-ilsien u fil-grisżmejn, deni u tisfir fis-sider.
- Livelli baxxi ta' sodium fid-demmi. Dan jista' jikkawża dghufija, rimettar u bughawwigijiet.
- Thossok aġitat, konfuż u depressat.
- Tibdilet fil-mod kif ittiegħem.
- Problemi bil-vista bħal vista mċajpra.
- F'daqq wahda thoss tisfir f'sidrek jew qtugħ ta' nifs (bronkospazmu).
- Ħalq xott.
- Infjammazzjoni fuq ġewwa tal-halq.
- Infezzjoni msejja "thrush" li tista' taffetwa l-imsaren u hija kkawżata minn fungu.
- Problemi fil-fwied, li jinkludu suffejra li tista' tikkawża sfurija fil-ġilda, awrina skura, u gheja.
- Xagħar li jehfief (alopecija).
- Raxx fil-ġilda meta tiġi esposta għax-xemx.
- Uġigh fil-ġogi (artralġja) jew uġigh fil-muskoli (mijalgja).
- Problemi qawwija fil-kliewi (nefrite tal-interstizju).
- Żieda fl-gharaq.

Effetti sekondarji rari hafna

- Tibdil fl-ghadd tad-demmi li jinkludi agranuloċitosi (nuqqas ta' ċelloli bojod tad-demmi).
- Aggressjoni.

- Tara', thoss u tisma affarijiet li ma jkunux hemm (allucinazzjonijiet).
- Problemi qawwija fil-fwied li jwasslu għal insuffiċjenza tal-fwied u infjammazzjoni tal-moħħ.
- Raxx qawwi jew infafet jew tqaxxir tal-gilda li jfiegħ f'daqqa waħda. Dan jista jkun assoċjat ma' deni qawwi u ugiġh fil-gogi (Erythema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolizi epidermali tossika).
- Dghufija fil-muskoli.
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Ipomagnesimja

Ħsara irriversibbli fil-vista kienet irrappurtata f'każijiet iżolati ta' pazjenti morda b'mod kritiku li rċievew injezzjoni ta' omeprazole għol-vini, speċjalment f'dozi kbar, iżda l-ebda relazzjoni każwali ma giet stabbilita.

Losec jista' f'każijiet rari jaffetwa ċ-ċelloli bojod tad-demem u jwassal għal immunità dgħajfa. Jekk għandek xi infezzjoni b'sintomi bħal deni fejn il-kundizzjoni ġenerali tiegħek hija hażina **ħafna** jew deni b'sintomi ta' infezzjoni lokali bħal ugiġh fl-ghonq, fil-grizmejn jew fil-halq jew diffikultajiet biex tghaddi l-awrina, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih, sabiex tiġi eskluża l-possibiltà li m'hemmx nuqqas ta' ċelloli bojod fid-demem (agranuloċitożi) permezz ta' test tad-demem. Huwa importanti li inti tagħti informazzjoni dwar il-medicina tiegħek f'dan il-waqt.

M'għandekx tkun mħasseb b'din il-lista ta' effetti sekondarji li huma possibbli. Jista' jkun li ma jkollok l-ebda waħda minnhom. Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnotta xi effetti sekondarji li mhumx imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN LOSEC

- Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
- Tużax Losec wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-kunjett wara EXP. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar
- Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Aħżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mid-dawl.
- *Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni*
Is-soluzzjoni għall-infuzjoni rrikostitwita b'sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għandha tintuża fi żmien 12-il siegħa wara li tiġi preparata.
Is-soluzzjoni għall-infuzjoni rrikostitwita bi glucose 50 mg/ml (5%) għandha tintuża fi żmien 6 sigħat wara li tiġi preparata.

Minn aspekk mikrobijologiku l-prodott għandu jintuża immedjatament sakemm ma giex irrikostitwit taht kundizzjonijiet asemiċi kkontrollati u validati.

- Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-drañaġġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill ispiżjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Losec:

- Is-sustanza attiva hi omeprazole. Kull kunjett li fih it-trab għal soluzzjoni għall-infuzjoni fih omeprazole sodium ekwivalenti għal 40 mg ta' omeprazole. Is-sustanzi l-oħra huma disodium edetate u sodium hydroxide

Id-Dehra ta' Losec u l-kontenuti tal-pakkett

Losec 40 mg trab għal soluzzjoni għall-infużjoni (trab għall-infużjoni) jiġi f'kunjett.

It-trab imnixxef fil-kunjett jiġi mibdul f'soluzzjoni qabel ma jinghatalek.

Daqsijiet tal-pakkett: Kunjetti 1 x40 mg, 5x40 mg u 10x40 mg

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Il-kontenut kollu ta' kull kunjett għandu jinhall f'madwar 5 ml u mbagħad għandu jiġi ddilwit immedjatament għal 100 ml. Għandhom jintużaw soluzzjoni ta' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall-infużjoni jew soluzzjoni ta' glucose 50 mg/ml (5%) għall-infużjoni. L-istabbiltà ta' omeprazole hija influwenzata mill-pH tas-soluzzjoni għall-infużjoni, li hija r-raġuni għaliex l-ebda solvent ieħor jew kwantitajiet oħra m'għandhom jintużaw għad-dilwizzjoni.

Kif wiehed jipprepara

1. B'siringa iġbed 5 ml ta' soluzzjoni tal-infużjoni mill-flixxun jew il-borża tal-infużjoni ta' 100 ml.
2. Żid dan il-volum għol-kunjett bl-omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar, hallat sewwa filwaqt li tiżgura li l-omeprazole inhall kollu..
3. Iġbed is-soluzzjoni ta' omeprazole lura fis-siringa.
4. Ittrasferixxi s-soluzzjoni għal għol-borża jew il-flixxun ta' soluzzjoni għall-infużjoni.
5. Irrepeti l-istruzzjonijiet minn 1-4 biex tiżgura li l-omeprazole kollu jiġi ttrasferit mill-kunjett għal għol borża jew il-flixxun tal-infużjoni.

Peparazzjoni alternattiva ta' infużjonijiet għo kontenituri flessibbli

1. Uża labra li ttaqqab miż-żewġ naħat u tittrasferixxi u waħhalha mal-membrana tal-injezzjoni tal-borża tal-infużjoni. Waħhal in-naħa l-oħra tal-labra mill-kunjett li fih omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar.
2. Holl is-sustanza ta' omeprazole billi tippompja s-soluzzjoni tal-infużjoni min-naħa għall-oħra mill-borża tal-infużjoni għal għol-kunjett.
3. Aċċerta ruħek li l-omeprazole kollu jkun inhall.

Is-soluzzjoni għall-infużjoni għandha tinghata b'infużjoni għol-vina għal 20-30 minuta.

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
Omeprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Losec u għal xiex jintuża
2. Qabel ma jingħatalek Losec
3. Kif għandu jingħatalek Losec
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif tahzen Losec
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU LOSEC U GHALXIEX JINTUŻA

Losec fih is-sustanza attiva msejja omeprazole. Din tippartjeni għal grupp ta' medicini li jissejju 'inibituri tal-pompa tal-proton'. Huma jahdmu billi jnaqqsu l-ammont ta' aċidu li jipproduci l-istonku tiegħek.

It-trab Losec u s-solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni jistgħu jintużaw bħala alternattiva għal terapija orali.

2. QABEL MA JINGHATALEK LOSEC

M'għandux jingħatalek Losec

- jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal omeprazole jew sustanzi ohra ta' Losec.
- jekk int allergiku għal medicini ohra inibituri tal-pompa tal-proton (eż. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- jekk qed tiehu medicina li fiha nelfinavir (użata għall-infezzjoni tal-HIV)

Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tingħatalek din il-medicina.

Ogħhod attent hafna b'Losec

Losec jista' jahbi xi sintomi ta' mard iehor. Għalhekk jekk xi wahda minn dawn li ġejjin tigrililek, qabel ma jingħatalek Losec jew wara li jingħatalek, kellem lit-tabib tiegħek minnufih:

- Titlef hafna piż għall-ebda raġuni u għandek problemi biex tibra'.
- Ikollok ugiġh fl-istonku jew indigestjoni.
- Tibda tirremetti l-ikel jew id-demm.
- Tgħaddi ppurgar iswed (ppurgar bid-demm).
- Jekk ikollok dijarea qawwija jew persistenti, minhabba li omeprazole ġie assoċjat ma zieda zghira fid-dijarea minn infezzjoni.
- Jekk għandek problemi serji fil-fwied.

Meta tuża medicini ohra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-ahħar xi mediċini ohra, anki dawk mingħajr riċetta. Dan għaliex Losec jista' jaffettwa l-mod kif jahdmu xi mediċini, u xi mediċini jista jkollhom effett fuq Losec.

M'għandekx tinghata Losec jekk qed tinghata mediċina li fiha **nelfinavir** (tintuża biex tikkura l-infezzjoni tal-HIV).

M'għandekx tinghata Losec jekk qed tiehu xi waħda minn dawn il-mediċini:

- Ketoconazole, itraconazole jew voriconazole (użati biex jikkuraw infezzjonijiet ikkawżati minn fungu).
- Digoxin (jintuża biex jikkura problemi tal-qalb).
- Diazepam (jintuża biex jikkura ansjetà, biex jirrilassa l-muskoli jew għall-epilessija).
- Phenytoin (jintuża għall-epilessija). Jekk qed tiehu phenytoin it-tabib tiegħek għandu jsewwik mill-qrib meta tibda tiehu jew twaqqaf Losec.
- Rifampicin (jintuża biex jikkura t-tuberkulożi).
- Atazanavir (jintuża biex jikkura l-infezzjoni tal-HIV).
- Tacrolimus (f'każi ta' trapjant tal-organi).
- St John's wort (*Hypericum perforatum*) (jintuża għall-kura ta' depressjoni hafifa).
- Cilostazol (jintuża għall-kura ta' intermittent claudication).
- Saquinavir (jintuża biex jikkura infezzjoni bl-HIV)
- Clopidogrel (jintuża biex ma jkunx hemm taqgħid tad-demem (trombi))

Jekk it-tabib tiegħek ippreskriva l-antibiotiċi amoxicillin u clarithromycin kif ukoll Losec sabiex tikkura l-ulċeri kkawżati minn infezzjoni ta' *Helicobacter pylori*, huwa importanti hafna li tghid lit-tabib tiegħek dwar kwalunkwe mediċini ohra li qed tiehu.

Tqala u treddigh

Qabel ma tinghata Losec, għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, jew qed tipprova toħroġ tqila. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti għandekx tinghata Losec f'dan iż-żmien.

Omeprazole jitneħħa mal-halib tas-sider iżda x'aktarx li ma jinfluwenzax lit-tarbija meta jintużaw dożi terapewtiċi. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti tistax tiehu Losec jekk inti qed tredra'.

Sewqan u thaddim ta' magni

Losec m'għandux jaffettwa l-hila li ssuq jew tuża xi għodda jew magni. Reazzjonijiet avversi għall-mediċina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jseħhu (ara sezzjoni 4). Jekk tiġi affettwat huma m'għandekx issuq jew thaddem magni.

3. KIF GHANDEK TINGHATA LOSEC

- Losec jista' jinghata lill-adulti inkluż l-anzjani
- Hemm esperjanza limitata b'Losec għal-użu għol-vini fit-tfal.

Meta tinghata Losec

- Losec jinghatalek minn tabib li jiddeċiedi kemm għandek bżonn
- Il-mediċina tinghatalek bħala injezzjoni f'waħda mill-vini.

Jekk tinghata Losec aktar milli suppost

Jekk taħseb li inghatajt iżżejjed Losec, kellek lit-tabib tiegħek minnufih.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull mediċina ohra, Losec jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk tinnota xi effetti sekondarji rari iżda serji minn dawn li ġejjin, ieqaf uża Losec u kkuntattja tabib minnufih:

- Tisfir f'daqqa fis-sider, nefha f'xofftejk, f'ilsienek u fi grisżmejk jew f'ġismek, raxx, iħossok hażin jew ikollok diffikultajiet biex tibla' (reazzjoni allergika qawwija)
- Hmura fil-ġilda b'infafet u tqaxxir. Jista' jkun hemm infafet severi u fsada mix-xofftejn, mill-ghajnejn, mill-halq, mill-immnieher u mill-ġenitali. Din tista tkun 'sindrome ta' Stevens-Johnson' jew 'nekrolizi epidermali tossika'
- Ġilda safra, awrina skura jew gheja li jistgħu jkunu sintomi ta' problemi tal-fwied

Effetti sekondarji jistgħu jsehhu b'ċerti frekwenzi, li huma ddefiniti kif ġej:

Komuni hafna:	jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 li jużawh
Komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 100 li jużawh
Mhux komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 1,000 li jużawh
Rari:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 10,000 li jużawh
Rari hafna:	affects less than 1 minn kull 10,000 li jużawh
Mhux magħruf:	il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Effetti sekondarji komuni

- Uġigh ta' ras
- Effetti fuq l-istonku jew l-imsaren: dijarea, uġigh fl-istonku, stitikezza, gass.
- Tqalligh (dardir) jew rimettar.

Effetti sekondarji mhux komuni

- Nefha fis-saqajn u fl-ġhekiesi.
- Disturb fl-irqad (insomnja).
- Sturdament, thoss tingiż f'idejk u saqajk, thossok trid torqod.
- Thoss rasek iddur bik (vertigini).
- Tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demmi li juru kif qed jahdem il-fwied.
- Raxx fil-ġilda, raxx bil-boċċi (horriqija) u ħakk fil-ġilda.
- Thossok ma tiflaħx b'mod ġenerali u nuqqas ta' enerġija.

Effetti sekondarji rari

- Problemi fid-demmi bħal nuqqas ta' ċelloli bojod jew plejtlits. Dan jista jikkawża dghufija, tbengiġ jew ikabbar il-possibiltà ta' infezzjonijiet.
- Reazzjonijiet allergiċi, xi kultant qawwija hafna, li tinkludi nefha fix-xofftejn, fl-ilsien u fil-grisżmejn, deni u tisfir fis-sider.
- Livelli baxxi ta' sodium fid-demmi. Dan jista' jikkawża dghufija, rimettar u bughawwigijiet.
- Thossok aġitat, konfuż u depressat.
- Tibdilet fil-mod kif ittiegħem.
- Problemi bil-vista bħal vista mċajpra.
- F'daqq wahda thoss tisfir f'sidrek jew qtugħ ta' nifs (bronkospazmu).
- Ħalq xott.
- Infjammazzjoni fuq ġewwa tal-halq.
- Infezzjoni msejja "thrush" li tista' taffetwa l-imsaren u hija kkawżata minn fungu.
- Problemi fil-fwied, li jinkludu suffejra li tista' tikkawża sfurija fil-ġilda, awrina skura, u gheja.
- Xagħar li jehfief (alopecja).
- Raxx fil-ġilda meta tiġi esposta għax-xemx.
- Uġigh fil-ġogi (artralġja) jew uġigh fil-muskoli (mijalgja).
- Problemi qawwija fil-kliewi (nefrite tal-interstizju).
- Żieda fl-gharaq.

Effetti sekondarji rari hafna

- Tibdil fl-ghadd tad-demmi li jinkludi agranuloċitosi (nuqqas ta' ċelloli bojod tad-demmi).
- Aggressjoni.

- Tara', thoss u tisma affarijiet li ma jkunux hemm (allucinazzjonijiet).
- Problemi qawwija fil-fwied li jwasslu għal insuffiċjenza tal-fwied u infjammazzjoni tal-moħħ.
- Raxx qawwi jew infafet jew tqaxxir tal-gilda li jfiegħ f'daqqa waħda. Dan jista jkun assoċjat ma' deni qawwi u ugiġh fil-ġogi (Erythema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolizi epidermali tossika).
- Dghufija fil-muskoli.
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel
- Ipomagnesimja

Ħsara irriversibbli fil-vista kienet irrappurtata f'każijiet iżolati ta' pazjenti morda b'mod kritiku li rċievew injezzjoni ta' omeprazole ġol-vini, speċjalment f'dozi kbar, iżda l-ebda relazzjoni każwali ma giet stabbilita.

Losec jista' f'każijiet rari jaffetwa ċ-ċelloli bojod tad-demem u jwassal għal immunità dgħajfa. Jekk għandek xi infezzjoni b'sintomi bħal deni fejn il-kundizzjoni ġenerali tiegħek hija hażina **hażna** jew deni b'sintomi ta' infezzjoni lokali bħal ugiġh fl-ghonq, fil-grizmejn jew fil-halq jew diffikultajiet biex tghaddi l-awrina, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih, sabiex tiġi eskluża l-possibiltà li m'hemmx nuqqas ta' ċelloli bojod fid-demem (agranuloċitożi) permezz ta' test tad-demem. Huwa importanti li inti tagħti informazzjoni dwar il-medicina tiegħek f'dan il-waqt.

M'għandekx tkun mħasseb b'din il-lista ta' effetti sekondarji li huma possibbli. Jista' jkun li ma jkollok l-ebda waħda minnhom. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumx imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN LOSEC

- Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
- Tużax Losec wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara EXP. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar
- Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Aħżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mid-dawl.
- Kemm idum tajjeb il-prodott wara r-rikostituzzjoni
Is-soluzzjoni rrikostitwita m'għandiex tinhażen f'temperatura 'l fuq minn 25°C u għandha tintuża fi żmien 4 sigħat wara li tiġi preparata. Minn aspekk mikrobijologiku il-prodott għandu jintuża immedjatament sakemm ma giex irrikostitwit taht kundizzjonijiet azzettici kkontrollati u validati.
- Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagg jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill ispiżjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx bżonn. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Losec:

- Is-sustanza attiva hi omeprazole. Kull kunjett li fih it-trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni fih omeprazole sodium ekwivalenti għal 40 mg omeprazole.
- Is-sustanzi l-oħra huma:
Trab għall-injezzjoni: sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH).
Solvent għall-injezzjoni: citric acid monohydrate (għal aġġustament tal-pH), macrogol 400, u ilma għall-injezzjonijiet

Id-Dehra ta' Losec u l-kontenuti tal-pakkett:

Losec 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni (Trab għall-injezzjoni; u Solvent għar-rikostituzzjoni tas-soluzzjoni għall-injezzjoni) jiġi f'pakkett imħallat li jikkonsisti f'kunjett li fih is-sustanza mnixxa (I) u ampulla li fiha s-solvent (II).

It-trab imnixxef fil-kunjett jiġi mibdul f'soluzzjoni qabel ma jinghatalek.

Daqsijiet tal-pakkett: 1x40 mg(I+II), 5x40 mg(I+II), 10x40 mg (I+II).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-fuljett kien approvat l-aħhar f' {XX/SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Is-soluzzjoni Losec għall-injezzjoni tinkiseb billi wiehed iħoll is-sustanza mnixxa permezz tal-iffriżar fis-solvent li jiġi magħha. L-ebda solvent ieħor m'għandu jintuża.

L-istabbiltà ta' omeprazole hija influwenzata mill-pH tas-soluzzjoni għall-injezzjoni, li hija r-raġuni għaliex l-ebda solvent ieħor jew kwantitajiet oħra m'għandhom jintużaw għad-dilwizzjoni. Soluzzjonijiet li ma jiġux ippreparati sewwa jistgħu jiġu identifikati minn kulur isfar sa kannella u m'għandhomx jintużaw. Uża biss soluzzjonijiet ċari, minghajr kulur jew sofor fil-kannella ċari hafna.

Kif wiehed jippreparah

NOTA: Istruzzjonijiet minn 1 sa 5 għandhom isiru eżatt wara xulxin:

1. B'siringa iġbed is-solvent kollu mill-ampulla (10 ml).
2. Żid madwar 5 ml mis-solvent ġol-kunjett li fih omeprazole imnixxef permezz tal-iffriżar.
3. Iġbed kemm tista' arja mill-kunjett lura għal ġos-siringa. Dan jgħin biex iżżid is-solvent li jkun fadal b'mod aktar faċli.
4. Żid is-solvent li jkun għad fadal għal ġol-kunjett, aċċerta ruhek li s-siringa tkun vojta.
5. Dawwar u hawwad il-kunjett biex tiżgura li l-omeprazole kollu mnixxef permezz tal-iffriżar iħall.

Is-soluzzjoni ta' Losec għall-injezzjoni għandha tinghata biss bħala injezzjoni ġol-vina u m'għandiex tiżdied ma' soluzzjonijiet għall-infużjoni. Wara r-rikostituzzjoni l-injezzjoni għandha tinghata bil-mod fuq perjodu ta' mill-anqas żewġ minuti u nofs b'rata massima ta' 4 ml kull minuta.

FULJETT TA' TAGHRIF

Għal prodotti mediċinali li jingħataw mingħajr ricetta

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 10 mg pilloli gastroteżistenti
Losec u ismijiet assoċjati (ara Anness I) 20 mg pilloli gastroteżistenti

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]
Omeprazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu, għax fih tagħrif importanti għalik.

Din il-medicina tingħata mingħajr riċetta. Madankollu, xorta għandek tiehu Losec b'għaqal biex ikollok l-aħjar effett.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Staqsi lill-ispizjar tiegħek jekk tkun trid aktar tagħrif jew pariri.
- Għandek tikkuntattja lit-tabib jekk is-sintomi jmorru għall-agħar jew jibqgħu kif ikunu wara 14-il jum.
- Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Losec u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tiehu Losec
3. Kif għandek tiehu Losec
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen Losec
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU LOSEC U GħALXIEX JINTUŻA

Il-pilloli gastroteżistenti Losec fihom is-sustanza attiva msejja omeprazole. Din tippartjeni għal grupp ta' medicini li jissejhu 'inibituri tal-pompa tal-proton'. Huma jahdmu billi jnaqqsu l-ammont ta' aċidu li jipproduċi l-istonku tiegħek.

Rifluss huwa t-tluġh lura tal-aċidu mill-istonku għal ġol-gerżuma tal-ikel "pajp tal-ikel", li jista' jsir infjammata u jikkawża uġiġh. Dan jista' jikkawżalek sintomi bħal thoss hruq u uġiġh fis-sider tiela' 'l fuq lejn il-grizmejn (hruq ta' stonku) u toġhma qarsa fil-halq (rigurġitazzjoni tal-aċidu). Jista' jkun meħtieġ li tiehu l-pilloli għal 2-3 ijiem konsekuttivi biex is-sintomi jmorru għall-aħjar.

2. QABEL MA TIEHU LOSEC

Tihux Losec

- jekk inti allergiku (tbati minn sensitività eċċessiva) għal omeprazole jew sustanzi ohra ta' Losec.
- jekk int allergiku għal medicini li fihom inibituri tal-pompa tal-proton (eż. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- jekk qed tiehu medicina li fiha nelfinavir (użata għall-infezzjoni tal-HIV)

Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tiehu Losec.

Oqgħod attent hafna b'Losec

Tihux Losec għal aktar minn 14-il jum mingħajr ma tikkonsulta tabib. Jekk inti ma thossx serħan, jew jekk inti thoss is-sintomi jmorru għall-agħar, ikkonsulta lit-tabib tiegħek.

Losec jista' jahbi xi sintomi ta' mard iehor. Għalhekk jekk xi wahda minn dawn li ġejjin tigri lilek, qabel ma tibda tiehu Losec jew waqt li qed tiehdu, kellem lit-tabib tiegħek minnufih:

- Titlef hafna piż għall-ebda raġuni u għandek problemi biex tibra'.

- Ikollok uġigh fl-istonku jew indigestjoni.
- Tibda tirremetti l-ikel jew id-demm.
- Tgħaddi ppurgar iswed (ppurgar bid-demm).
- Jekk ikollok dijarea qawwija jew persistenti, minhabba li omeprazole ġie assoċjat ma zieda żgħira fid-dijarea minn infezzjoni.
- Qabel diġà kellek ulċera fl-istonku jew operazzjoni gastrointestinali.
- Qed tiehu kura kontinwa għas-sintomi ta' indigestjoni jew hruq ta' stonku għal 4 ġimgħat jew aktar.
- Jekk kontinwament issofri minn indigestjoni jew hruq ta' stonku għal 4 ġimgħat jew aktar
- Għandek is-suffejra jew mard qawwi tal-fwied.
- Għandek aktar minn 55 sena b'sintomi godda jew li nbidlu dan l-aħhar.

Il-pazjenti m'għandhomx jiehdu omeprazole bħala medicina ta' prevenzjoni.

Meta tiehu medicini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew haadt dan l-aħhar xi medicini oħra, anki daww mingħajr riċetta. Dan għaliex Losec jista' jaffettwa l-mod kif jaħdmu xi medicini, u xi medicini jista' jkollhom effett fuq Losec.

M'għandekx tingħata Losec jekk qed tiehu medicina li fiha **nelfinavir** (tintuża biex tikkura l-infezzjoni tal-HIV).

Inti għandek tgħid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek b'mod speċifiku jekk inti qed tiehu clopidogrel (jintuża biex jilqa' kontra tagħqid tad-demm (trombi)).

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiehu xi waħda minn dawn il-medicini:

- Ketoconazole, itraconazole jew voriconazole (użati biex jikkuraw infezzjonijiet ikkawżati minn fungu).
- Digoxin (jintuża biex jikkura problemi tal-qalb).
- Diazepam (jintuża biex jikkura ansjetà, biex jirrilassa l-muskoli jew għall-epilessija).
- Phenytoin (jintuża għall-epilessija). Jekk qed tiehu phenytoin it-tabib tiegħek għandu jsegwix mill-qrib meta tibda tiehu jew twaqqaf Losec.
- Medicini li jintużaw biex iraqqu d-demm, bħal warfarina jew oħrajn li jiblokkaw il-vitamina K. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn isegwix mill-qrib meta tibda jew tieqaf tiehu Losec.
- Rifampicin (jintuża biex jikkura t-tuberkulożi)
- Atazanavir (jintuża biex jikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)
- Tacrolimus (f'każi ta' trapjant tal-organi)
- St John's wort (*Hypericum perforatum*) (jintuża għall-kura ta' depressjoni hafifa)
- Cilostazol (jintuża għall-kura ta' intermittent claudication)
- Saquinavir (jintuża biex jikkura infezzjoni bl-HIV)

Meta tiehu Losec ma' l-ikel u max-xorb

Tista tiehu l-pilloli mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Tqala u treddigh

Qabel ma tiehu Losec, għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, jew qed tipprowa toħroġ tqila. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti tistax tiehu Losec f'dan iż-żmien.

It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti tistax tiehu Losec jekk inti qed tredda'.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Losec m'għandux jaffettwa l-hila li ssuq jew tuża xi għodda jew magni. Reazzjonijiet avversi għall-medicina bħal sturdament u disturbi fil-vista jistgħu jseħhu (ara sezzjoni 4). Jekk tiġi affettwat huma m'għandekx issuq jew thaddem magni.

Tgħarif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Losec

Il-pilloli gastroreżistenti Losec fihom sucrose. Jekk it-tabib qallek li għandek xi intolleranza għal xi tipi ta' zokkor, għamel kuntatt mat-tabib tiegħek qabel tiehu din il-medicina.

3. KIF GHANDEK TIEHU LOSEC

Dejjem għandek tiehu Losec skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża li soltu tinghata hija **pillola waħda ta' 20 mg** jew żewġ pilloli ta' 10 mg darba kuljum għal 14-il jum. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk inti jkun għad għandek is-sintomi wara dan il-perjodu.

Jista' jkun mehtieg li tiehu l-pilloli għal 2-3 ijiem biex is-sintomi jmorru għall-aħjar.

Meta tiehu din il-medicina

- Huwa rakkomandat li tiehu l-pilloli filghodu.
- Tista' tiehu l-pilloli mal-ikel jew fuq stonku vojta.
- Ibla' il-kapsuli shah ma' nofs tazza ilma. Tomghodx jew tkisser il-pilloli. Dan għaliex il-kapsuli fihom pritikuni miksijin li jipprotegu l-pilloli milli jtkissru mill-aċidu tal-istonku. Huwa importanti li ma ssirx hsara lil pritikuni. Dawn il-mikropritikuni fihom is-sustanza attiva omeprazole u għandhom kisja enterika li tipprotegihom milli jtkissru waqt li jkunu għaddejjin mill-istonku. Il-pritikuni jerhu is-sustanza attiva fl-intestini, minn fejn tigi assorbita mill-gisem biex tagħti effett. Losec jigi f'pilloli MUPS® bi brevett għat-teknologija tal-mikropritikuni,

X'għandek tagħmel jekk int jew it-tfal għandkom problema biex tibilghu l-pilloli

- Jekk int għandek problema biex tibra' l-pilloli:
 - Kisser il-pillola u ferrex il-kontenut direttament go mgħarfa ilma (mhux bil-gass) kwalunkwe meraq tal-frott aċiduż (eż. tuffieħ, laring u pineapple) jew pure tat-tuffieħ.
 - Dejjem hawwad it-tahlita eżatt qabel tixrobha (it-tahlita tkun imdardra). Imbagħad ixrob it-tahlita minnufih jew fi żmien 30 minuta.
 - Biex tkun ċert li xrobt il-medicina kollha, laħlaħ it-tazza tajjeb hafna b'nofs tazza ilma u ixrobha. **Tużax** halib jew ilma bil-gass. Il-biċċiet solidi fihom il-medicina - tomghodhomx u tkissirhomx

Jekk tiehu Losec aktar milli suppost

Jekk tiehu aktar kapsuli Losec milli ippriskrevilek it-tabib, kellem lit-tabib jew spizjar tiegħek minnufih.

Jekk tinsa tiehu Losec

Jekk tinsa tiehu doża, huwa malli tiftakar. Madankollu jekk ikun wasal il-hin għad-doża li jkun imissek, aqbez id-doża li tkun insejt. M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull pillola doża li tkun insejt tiehu.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, Losec jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Jekk tinnota xi effetti sekondarji rari iżda serji minn dawn li ġejjin, ieqaf iehu Losec u kkuntattja tabib minnufih:

- Tisfir f'daqqa fis-sider, nefha f'xofftejk, f'islenek u fi grisżmejk jew f'gismek, raxx, iħossok ħazin jew ikollok diffikultajiet biex tibra' (reazzjoni allergika qawwija)
- Hmura fil-gilda b'infafet u tqaxxir. Jista' jkun hemm infafet severi u fsada mix-xofftejn, mill-ghajnejn, mill-halq, mill-imnieher u mill-ġenitali. Din tista tkun 'sindrome ta' Stevens-Johnson' jew 'nekrolizi epidermali tossika'
- Gilda safra, awrina skura jew għeja li jistgħu jkunu sintomi ta' problemi tal-fwied

Effetti sekondarji jistgħu jseħhu b'ċerti frekwenzi, li huma ddefiniti kif ġej:

Komuni hafna:	jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 li jużawh
Komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 100 li jużawh
Mhux komuni:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 1,000 li jużawh
Rari:	jaffettwaw minn 1 sa 10 minn kull 10,000 li jużawh
Rari hafna:	affects less than 1 minn kull 10,000 li jużawh
Mhux magħruf:	il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli

Effetti sekondarji ohra jinkludu:

Effetti sekondarji komuni

- Uġigh ta' ras
- Effetti fuq l-istonku jew l-imsaren: dijarea, uġigh fl-istonku, stitikezza, gass.
- Tqalligh (dardir) jew rimettar.

Effetti sekondarji mhux komuni

- Nefha fis-saqajn u fl-għekiesi.
- Disturb fl-irqad (insomnija).
- Sturdament, thoss tingiż f'idejk u saqajk, thossok trid torqod.
- Thoss rasek iddur bik (vertigini).
- Tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demmm li juru kif qed jaħdem il-fwied.
- Raxx fil-gilda, raxx bil-boċċi (horriqija) u ħakk fil-gilda.
- Thossok ma tiflaħx b'mod ġenerali u nuqqas ta' enerġija.

Effetti sekondarji rari

- Problemi fid-demmm bħal nuqqas ta' ċelloli bojod jew plejtlits. Dan jista' jikkawża dgħufija, tbengiġi jew ikabbar il-possibiltà ta' infezzjonijiet.
- Reazzjonijiet allergiċi, xi kultant qawwija hafna, li tinkludi nefha fix-xofftejn, fl-ilsien u fil-grizmejn, deni u tisfir fis-sider.
- Livelli baxxi ta' sodium fid-demmm. Dan jista' jikkawża dgħufija, rimettar u bughawwigijiet.
- Thossok aġitat, konfuż u depressat.
- Tibdilet fil-mod kif ittiegħem.
- Problemi bil-vista bħal vista mċajpra.
- F'daqq wahda thoss tisfir f'sidrek jew qtugħ ta' nifs (bronkospazmu).
- Ħalq xott.
- Infjammazzjoni fuq ġewwa tal-ħalq.
- Infezzjoni msejjha "thrush" li tista' taffetwa l-imsaren u hija kkawzata minn fungu.
- Problemi fil-fwied, li jinkludu suffejra li tista' tikkawża sfurija fil-gilda, awrina skura, u gheja.
- Xagħar li jehfief (alopecja).
- Raxx fil-gilda meta tiġi espota għax-xemx.
- Uġigh fil-ġogi (artralġja) jew uġigh fil-muskoli (mijalġja).
- Problemi qawwija fil-kliewi (nefrite tal-interstizju).
- Żieda fl-għaraq.

Effetti sekondarji rari hafna

- Tibdil fl-għadd tad-demmm li jinkludi agranuloċitosi (nuqqas ta' ċelloli bojod tad-demmm).
- Aggressjoni.
- Tara', thoss u tisma affarijiet li ma jkunux hemm (allucinazzjonijiet).
- Problemi qawwija fil-fwied li jwasslu għal insuffiċjenza tal-fwied u infjammazzjoni tal-moħħ.
- Raxx qawwi jew infafet jew tqaxxir tal-gilda li jfiegħ f'daqqa wahda. Dan jista' jkun assoċjat ma' deni qawwi u uġigh fil-ġogi (Erythema multiforme, sindrome ta' Stevens-Johnson, nekrolizi epidermali tossika).
- Dgħufija fil-muskoli.
- Tkabbir tas-sider fl-irġiel.

- Ipomagnesiumja

Losec jista' f'kazijiet rari jaffetwa ċ-ċelloli bojod tad-demmi u jwassal għal immunità dgħajfa. Jekk għandek xi infezzjoni b'sintomi bħal deni fejn il-kundizzjoni ġenerali tiegħek hija hażina **hażna** jew deni b'sintomi ta' infezzjoni lokali bħal uġiġh fl-għonq, fil-grizmejn jew fil-halq jew diffikultajiet biex tghaddi l-awrina, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih, sabiex tiġi eskluża l-possibiltà li m'hemmx nuqqas ta' ċelloli bojod fid-demmi (agranuloċitozi) permezz ta' test tad-demmi. Huwa importanti li inti tagħti informazzjoni dwar il-medicina tiegħek f'dan il-waqt.

M'għandekx tkun mħasseb b'din il-lista ta' effetti sekondarji li huma possibbli. Jista' jkun li ma jkollok l-ebda waħda minnhom. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN LOSEC

- Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
- Tużax Losec wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett ta' ġewwa u ta' barra wara EXP. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar
- Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.
- Aħżen din il-folja fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità
- Il-medicini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill ispiżjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għandekx bżonn. Dawn il-mizuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih Losec:

- Is-sustanza attiva hi omeprazole. Il-pilloli gastroreżistenti Losec fihom omeprazole magnesium ekwivalenti għal 10 mg, jew 20 mg ta' omeprazole.
- Is-sustanzi l-oħra huma microcrystalline cellulose, glyceryl monostearate, hydroxypropylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, methacrylic acid co-polymer, sferi taz-zokkor, paraffin, macrogol (polyethylene glycol), polysorbate, polyvinylpyrrolidone crosslinked, sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH), sodium stearyl fumarate, talc, triethyl citrate, iron oxide, titanium dioxide.

Id-Dehra ta' Losec u l-kontenuti tal-pakkett:

- Il-pilloli gastroreżistenti Losec 10 mg huma pilloli roża ċari b'  jew  fuq naħa waħda u b' 10 mg fuq in-naħa l-oħra
- Il-pilloli gastroreżistenti Losec 20 mg huma pilloli roża b'  jew  fuq naħa waħda u b' 20 mg fuq in-naħa l-oħra.

Daqs tal-pakketti:

- 10 mg:
 - o Folji ta' 7, 14, 28 pillola
- 20 mg:
 - o Folji ta' 7, 14 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni ghat-tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f' {XX/SSSS}.

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]