

Anness III

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, tikkettar u fuljett ta' tagħrif

Nota:

Dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikkettar u fuljett ta' tagħrif huwa r-riżultat tal-proċedura ta' riferiment li għandha x'taqsam magħha din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

L-informazzjoni dwar il-prodott tista' tiġi aġġornata sussegwentament mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b'kollaborazzjon mal-Istat Membru ta' Referenza, kif xieraq, skont il-proċedura stabbilita fil-Kapitolu 4 tat-Titlu III tad-Direttiva 2001/83/KE.

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT,
TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF**

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 25 mg pilloli miksijin b'rita
Seroquel 100 mg pilloli miksijin b'rita
Seroquel 150 mg miksijin b'rita
Seroquel 200 mg pilloli miksijin b'ritad
Seroquel 300 mg pilloli miksijin b'rita
Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem (Pakkett Ikkombinat)
Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 4 ijiem

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Seroquel 25 mg fih 25 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 18 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola

Seroquel 100 mg fih 100 mg quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjenti : 20 mg ta' lattosju (anhydrous) f'kull pillola

Seroquel 150 mg fih 150 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 29 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola

Seroquel 200 mg fih 200 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 39 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola

Seroquel 300 mg fih 300 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 59 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola

Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem (Pakkett ikkombinat) fih 6 pilloli Seroquel 25 mg u 2 pilloli Seroquel 100 mg

Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 4 ijiem fih 6 pilloli Seroquel 25 mg, 3 pilloli Seroquel 100 mg u pillola waħda Seroquel 200 mg

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li miksija b'rita
Seroquel 25 mg pilloli miksijin b'rita huma kulur il-hawh, tondi u konvessi, u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 25 fuq naħa waħda
Seroquel 100 mg pilloli miksijin b'rita huma sofor, tondi u konvessi, u għandhom imnaqqxa SEROQUEL fuq naħa waħda
Seroquel 150 mg pilloli miksijin b'rita huma sofor ċari, tondi u konvessi u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 150 fuq naħa waħda
Seroquel 200 mg pilloli miksijin b'rita huma bojod, tondi u konvessi u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 200 fuq naħa waħda
Seroquel 300 mg pilloli miksijin b'rita huma bojod, f'forma ta' kapsula u għandhom imnaqqxa SEROQUEL fuq naħa waħda u 300 fuq in-naħa l-oħra

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Seroquel huwa indikat għal:

- kura ta' Skizofrenija
- kura ta' disturb bipolari:
 - o Għall-kura ta' episodji manijaċi moderati għal severi f'disturb bipolari
 - o Għall-kura ta' episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolari
 - o Għall-prevenzjoni ta' rikorrenza ta' episodji manijaċi jew depressivi f'pazjenti b'disturb bipolari li qabel irrispondew għall-kura bi quetiapine.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jinghata

Jeżistu skedi differenti ta' dożaġġ għal kull indikazzjoni. Għalhekk għandu jiġi aċċertat li l-pazjenti jirċievu informazzjoni ċara dwar id-dożaġġ xieraq għall-kondizzjoni tagħhom.

Seroquel jista' jinghata darba, mal-ikel jew minghajr ikel.

Adulti:

Għall-kura ta' skizofrenija

Għall-kura ta' skizofrenija, Seroquel għandu jinghata darbtejn kuljum. Id-doża totali ta' kuljum għall-ewwel erbat ijiem ta' terapija hija 50 mg (Jum 1), 100 mg (Jum 2), 200 mg (Jum 3) u 300 mg (Jum 4). Minn Jum 4 'il quddiem, id-doża għandha tkun ittitrata għad-doża effettiva tas-soltu ta' 300 sa 450 mg/kuljum. Skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali, id-doża tista' tiġi aġġustata fil-medda ta' bejn 150 sa 750 mg/kuljum.

Għall-kura ta' episodji manijaċi moderati sa severi f'disturbi bipolari

Għall-kura ta' episodji manijaċi assoċjati ma' disturbi bipolari, Seroquel għandu jinghata darbtejn kuljum. Id-doża ta' kuljum totali għall-ewwel erbat ijiem ta' terapija hija ta' 100 mg (Jum 1), 200 mg (Jum 2), 300 mg (Jum 3) u 400 mg (Jum 4). Aktar aġġustamenti tad-doża sa 800 mg/jum sa Jum 6 għandhom ikunu b'żidiet ta' mhux aktar minn 200 mg/kuljum.

Id-doża tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali, fil-medda ta' 200 sa 800 mg/kuljum. Id-doża effettiva tas-soltu hija fil-medda ta' 500 sa 800 mg/kuljum.

Għall-kura ta' episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolari

Seroquel għandu jinghata darba kuljum fil-hin tal-irquad. Id-doża totali ta' kuljum għall-ewwel erbat ijiem ta' terapija hija ta' 50 mg (Jum 1), 100 mg (Jum 2), 200 mg (Jum 3) u 300 mg (Jum 4). Id-doża rakkomandata ta' kuljum hija ta' 300 mg. Fi provi kliniċi, ma deher l-ebda benefiċċju addizzjonali fil-grupp fuq 600 mg meta mqabbel mal-grupp fuq 300 mg (ara sezzjoni 5.1). Pazjenti individwali jistgħu jibbenefikaw minn doża ta' 600 mg. Dozi oġġla minn 300 mg għandhom jinbnew minn tobbja b'esperjenza fil-kura ta' disturb bipolari. F'pazjenti individwali, fil-każ li jkun hemm tħassib dwar it-tolleranza, provi kliniċi indikaw li jista' jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża għal minimu ta' 200 mg.

Għall-prevenzjoni ta' rikorrenza f'disturb bipolari

Biex jiġi evitat li jkun hemm rikorrenza ta' episodji manijaċi, mhalltin jew depressivi f'disturb bipolari, pazjenti li rrispondew għal quetiapine għall-kura akuta ta' disturb bipolari għandhom ikomplu fuq terapija fl-istess doża. Id-doża ta' Seroquel tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali fil-medda tad-doża ta' 300 għal 800 mg/kuljum li tinghata darbtejn kuljum. Huwa importanti li għat-terapija ta' manteniment tintuża l-aktar doża baxxa effettiva.

Anzjani:

Bhal b'mediċini antipsikotiċi oħra, Seroquel għandu jintuża b'kawtela fl-anzjani, speċjalment matul il-perijodu inizjali ta' meta jibdew jinghataw id-dozi. Ir-rata tat-titrazzjoni tad-doża jista' jkollha bżonn tkun aktar bil-mod, u d-doża terapewtika ta' kuljum jista' jkollha tkun aktar baxxa, minn dik li tintuża

f'pazjenti iżghar, skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali. Il-medja ta' eliminazzjoni ta' quetiapine mill-plażma tnaqqset bi 30% għal 50% f'pazjenti anzjani meta mqabbla ma' pazjenti iżghar.

L-effikaċja u s-sigurtà ma' ġewx ivvalutati f'pazjenti 'l-fuq minn 65 sena b'episodji depressivi fil-qafas ta' disturb bipolari.

Popolazzjoni Pedjatrika

Seroquel mhuwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l-adolesxenti taht it-18-il sena, minhabba nuqqas ta' dejta li tappoġġa l-użu f'dan il-grupp ta' etajiet. L-evidenza disponibbli minn provi kliniċi kkontrollati bi placebo hija pprezentata fis-sezzjonijiet 4.4, 4.8, 5.1 u 5.2.

Indeboliment tal-Kliwi:

M'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f'pazjenti b'indeboliment tal-kliwi.

Indeboliment tal-Fwied:

Quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied. Għalhekk, Seroquel għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkun magħruf li għandhom indeboliment tal-fwied, speċjalment matul il-perjodu inizjali ta' meta jibdwu jingħataw id-dożi. Pazjenti b'indeboliment tal-fwied magħruf għandhom jindew b'25 mg/kuljum. Id-dożaġġ għandu jiżdied kuljum f'inkrementi ta' 25- 50 mg/kuljum sa dożaġġ effettiv, skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

L-ġhoti konkomitanti ta' inibituri taċ-ċitokromju P450 3A4, bħal inibituri tal-protease tal-HIV, aġenti antifungal azole, erythromycin, clarithromycin u nefazodone, huwa kontraindikat. (Ara wkoll sezzjoni 4.5)

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzzjonijiet għall-użu

Minhabba li Seroquel għandu diversi indikazzjonijiet, il-profil tas-sigurtà għandu jitqies fir-rigward tad-dijanjożi tal-pazjent individwali u d-doża li tkun qed tingħata.

Popolazzjoni pedjatrika

Quetiapine mhuwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u adolesxenti taht it-18 il sena, minhabba nuqqas ta' data li tappoġġa l-użu f'dan il-grupp ta' etajiet. Provi kliniċi bi quetiapine wrew li minbarra l-profil ta' sigurtà magħruf identifikat fl-adulti (ara sezzjoni 4.8), ċerti avveniment avversi sehhew bi frekwenza oġġla fit-tfal u l-adolesxenti meta mqabbla mal-adulti (żieda fl-apetit, żidiet tal-prolaktin fis-serum, rimettar, rinrite u sinkope) jew jista' jkollu implikazzjonijiet differenti għat-tfal u l-adolesxenti (sintomi ekstrapiramidali u irritabilità) u wieħed kien identifikat li ma kienx deherx qabel fl-istudju fuq l-adulti (żidiet fil-pressjoni tad-demm). Fit-tfal u l-adolesxenti kienu osservati wkoll bidliet fit-testijiet tal-funzjoni tat-tirojde.

Barra minn hekk, l-implikazzjonijiet tas-sigurtà fit-tul tal-kura bi quetiapine fuq it-tkabbir u l-maturazzjoni ma' ġewx studjati għal aktar minn 26 ġimġha. L-implikazzjonijiet fit-tul għall-iżvilupp konjittiv u tal-imġiba mhumiex magħrufa.

Fi provi kliniċi kkontrollati bi placebo b'pazjenti tfal u adolesxenti, quetiapine kien assoċjat ma' żieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali (EPS) meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal skizofrenja, manija bipolari, u dipressjoni bipolari (ara sezzjoni 4.8).

Suwiċidju/ħsibijiet suwiċidali jew aggravar kliniku:

Id-dipressjoni f'disturbi bipolari hija assoċjata ma' riskju akbar ta' hsibijiet suwiċidali, li pazjenti jweggħu lilhom infushom u suwiċidju (avvenimenti relatati mas-suwiċidju). Dan ir-riskju jippersisti sakemm ikun hemm remissjoni sinifikanti. Minhabba li matul l-ewwel ftit ġimghat jew aktar tal-kura jista' ma jkunx hemm titjib, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib sakemm isehh dan it-titjib. Mill-esperjenza klinika ġenerali r-riskju ta' suwiċidju jista' jizdied fl-istadji bikrin tal-irkupru.

Barra minn hekk it-tobba għandhom iqisu wkoll ir-riskju potenzjali ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju wara li l-kura bi quetiapine titwaqqaf f'daqqa, minhabba l-fatturi ta' riskju magħrufa għall-marda li tkun qed tiġi trattata.

Kundizzjonijiet psikjatriċi ohra li għalihom jiġi preskritt quetiapine jistgħu ukoll ikunu assoċjati ma' riskju akbar ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju. Barra minn hekk, dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jsehhu flimkien ma' episodji depressivi maġġuri. Għalhekk waqt il-kura ta' pazjenti b'disturbi psikjatriċi ohra għandhom jiġu osservati l-istess prekawzjonijiet li jiġu osservati waqt il-kura ta' pazjenti b'episodji depressivi maġġuri.

Pazjenti bi storja ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju, jew dawk li juru grad sinifikanti ta' hsibijiet suwiċidali qabel jibdwu il-kura huma magħrufa li jista' jkollhom riskju akbar ta' hsibijiet suwiċidali jew attentati ta' suwiċidju, u għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa waqt il-kura. Meta-analiżi ta' provi kliniċi kkontrollati bi placebo ta' mediċini kontra d-dipressjoni f'pazjenti adulti b'disturbi psikjatriċi uriet riskju akbar ta' mġieba suwiċidali b'mediċini kontra d-dipressjoni meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti taħt il-25 sena.

Flimkien mat-terapija bil-mediċina għandu jkun hemm sorveljanza mill-qrib tal-pazjenti u b'mod partikolari dawk li qegħdin f'riskju għoli speċjalment fil-bidu tal-kura u wara tibdil fid-doża. Il-pazjenti (u dawk li jieħdu hsieb il-pazjenti) għandhom jiġu avżati dwar il-htieġa li jimmonitorjaw għal kull deterjorament kliniku, imġieba jew hsibijiet suwiċidali u bidliet mhux tas-soltu fl-imġieba u biex ifittxu parir mediku minnufih jekk dawn is-sintomi jippersistu.

Fi studji kliniċi fuq zmien qasir ikkontrollati bi placebo ta' pazjenti b'episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolari kienet osservata żieda fir-riskju ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju f'pazjenti adulti żgħar (ta' anqas minn 25 sena) li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine meta mqabbla ma' dawk li kienu qed jirċievu kura bi placebo (3.0% kontra 0%, rispettivamente).

Riskju metaboliku

Minhabba r-riskju osservat għal aggravar tal-profil metaboliku tagħhom, inkluż tibdil fil-piż, glukosju (ara iperglicemija) u lipidi fid-demm, li deher fl-istudji kliniċi, fil-bidu tal-kura għandhom jiġu vvalutati l-parametri metabolici tal-pazjent u bidliet f'dawn il-parametri għandhom jiġu kkontrollati regolarment matul il-kors tal-kura. Aggravar f'dawn il-parametri għandu jiġi ġestit kif klinikament xieraq (ara wkoll sezzjoni 4.8).

Sintomi ekstrapiramidali:

Fi provi kliniċi kkontrollati bi placebo f'pazjenti adulti quetiapine kien assoċjat ma' żieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali (EPS) meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal episodji depressivi maġġuri f'disturbi bipolari (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

L-użu ta' quetiapine kien assoċjat mal-iżvilupp ta' akatizja, ikkaratterizzata minn irrikwjetezza sogġettivament spjaċevoli jew stressanti jew il-htieġa li jiċċaqalqu ta' spiss flimkien ma' inkapaċità li joqgħodu bilqieghda jew li jieqfu milli jiċċaqalqu. Dan huwa aktar probabbli li jsehh fl-ewwel ftit ġimghat ta' kura. F'pazjenti li jizviluppaw dawn is-sintomi, żieda fid-doża tista' tkun detrimental.

Diskinesija Tardiva:

Jekk ikun hemm sinjali u sintomi ta' diskinesija tardiva, għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża jew it-twaqqif ta' quetiapine. Is-sintomi ta' diskajnezja tardiva jistgħu jaggravaw jew saħansitra jitfaċċaw wara li titwaqqaf il-kura (ara Sezzjoni 4.8).

Nghas u sturdament:

Il-kura bi quetiapine kienet assoċjata ma' nghas u sintomi relatati, bħal sedazzjoni (ara Sezzjoni 4.8). Fi provi kliniċi għall-kura ta' pazjenti b'dipressjoni bipolari u b'disturb depressiv maġġuri, generalment dan beda fi żmien l-ewwel 3 ijiem tal-kura u predominantement kien ta' intensità hafifa għal moderata. Pazjenti li jesperjenzaw nghas ta' intensità severa jistgħu jehtieġu kuntatt aktar frekwenti għal minimu ta' ġimagħtejn mill-bidu tan-nghas, jew sakemm is-sintomi jitjiebu u jista' jkun hemm il-htieġa li jiġi kkunsidrat li l-kura titwaqqaf.

Pressjoni Baxxa Ortostatika:

Il-kura bi quetiapine kienet assoċjata ma' pressjoni baxxa ortostatika u sturdament relatat (ara Sezzjoni 4.8) li, bħan-nghas normalment tibda matul il-perjodu inizjali tat-titrazzjoni tad-doża. Dan jista' jżid l-inċidenza ta' korrimment aċċidentali (waqgħat), speċjalment fil-popolazzjoni anzjana. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti sakemm ikunu familjari mal-effetti potenzjali tal-medikazzjoni.

Quetiapine għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkun magħruf li jkollhom mard kardjovaskulari, mard ċerebrovaskulari, jew kundizzjonijiet oħra li jippreddisponu għal pressjoni baxxa. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa ortostatika għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża jew titrazzjoni aktar bil-mod, speċjalment f'pazjenti b'mard kardjovaskulari sottostanti.

Aċċessjonijiet:

Fi provi kliniċi kkontrollati ma kien hemm l-ebda differenza fl-inċidenza ta' aċċessjonijiet f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine jew placebo. Ma hemm l-ebda dejta disponibbli dwar l-inċidenza ta' aċċessjonijiet f'pazjenti bi storja ta' aċċessjonijiet. Bħal b'antipsikotiċi oħra, hija rakkomandata kawtela waqt il-kura ta' pazjenti bi storja ta' aċċessjonijiet (ara Sezzjoni 4.8).

Sindromu Newrolettiku Malinn:

Is-sindromu newrolettiku malinn kien assoċjat ma' kura b'antipsikotiċi, inkluż quetiapine (ara sezzjoni 4.8). Il-manifestazzjonijiet kliniċi jinkludu ipertermja, stat mentali alterat, riġidità muskolari, instabilità awtonomika, u zieda fil-creatine phosphokinase. F'dan il-każ, quetiapine għandu jitwaqqaf u għandha tingħata kura medika adattata.

Newtopenja severa u agranuloċitosi:

Fi provi kliniċi bi quetiapine newtopenja severa (għadd tan-newtrofili $<0.5 \times 10^9/L$) kienet irrapportata. Hafna mill-każijiet ta' newtopenja severa sehhew fi żmien ftit xhur mill-bidu tat-terapija bi quetiapine. Ma kien hemm l-ebda relazzjoni apparenti mad-doża. Matul l-esperjenza ta' wara tqegħid fis-suq, xi każijiet kienu fatali. Fatturi ta' riskju possibbli għal newtopenja jinkludu għadd baxx ta' ċelluli bojod (WBC) pre-eżistenti u storja ta' newtopenja ikkawżata mill-medicina. Madankollu, xi każijiet sehhew f'pazjenti mingħajr fatturi ta' riskju pre-eżistenti. Quetiapine għandu jitwaqqaf f'pazjenti b'għadd tan-newtrofili $<1.0 \times 10^9/L$. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' infezzjoni u l-għadd tan-newtrofili għandu jiġi segwit (sakemm jaqbeż $1.5 \times 10^9/L$) (ara sezzjoni 5.1).

In-newtopenja għandha tiġi kkunsidrata f'pazjenti li jippreżentaw b'infezzjoni jew deni, partikularment fin-nuqqas ta' fattur (i) ovvju(i) ta' predispożizzjoni, u għandha tiġi kkontrollata b'mod klinikament xieraq.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jirrapportaw minnufih id-dehra ta' sinjali/sintomi konsistenti ma' agranuloċitosi jew infezzjoni (eż., deni, dghjufija, letargija, jew uġiġh fil-grizmejn) fi kwalunkwe hin matul it-terapija b'Seroquel. Dawn il-pazjenti għandu jsirihom għadd fil-pront tal-WBC u tal-ANC, speċjalment fin-nuqqas ta' fatturi ta' predispożizzjoni.

Interazzjonijiet

Ara wkoll sezzjoni 4.5.

L-użu konkomitanti ta' quetiapine ma' indutturi qawwija ta' enzimi epatici bhal carbamazepine jew phenytoin inaqas sostanzjalment il-koncentrazzjonijiet ta' quetiapine fil-plasma, li jista' jaffettwa l-effikaċja tat-terapija bi quetiapine. F'pazjenti li jkunu qed jirċievu indutturi tal-enzimi epatici, il-kura bi quetiapine għandha tinbeda biss jekk it-tabib iqis li l-benefiċċji ta' quetiapine jegħlbu r-riskji tat-tnehhija tal-indutturi tal-enzimi epatici. Huwa importanti li kwalunkwe bidla fl-induttur tkun gradwali, u jekk ikun meħtieġ, jiġi sostitwit ma' wieħed mhux induttur (eż. sodium valproate).

Piż

Żieda fil-piż kienet irrapportata f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine, u għandha tiġi mmonitorjata u kkontrollata b'mod klinikament xieraq skont il-linji gwida tal-antipsikotiċi li jkunu qed jintużaw (Ara Sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Iperglicemija

Iperglicemija u/jew l-iżvilupp jew l-aggravar tad-dijabete xi kultant assoċjata ma' ketoacidożi jew koma kienet irrapportata b'mod rari, inklużi xi każijiet fatali (ara sezzjoni 4.8). F'xi każijiet, kienet irrapportata żieda preċedenti fil-piż tal-ġisem li tista' tkun fattur ta' predispożizzjoni. Huwa rrakkomandat li jkun hemm monitoraġġ kliniku adattat skont il-linji gwida tal-antipsikotiċi li jkunu qed jintużaw. Il-pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b'xi aġent antipsikotiku inkluż quetiapine, għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' iperglicemija, (bhal polidipsja, polijurja, polifagja u dgħjufija) u l-pazjenti b'dijabete mellitus jew b'fatturi ta' riskju għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b'mod regolari għal aggravar tal-kontroll tal-glukosju. Il-piż għandu jiġi mmonitorjat b'mod regolari .

Lipidi

Fi provi kliniċi bi quetiapine ġew osservati żidiet fit-trigliceridi, l-LDL u l-kolesterol totali, u tnaqqis fil-kolesterol HDL (ara sezzjoni 4.8). Bidliet fil-lipidi għandhom jiġu ġestiti b'mod klinikament xieraq.

Titwil tal-QT

Fi provi kliniċi u waqt l-użu skont l-SPC, quetiapine ma' kienx assoċjat ma' żieda persistenti fl-intervalli assoluti tal-QT. Wara t-tqeghid fis-suq, it-titwil tal-QT kien irrapportat bi quetiapine fid-dożi terapewtiċi (ara Sezzjoni 4.8) u f'doża eċċessiva (ara Sezzjoni 4.9). Bhal b'antipsikotiċi oħra, għandha tiġi eżerċitata kawtela meta quetiapine jiġi preskritt lil pazjenti b'mard kardjovaskulari jew bi storja familjari ta' titwil tal-QT. Għandha wkoll tiġi eżerċitata kawtela meta quetiapine jiġi preskritt jew ma' mediċini magħrufa li jżidu l-intervall tal-QT, jew ma' newrolettici konkomitanti, speċjalment fl-anzjani, f'pazjenti b'sindromu kongenitali ta' QT twil, insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, ipertrofija tal-qalb, ipokalemija jew ipomagnesimja (ara sezzjoni 4.5).

Kardjomijopatija u Mijokardite

Kardjomijopatija u mijokardite ġew irrapportati fi provi kliniċi u waqt l-esperjenza wara tqeghid fis-suq, madankollu, ma' gietx stabbilita relazzjoni kawżali ma' quetiapine. Il-kura bi quetiapine għandha tiġi vvalutata mill-ġdid f'pazjenti b'suspett ta' kardjomijopatija jew mijokardite.

Irtirar

Sintomi akuti ta' irtirar bhal insomnija, dardir, uġigh ta' ras, dijarea, rimettar, sturdament, u irritabilità kienu deskritti wara l-waqfien f'daqqa ta' quetiapine. Huwa rrakkomandat li jkun hemm twaqqif gradwali fuq perjodu ta' mill-inqas ġimgħa sa ġimagħtejn.(ara sezzjoni 4.8)

Pazjenti anzjani bi psikożi relatata mad-dimenzja

Quetiapine mhuwiex approvat għall-kura ta' psikożi relatata mad-dimenzja.

Fi provi randomizzati kkontrollati bi placebo fil-popolazzjoni b'dimenzja dehret żieda ta' madwar 3-darbiet fir-riskju ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi b'ċerti antipsikotiċi atipici. Il-mekkaniżmu għal din iż-żieda fir-riskju mhuwiex magħruf. Ma tistax tiġi eskluża żieda fir-riskju għal antipsikotiċi

ohra jew ghal popolazzjonijiet ohra ta' pazjenti. Quetiapine ghandu jintuza b'kawtela f'pazjenti b'fatturi ta' riskju ghal puplesija.

F'meta-analizi ta' antipsikotiċi atipici, gie rrapportat li pazjenti anzjani bi psikozi relatata mad-dimenzja huma f'riskju akbar ta' mewt meta mqabbla ma' placebo. Madankollu, f'zewg studji ta' 10 ġimghat ikkontrollati bi placebo ta' quetiapine fl-istess popolazzjoni ta' pazjenti (n=710; età medja: 83 sena; medda: 56-99 sena) l-inċidenza ta' mortalità f'pazjenti li kienu qed jinghataw kura bi quetiapine kienet ta' 5.5% kontra 3.2% fil-grupp tal-placebo. Il-pazjenti f'dawn il-provi mietu minhabba varjetà ta' kawzi li kienu konsistenti mal-aspettattivi ghal din il-popolazzjoni. Din id-dejta ma tistabilixxix relazzjoni kawżali bejn kura bi quetiapine u mewt f'pazjenti anzjani bid-dimenzja.

Disfaġja

Disfaġja (Ara sezzjoni 4.8) kienet irrapportata bi quetiapine. Quetiapine ghandu jintuza b'kawtela f'pazjenti b'riskju ta' pnemonja b'aspirazzjoni.

Stitikezza u ostruzzjoni intestinali

L-istitikezza tirrappreżenta fattur ta' riskju ghal ostruzzjoni intestinali. Stitikezza u ostruzzjoni intestinali kienu rrapportati bi quetiapine (ara sezzjoni 4.8 Effetti Mhux Mixtieqa). Dan jinkludi rapporti fatali f'pazjenti li qeghdin f'riskju ogħla ta' ostruzzjoni intestinali, inklużi dawk li qed jirċievu bosta medikazzjonijiet konkometanti li jnaqqsu l-motilità intestinali u/jew li jistgħu ma jirrapportawx is-sintomi ta' stitikezza. Pazjenti b'ostruzzjoni intestinali/ileju għandhom jiġu ġestiti b'monitoraġġ mill-qrib u kura urgenti.

Tromboemboliżmu fil-Vini (VTE)

Każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini (VTE) kienu rrapportati b'medicini antipsikotiċi. Minhabba li hafna drabi pazjenti li jkun qad jirċievu kura b'antipsikotiċi jipprezentaw b'fatturi akkwiziżiti ta' riskju ghal VTE, għandhom jiġu identifikati l-fatturi kollha possibbli ta' riskju ghal VTE qabel u waqt il-kura bi quetiapine u għandhom jittiehdu miżuri preventivi.

Pankreatite

Pankreatite kienet irrapportata fi provi kliniċi u waqt l-esperjenza wara t-tqeghid fis-suq. Fost ir-rapporti ta' wara t-tqeghid fis-suq, filwaqt li mhux il-każijiet kollha kienu mfixkla minn fatturi ta' riskju, hafna pazjenti kellhom fatturi li huma magħrufa li huma assoċjati ma' pankreatite bħal zieda fit-trigliceridi (ara sezzjoni 4.4), ġebel fil-marrara, u konsum ta' alkohol.

Aktar tagħrif

Id-dejta dwar quetiapine f'kombinazzjoni ma' divalproex jew lithium f'episodji manijaċi akuti moderati ghal severi hija limitata; madankollu, it-terapija kkombinata kienet ittollerata sew (ara sezzjoni 4.8 u 5.1). Id-dejta uriet effett ulterjuri fil-ġimgha 3.

Lattosju

Il-pilloli Seroquel fihom il-lattosju. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza ghal galactose, deficijenza ta' lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m'għandhomx jiehdu din il-medicina .

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Minhabba l-effetti ta' quetiapine fuq is-sistema nervuża ċentrali ewlenija, quetiapine ghandu jintuza b'kawtela meta jinghata flimkien ma' prodotti mediċinali ohra li jaġixxu fuq is-sistema ċentrali u mal-alkohol .

Iċ-ċitokromju P450 (CYP) 3A4 huwa l-enzim primarjament responsabbli għall-metabolizmu ta' quetiapine medjat miċ-ċitokromju P450. Fi studju ta' interazzjoni fuq voluntiera b'saħħithom, l-ġhoti ta' quetiapine (doża ta' 25 mg) flimkien ma' ketoconazole, inibitur ta' CYP3A4, ikkawża zieda ta' 5-sa 8-darbiet fl-AUC ta' quetiapine. Abbazi ta' dan, l-użu ta' quetiapine flimkien ma' inibituri ta'

CYP3A4 huwa kontraindikata. Barra minn hekk mhuwiex rakkomandat li jittiehed meraq tal-grejpfrut waqt it-terapija bi quetiapine.

Fi prova b'hafta dozi f'pazjenti sabiex tigi vvalutata l-farmakokinetika ta' quetiapine meta jinghata qabel u waqt il-kura b'carbamazepine (induttur maghruf ta' enzimi epatici), l-ghoti flimkien ta' carbamazepine zied b'mod sinifikanti t-tnehhija ta' quetiapine. Din iz-zieda fit-tnehhija naqqset l-espozizzjoni sistemika ta' quetiapine (kif imkejla bl-AUC) ghal medja ta' 13% tal-espozizzjoni matul l-ghoti ta' quetiapine wahdu; ghalkemm f'xi pazjenti deher effett akbar. Bhala konsegwenza ta' din l-interazzjoni, jista' jkun hemm konċentrazzjonijiet aktar baxxi fil-plasma, li jistghu jaffettwaw l-effikaċja tat-terapija bi quetiapine. L-ghoti ta' quetiapine flimkien ma' phenytoin (induttur iehor tal-enzimi mikrosomali) ikkawza zieda hafta akbar fit-tnehhija ta' quetiapine b'madwar 450%. F'pazjenti li jkunu qed jirċievu induttur tal-enzimi epatici, il-kura bi quetiapine ghandha tinbeda biss jekk it-tabib iqis li l-benefiċċji ta' quetiapine jeghlbu r-riskji tat-tnehhija tal-induttur tal-enzimi epatici. Huwa importanti li kwalunkwe bidla fl-induttur tkun gradwali, u jekk mehtieg, jigi sostitwit b'wiehed li mhux induttur (eż. sodium valproate) (ara sezzjoni 4.4).

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula b'mod sinifikanti bl-ghoti fl-istess hin tal-antidepressanti imipramine (inibitur maghruf ta' CYP 2D6) jew fluoxetine (inibitur maghruf ta' CYP 3A4 u CYP 2D6).

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula b'mod sinifikanti bl-ghoti fl-istess hin tal-antipsikotiċi risperidone jew haloperidol. L-użu konkomitanti ta' quetiapine u thioridazine ikkawza zieda fit-tnehhija ta' quetiapine b'madwar 70%.

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula wara li ngħata flimkien ma' cimetidine.

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula wara li ngħata flimkien ma' quetiapine.

Fi studju randomizzat ta' 6 ġimgħat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra placebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta, kienet osservata inċidenza oghla ta' avvenimenti ekstrapiramidali relatati (b'mod partikulari roghda), ngħas, u zieda fil-piż fil-grupp li kellu lithium miżjud meta mqabbla mal-grupp li kellu placebo miżjud (ara sezzjoni 5.1).

Il-farmakokinetika ta' sodium valproate u quetiapine ma kinitx mibdula b'mod klinikament rilevanti meta ngħataw flimkien. Studju retrospettiv ta' tfal u adolexxenti li rċeview valproate, quetiapine, jew it-tnejn, sab inċidenza oghla ta' lewkopenja u newtropenja fil-grupp tal-kombinazzjoni kontra l-gruppi ta' monoterapija

Ma sarux studji formali ta' interazzjoni bi prodotti mediċinali kardjovaskulari komunement użati.

Ghandha tigi eżerċitata kawtela meta quetiapine jintuza flimkien ma' prodotti mediċinali maghrufa li jikkawżaw zbilanċ fl-elettroliti jew li jżidu l-intervall tal-QT.

Kien hemm rapporti ta' riżultati pożittivi meta fil-fatt kienu negattivi f'immunoassaggi tal-enzimi għal methadone u antidepressanti triċikliċi f'pazjenti li kienu hađu quetiapine. Huwa rakkomandat li riżultati dubjużi ta' skrinjng immunoassagg jigu konfermati b'teknika kromatografika xierqa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

L-ewwel trimestru

L-ammont moderat ta' dejta ppubblikata minn tqaliet esposti (jigifieri bejn 300-1,000 riżultat ta' tqala), inkluz rapporti individwali u xi studji ta' osservazzjoni ma jissuggerixxix riskju miżjud ta' malformazzjonijiet minhabba l-kura. Madankollu, abbażi tad-dejta kollha disponibbli, ma tistax

tinstilet konklużjoni definita. Studji f'annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Għaldaqstant, quetiapine għandu jintuża biss matul tqala jekk il-benefiċċji jiġġustifikaw ir-riskji potenzjali.

It-tielet trimestru

Trabi tat-twelid li kienu esposti għal antipsikotiċi (inkluż quetiapine) matul it-tielet trimestru tat-tqala qegħdin f'riskju ta' reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta' irtirar li jistgħu jvarjaw fis-serjetà u t-tul wara l-hlas. Kien hemm rapporti ta' aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, roġħda, nġhas, distress respiratorju, jew disturb fit-tmiġħ. Konsegwentement, it-trabi tat-twelid għandhom jiġu mmonitorjati b'attenzjoni.

Treddigh

Abbażi ta' dejta limitata hafna minn rapporti ppubblikati dwar it-tneħħija ta' quetiapine fil-halib tas-sider uman, it-tneħħija ta' quetiapine f'dozi terapewtiċi tidher inkonsistenti. Minhabba nuqqas ta' dejta affidabbli, għandha tittiehed deċiżjoni jekk jitwaqqafx it-treddigh jew jekk titwaqqafx it-terapija b'Seroquel b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċju tat-treddigh għat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija għall-mara.

Fertilità

L-effetti ta' quetiapine fuq il-fertilità tal-bniedem ma ġewx iġvalutati. Fil-firien dehru effetti relatati ma' zieda fil-livelli ta' prolactin, għalkemm dawn mhumiex direttament rilevanti għall-bniedem (ara sezzjoni 5.3 tagħrif ta' qabel l-użu kliniku).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Minhabba li l-effetti primarji tiegħu huma fuq is-sistema nervuża ċentrali, quetiapine jista' jinterferixxi ma' attivitajiet li jeħtieġu attenzjoni mentali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew iħaddmu magni, sakemm tkun magħrufa s-suxxettibbiltà individwali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina (ADRs) irrapportati b'mod komuni bi quetiapine ($\geq 10\%$) huma nġhas, sturdament, uġiġħ ta' ras, haq xott, sintomi ta' irtirar (twaqqif), żidiet fil-livelli tat-trigliceridi fis-serum, żidiet fil-kolesterol totali (l-aktar kolesterol LDL), tnaqqis fil-kolesterol HDL, zieda fil-piż, tnaqqis fl-emoglobina u sintomi ekstrapiramidali.

L-inċidenzi ta' ADRs assoċjati ma' terapija bi quetiapine, huma elenkati hawn taht (Tabella 1) skont il-format rakkomandat mill-Kunsill Għall-Organizzazzjonijiet Internazzjonali tax-Xjenzi Mediċi (Grupp ta' Hidma tas-CIOMS III; 1995).

Tabella 1 ADRs assoċjati ma' terapija bi quetiapine

Il-frekwenzi ta' avvenimenti avversi huma kklassifikati skont dawn li ġejjin: Komuni hafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$, $< 1/1000$), rari hafna ($< 1/10,000$), u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli).

SOC	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Rari Hafna	Mhux magħruf
<i>Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika</i>	Tnaqqis fl-emoglobina ²²	Lewkopenja ^{1, 28} , tnaqqis fl-ġhadd tan-newtrofili, zieda fl-esinofili ²⁸	Tromboċitopenja, Anemija, tnaqqis fl-ġhadd tal-plejtlits ¹³	Agranuloċitosi ²⁶		Newtropsenja ¹

SOC	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Rari Hafna	Mhux maghruf
<i>Disturbi fis-sistema immuni</i>			Sensittività eċċessiva (inklużi reazzjonijiet allergiċi fil-gilda)		Reazzjoni anafilattika ⁵	
<i>Disturbi fis-sistema endokrinarja</i>		Iperprolaktinimja ¹⁵ , tnaqqis fit-T4 totali ²⁴ , tnaqqis fit-T4 hieles ²⁴ , tnaqqis fit-T3 totali ²⁴ , zidiet fit-TSH ²⁴	Tnaqqis fit-T3 hieles ²⁴ , Ipotirojdiżmu ²¹		Sekrezzjoni mhux approprijata tal-ormon antidijuretiku	
<i>Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni</i>	Židiet fil-livelli tat-trigliceridi fis-serum ^{10,30} Židiet fil-kolesterol totali (l-aktar kolesterol LDL) ^{11,30} Tnaqqis fil-kolesterol HDL ^{17,30} , Žieda fil-piż ^{8,30}	Žieda fl-aptit, žieda fil-glukosju fid-demm għal livelli iperglicemiċi ^{6,30}	Iponatremja ¹⁹ , Dijabete Mellitus ^{1,5}	Sindromu metaboliku ²⁹	Tahrix ta' dijabete pre-eżistenti	
<i>Disturbi psikjatriċi</i>		Holm abnormali u inkubi, Hsibijiet suwiċidali u mġieba suwiċidali ²⁰		Sonnambuliżmu u reazzjonijiet relatati bħal tpaċpiċ waqt l-irqad u disturbi tal-ikel relatati mal-irqad		
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>	Sturdament ^{4,16} , nġhas ^{2,16} , uġiġħ ta' ras, Sintomi ekstrapiramidali ^{1,21}	Disartrija	Aċċessjonijiet ¹ , Sindromu tas-saqajn irrikwieti, Diskinesija tardiva ^{1,5} , Sinkope ^{4,16}			
<i>Disturbi fil-qalb</i>		Takikardja ⁴ , Palpitazzjonijiet ²³	Titwil tal-QT ^{1,12,18} Bradikardja ³²			
<i>Disturbi fl-ġhajnejn</i>		Vista mċajpra				
<i>Disturbi vaskulari</i>		Ipotensjoni ortostatika ^{4,16}		Tromboemboliżmu u fil-vini ¹		
<i>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</i>		Dispnea ²³	Rinite			

SOC	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Rari Hafna	Mhux maghruf
<i>Disturbi gastro-intestinali</i>	Halq xott	Stitikezza, dispepsja, rimettar ²⁵	Disfaġja ⁷	Pankreatite ¹ , Ostruzzjoni intestinali/ileju		
<i>Disturbi fil-fwied u fil-marrara</i>		Židiet fl-alanine aminotransferas e fis-serum (ALT) ³ , Židiet fil-livelli tal-gamma-GT ³	Židiet fl-aspartate aminotransferas e fis-serum (AST) ³	Suffeġra ⁵ , Epatite		
<i>Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda</i>					Angjoedema ⁵ , Sindromu ta' Stevens-Johnson ⁵	Nekrolizi Epidermali Tossika, Eritema Multiforme
<i>Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi</i>					Rabdomajoliz i	
<i>Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarka</i>			Żamma tal-awrina			
<i>Kondizzjonijiet ta' waqt it-tqala, il-ħlas u wara l-ħlas</i>						Sindromu ta' irtirar tal-medicini fit-trabi tat-twelid ³¹
<i>Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider</i>			Disfunzjoni sesswali	Prijapiżmu, galaktorreja, nefha fis-sider, disturb mestrwali		
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>	Sintomi ta' irtirar ^{1,9}	Astenja ħafifa, edema periferali, irritabilità, deni		Sindromu newrolettiku malinn ¹ , ipotermja		
<i>Investigazzjonijiet</i>				Židiet fil-creatine phosphokinase fid-demm ¹⁴		

1. Ara Sezzjoni 4.4.
2. In-nghas jista' jsehh, normalment matul l-ewwel ġimagħtejn ta' kura u ġeneralment jirriżolvi bl-ġhoti kontinwu ta' quetiapine.
3. Židiet asintomatiċi (bidla min-normal għal > 3X ULN fi kwalunkwe ħin) fit-transaminasi (ALT, AST) jew fil-livelli tal-gamma-GT fis-serum kienu osservati f'xi pazjenti li nġhataw quetiapine. Dawn iż-żidiet kienu ġeneralment reversibbli wara kura kontinwa bi quetiapine.
4. Bħal b'antipsikotiċi oħra b'attività li timblokka l- α 1 adrenergiku, quetiapine jista' komunement jinduċi ipotensjoni ortostatika, assoċjata ma' sturdament, takikardja u, f'xi pazjenti, sinkope, speċjalment matul il-perjodu inizjali tat-titrazzjoni tad-doża. (Ara sezzjoni 4.4).
5. Il-kalkolu tal-Frekwenza għal dawn l-ADRs ittieded minn dejta wara t-tqegħid fis-suq biss.
6. Glukosju fid-demm waqt is-sawm ≥ 126 mg/dL (≥ 7.0 mmol/L) jew glukosju fid-demm mhux waqt is-sawm ≥ 200 mg/dL (≥ 11.1 mmol/L) f'mill-inqas okkażjoni waħda.
7. Żieda fir-rata ta' disfaġja bi quetiapine kontra placebo kienet osservata biss fil-provi kliniċi b'dipressjoni bipolari.

8. Abbazi ta' zieda ta' >7% fil-piż tal-gisem mil-linja bażi. Issehh b'mod predominanti matul il-gimghat tal-bidu tal-kura fl-adulti.
9. Is-sintomi ta' rtirar li ġejjin kienu osservati l-aktar frekwenti fi provi kliniċi akuti kkontrollati bi placebo b'monoterapija, li vvalutaw is-sintomi ta' twaqqif: insomnja, dardir, uġiġh ta' ras, dijarea, rimettar, sturdament, u irritabilità. L-inċidenza ta' dawn ir-reazzjonijiet kienet naqset b'mod sinifikanti wara l-ewwel gimgha li twaqqaf.
10. Trigliceridi ≥ 200 mg/dL (≥ 2.258 mmol/L) (pazjenti ≥ 18 -il sena) jew ≥ 150 mg/dL (≥ 1.694 mmol/L) (pazjenti <18-il sena) f'mill-anqas okkażjoni waħda
11. Kolesterol ≥ 240 mg/dL (≥ 6.2064 mmol/L) (pazjenti ≥ 18 -il sena) jew ≥ 200 mg/dL (≥ 5.172 mmol/L) (pazjenti <18-il sena) f'mill-anqas okkażjoni waħda. Zieda fil-kolesterol LDL ta' ≥ 30 mg/dL (≥ 0.769 mmol/L) kienet osservata b'mod komuni ħafna. Il-bidla medja fost il-pazjenti li kellhom din iż-żieda kienet ta' 41.7 mg/dL (≥ 1.07 mmol/L).
12. Ara t-test hawn taht
13. Plejtlits $\leq 100 \times 10^9/L$ f'mill-anqas okkażjoni waħda
14. Abbazi ta' rapporti ta' avvenimenti avversi fil-provi kliniċi ta' zieda fil-creatine phosphokinase fid-demmm mhux assoċjata ma' sindromu newrolettiku malinn
15. Livelli tal-prolactin (pazjenti >18-il sena): >20 $\mu\text{g/L}$ (>869.56 pmol/L) irġiel; >30 $\mu\text{g/L}$ (>1304.34 pmol/L) nisa fi kwalunkwe hin.
16. Jista' jwassal għal waqgħat.
17. Kolesterol HDL: <40 mg/dL (1.025 mmol/L) irġiel; <50 mg/dL (1.282 mmol/L) nisa fi kwalunkwe hin.
18. L-inċidenza ta' pazjenti li għandhom bidla fil-QTc minn <450 msec għal ≥ 450 msec b'żieda ta' ≥ 30 msec. Fi provi kkontrollati bi placebo bi quetiapine l-bidla medja u l-inċidenza ta' pazjenti li jkollhom bidla għal livell klinikament sinifikanti hija simili bejn quetiapine u placebo.
19. Bidla minn >132 mmol/L għal ≤ 132 mmol/L f'mill-anqas okkażjoni waħda.
20. Każijiet ta' hsbijiet dwar is-suwiċidju u mġieba suwiċidali ġew irrapportati waqt terapija bi quetiapine jew kmieni wara t-twaqqif tal-kura (ara Sezzjonijiet 4.4 u 5.1).
21. Ara Sezzjoni 5.1
22. Tnaqqis fl-emoglobina għal ≤ 13 g/dL (8.07 mmol/L) irġiel, ≤ 12 g/dL (7.45 mmol/L) nisa f'mill-anqas okkażjoni waħda sehh fi 11% tal-pazjenti fuq quetiapine fil-provi kollha inkluz estensjonijiet b'tikketta miftuħa. Għal dawn il-pazjenti, it-tnaqqis massimu medju fl-emoglobina fi kwalunkwe hin kien ta' -1.50 g/dL.
23. Ħafna drabi dawn ir-rapporti sehhew f'sitwazzjoni ta' takikardja, sturdament, pressjoni baxxa ortostatika, u/jew mard respiratorju/kardijaku sottostanti.
24. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fit- T_4 totali, T_4 hieles, T_3 totali u T_3 hieles huwa definit bħala <0.8 x LLN (pmol/L) u tibdil fit-TSH huwa ta' > 5 mIU/L fi kwalunkwe hin.
25. Abbazi taż-żieda fir-rata ta' rimettar f'pazjenti anzjani (≥ 65 sena).
26. Abbazi ta' tibdil fin-newtrofili minn $\geq 1.5 \times 10^9/L$ fil-linja bażi għal <0.5 x $10^9/L$ fi kwalunkwe hin matul il-kura u abbazi ta' pazjenti b'newtropenja severa (<0.5 x $10^9/L$) u b'infezzjoni matul il-provi kliniċi kollha bi quetiapine (Ara Sezzjoni 4.4).
27. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fl-esinofili huwa definit bħala $> 1 \times 10^9$ ċelloli/L fi kwalunkwe hin.
28. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fil-WBCs huwa definit bħala $\leq 3 \times 10^9$ ċelloli/L fi kwalunkwe hin.
29. Abbazi ta' rapporti ta' avvenimenti avversi ta' sindromu metaboliku mill-provi kliniċi kollha bi quetiapine.
30. F'xi pazjenti, aggravar ta' aktar minn fattur metaboliku wiehed ta' piż, glukosju fid-demmm u lipidi kien osservat fi studji tekniċi (Ara Sezzjoni 4.4).
31. Ara Sezzjoni 4.6.
32. Jista' jsehh mal-bidu jew viċin il-bidu tal-kura u jkun assoċjat ma' pressjoni baxxa u/jew sinkope. Il-frekwenza hija bbażata fuq rapporti ta' avvenimenti avversi ta' bradikardja u avvenimenti relatati fil-provi kliniċi kollha bi quetiapine.

Każijiet ta' titwil tal-QT, aritmija ventrikulari, mewt f'daqqa mingħajr spjegazzjoni, attakk tal-qalb u torsades de pointes kienu rrapportati bl-użu ta' newrolettiki u huma meqjusa effetti tal-klassi.

Popolazzjoni pedjatrika

L-istess ADRs li ġew deskritti hawn fuq għall-adulti għandhom jiġu kkunsidrati għat-tfal u l-adolesxenti. It-tabella li ġejja tiġbor fil-qosor l-ADR li jsehhu f'kategorija ta' frekwenza oġhla f'pazjenti tfal u adolesxenti (10-17-il sena) milli fil-popolazzjoni adulta jew ADRs li ma kienux identifikati fil-popolazzjoni adulta.

Tabella 2 ADRs fi tfal u adolexxenti assoċjati ma' terapija bi quetiapine li jseħhu bi frekwenza oghla milli fl-adulti, jew li ma ġewx identifikati fil-popolazzjoni adulta

Il-frekwenzi ta' avvenimenti avversi huma kklassifikati skont dawn li ġejjin: Komuni hafna (>1/10), komuni (>1/100, <1/10), mhux komuni (>1/1000, <1/100), rari (>1/10,000, <1/1000) u rari hafna (<1/10,000).

SOC	Komuni Hafna	Komuni
<i>Disturbi fis-sistema endokrinarja</i>	Židiet fil-prolactin ¹	
<i>Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni</i>	Žieda fl-aptit	
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>	Sintomi ekstrapiramidali ^{3,4}	Sinkope
<i>Disturbi vaskulari</i>	Židiet fil-pressjoni tad-demm ²	
<i>Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali</i>		Rinite
<i>Disturbi gastro-intestinali</i>	Rimettar	
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>		Irritabilità ³

1. Livelli tal-prolactin (pazjenti < 18-il sena): >20 ug/L (>869.56 pmol/L) irġiel; >26 ug/L (>1130.428 pmol/L) nisa fi kwalunkwe hin. Anqas minn 1% tal-pazjenti kellhom žieda fil-livell tal-prolactin >100 ug/L.
2. Abbażi ta' tibdil 'il fuq minn limiti klinikament sinifikanti (adattat mill-kriterji tal-Istituti Nazzjonali tas-Saħħa) jew židiet ta' >20 mmHg għal pressjoni sistolika tad-demm jew ta' >10 mmHg għal pressjoni diastolika tad-demm fi kwalunkwe hin f'żewġ provi akuti (3-6 ġimghat) ikkontrollati bi placebo fi tfal u adolexxenti.
3. Nota: Il-frekwenza hija konsistenti ma' dik osservata fl-adulti, iżda tista' tkun assoċjata ma' implikazzjonijiet kliniċi differenti fit-tfal u l-adolexxenti meta mqabbla mal-adulti.
4. Ara sezzjoni 5.1

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati:

Huwa importanti li jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professionisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

B'mod ġenerali, is-sinjali u s-sintomi rappurtati kienu daww b'riżultat ta' esagerazzjoni tal-effetti farmakoloġiċi magħrufa tas-sustanza attiva, jiġifieri nġhas u sedazzjoni, takikardja u ipotensjoni. Doża eċċessiva tista' twassal għal titwil tal-QT, aċċessjonijiet, status epilepticus, rabdomajoliżi, dipressjoni respiratorja, żamma tal-awrina, konfużjoni, delirju u/jew aġitazzjoni, koma u mewt. Pazjenti b'mard kardjovaskulari sever pre-eżistenti jistgħu jkunu f'riskju akbar tal-effetti ta' doża eċċessiva. (Ara sezzjoni 4.4, Pressjoni Baxxa Ortostatika).

Immaniġġjar ta' doża eċċessiva

M'hemmx antidotu speċifiku għal quetiapine. F'każijiet ta' sinjali severi, għandu jiġi kkunsidrat l-involvement ta' aktar minn mediċina waħda, u huma rakkomandati proċeduri ta' kura intensiva, inkluż li jiġi stabbilit u jinżamm passaġġ tan-nifs patenti, tiġi żgurata ossiġinazzjoni u ventilazzjoni adegwata, u monitoraġġ u appoġġ tas-sistema kardjovaskulari.

Abbażi tal-letteratura pubblika, pazjenti b' delirju u aġitazzjoni u sindromu antikolinerġiku ċar jistgħu jiġu ttrattati b' physostigmine, 1-2 mg (taħt monitoraġġ kontinwu b' ECG). Dan mhuwiex rakkomandat bħala kura standard, minhabba l-effett negattiv potenzjali ta' physostigmine fuq il-konduttanza tal-qalb. Physostigmine jista' jintuża jekk ma jkunx hemm aberrazzjonijiet fuq l-ECG. Tużax physostigmine fil-każ ta' disritmiji, kwalunkwe grad ta' imblokk tal-qalb jew twessieġ tal-QRS.

Filwaqt li l-prevenzjoni ta' assorbiment f'każ ta' doża eċċessiva ma kinitx investigata, lavaġġ gastriku jista' jkun indikat f'każijiet ta' avvelenament sever u jekk possibbli għandu jsir fi żmien siegħa minn meta jkun ittiehed. Għandu jiġi kkunsidrat l-ghoti ta' faham attiv.

F'każijiet ta' doża eċċessiva bi quetiapine, pressjoni baxxa refrattorja għandha tiġi ttrattata b' mizuri xierqa bħal fluwidi ġol-vina u/jew aġenti simpatomimetici. Epinephrine u dopamine għandhom jiġu evitati, peress li f' sitwazzjoni ta' imblokk alpha minhabba quetiapine stimolazzjoni beta tista' taggrava l-pressjoni baxxa.

Supervizjoni u monitoraġġ mediku mill-qrib għandhom jittkomplew sakemm il-pazjent jirkupra.

5. PROPRIETAJIET FARMAKOLOĠIČI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antipsikotiċi Kodiċi ATC: N05A H04

Mekkaniżmu ta' azzjoni:

Quetiapine huwa aġent antipsikotiku atipiku. Quetiapine u l-metabolit attiv fil-plasma umana, norquetiapine jinteraġixxu ma' firxa wiesgħa ta' riċetturi newrotrasmettitori. Quetiapine u norquetiapine juru affinità għal serotonin fil-moħħ (5HT₂) u għar-riċetturi-D₁ u -D₂ ta' dopamine. Din il-kombinazzjoni ta' antagoniżmu għar-riċetturi b' selettività oghla għal 5HT₂ relattiv għal riċetturi-D₂, hija maħsuba li tikkontribwixxi għall-karatteristiċi kliniċi antipsikotiċi u l-effett ekstrapiramidali sekondarju (EPS) baxx ta' Seroquel meta mqabbel ma' antipsikotiċi tipiċi. Quetiapine u norquetiapine m'għandhom l-ebda affinità apprezzabbli fir-riċetturi ta' benzodiazepine iżda affinità għolja fir-riċetturi istaminiġi u adrenerġiċi alpha₁, affinità moderata fir-riċetturi adrenerġiċi alpha₂ u affinità minn moderata għal għolja f' diversi riċetturi muskariniċi. L-inibizzjoni ta' NET u l-azzjoni agonista parzjali f' siti ta' 5HT_{1A} minn norquetiapine jistgħu jikkontribwixxu għall-effikaċja terapewtika ta' Seroquel XR bħala antidiressant.

Effetti farmakodinamiċi:

Quetiapine huwa attiv f' testijiet ta' attività antipsikotika, bħal evitazzjoni kondizzjonata. Jimblokka wkoll l-azzjoni ta' agonisti ta' dopamine, imkejla jew bl-imġieba jew b' mod elettrofizjoloġiku, u jżid il-konċentrazzjonijiet tal-metabolit ta' dopamine, indiċi newrokimiku tal-imblukkar tar-riċettur -D₂.

F' testijiet ta' qabel l-użu kliniku li jfassru l-EPS, quetiapine mhuwiex bħall-antipsikotiċi tipiċi u għandu profil atipiku. Wara li jingħata b' mod kroniku quetiapine ma jikkawżax supersensittività tar-riċettur-D₂ ta' dopamine. Quetiapine jikkawża biss katalessi dgħajfa f' dozi li huma effettivi biex jimblokkaw ir-riċetturi-D₂ ta' dopamine. Wara li jingħata b' mod kroniku quetiapine juri selettività għas-sistema limbika billi jikkawża imblukkar tad-dipolarizzazzjoni tan-newroni mesolimbici li fihom dopamine iżda mhux daww nigrostrijatali. Wara li jingħata b' mod akut jew kroniku quetiapine juri lijabilità distonika mimima f' xadini Cebus li jkunu ġew sensitizzati b' haloperidol jew li qatt ma kienu hađu l-medicina. (Ara Sezzjoni 4.8)

Effikaċja klinika:

Skizofrenija

Fi tliet provi kliniċi kkontrollati bi placebo, f'pazjenti bi skizofrenja, permezz ta' doži varjabbli ta' quetiapine, ma kienx hemm differenzi bejn il-grupp ta' kura b'Seroquel u l-gruppi ta' kura bi placebo fl-inċidenza tal-EPS jew l-użu konkormittanti ta' antikolinergici. Prova kkontrollata bi placebo li tevalwa d-doži fissi ta' quetiapine madwar il-firxa ta' 75 sa 750 mg/kuljum ma wriet ebda evidenza ta' zieda fl-EPS jew l-użu ta' antikolinergici konkormittanti. L-effikaċja fit-tul ta' Seroquel IR fil-prevenzjoni ta' rikaduti skizofreniċi ma gietx ivverifikata fi provi kliniċi blindati. Fi provi b'tikketta mikxufa, f'pazjenti bi skizofrenja, quetiapine kien effikaċi fiż-żamma tat-titjib kliniku waqt terapija kontinwa f'pazjenti li wrew reazzjoni għall-kura inizjali, u dan jissuġġerixxi xi effikaċja fit-tul.

Disturb bipolari

F'erba' provi kliniċi kkontrollati bi placebo, li evalwaw id-doži ta' Seroquel sa 800 mg/kuljum għall-kura ta' episodji manijaċi moderati sa serji, tnejn kull wieħed f'monoterapija u bħala terapija kkombinata għal lithium jew divalproex, ma kienx hemm differenzi bejn il-gruppi ta' kura ta' Seroquel u placebo fl-inċidenza ta' EPS jew l-użu konkormittanti ta' antikolinergici.

Fil-kura ta' episodji manijaċi moderati għal severi, Seroquel wera effikaċja superjuri għal placebo fit-tnaqqis tas-sintomi manijaċi fil-gimghat 3 u 12, f'żewġ provi b'monoterapija. M'hemm ebda dejta minn studji fit-tul li turi l-effikaċja ta' Seroquel fil-prevenzjoni ta' episodji manijaċi jew depressivi sussegwenti. Dejta dwar Seroquel f'kombinazzjoni ma' divalproex jew lithium f'episodji manijaċi akuti moderati għal severi f'gimghat 3 u 6 hija limitata; iżda, terapija kkombinata kienet tollerata sew. Id-dejta uriet effett addittiv f'gimgha 3. It-tieni studju ma weriex effett addittiv f'gimgha 6.

Id-doża medja medjana tal-aħħar gimgha ta' Seroquel fil-pazjenti li rrispondew kienet ta' madwar 600 mg /kuljum, u madwar 85% tal-pazjenti li rrispondew kienu fil-medda tad-doża ta' 400 mg sa 800 mg/kuljum

F'4 provi kliniċi li damu għaddejjin 8 gimghat f'pazjenti b'episodji depressivi minn moderati għal severi f'disturb bipolari I jew bipolari II, Seroquel IR 300 mg u 600 mg kien superjuri b'mod sinifikanti għal pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi placebo għall-miżuri rilevanti tal-eżitu: titjib medju fuq il-MADRS u għal rispons definit bħala titjib ta' mill-inqas 50% fil-punteġġ totali fuq MADRS mil-linja bażi. Ma kienx hemm differenza fid-daqs tal-effett bejn il-pazjenti li rċewew 300 mg ta' Seroquel IR u dawk li rċewew doża ta' 600 mg.

Fil-fażi ta' kontinwazzjoni fi tnejn minn dawn l-istudji, intwera li l-kura fit-tul, tal-pazjenti li rrispondew fuq Seroquel IR 300 mg jew 600 mg, kienet effikaċi meta mqabbla mal-kura bi placebo fir-rigward ta' sintomi depressivi, iżda mhux fir-rigward ta' sintomi manijaċi.

F'żewġ studji għall-prevenzjoni ta' rikorrenza li vvalutaw Seroquel f'kombinazzjoni ma' stabilizzaturi tal-burdata, f'pazjenti b'episodji manijaċi, depressivi jew burdati imhallta, il-kombinazzjoni ma' Seroquel kienet superjuri għal monoterapija bi stabilizzaturi tal-burdata biex itawlu ż-żmien għal rikorrenza ta' kwalunkwe każ relatat mal-burdata (manijaku, imhallat jew depressiv). Seroquel ingħata darbtejn kuljum b'total ta' 400 mg sa 800 mg kuljum bħala terapija kkombinata ma' lithium jew valproate.

Fi studju randomizzat fuq 6-gimghat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra placebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta, id-differenza fit-titjib medju fuq YMRS bejn il-grupp li kellu lithium miżjud u l-grupp li kellu placebo miżjud kienet ta' 2.8 punti u d-differenza fil-% ta' dawk li rrispondew (definita bħala titjib ta' 50% mil-linja bażi fuq il-YMRS) kienet ta' 11% (79% fil-grupp li kellu lithium miżjud kontra 68% fil-grupp li kellu placebo miżjud).

Fi studju wieħed fit-tul (kura sa sentejn) li vvaluta l-prevenzjoni ta' rikaduta f'pazjenti b'episodji manijaċi, depressivi jew burdati imhallta quetiapine kien superjuri fuq placebo biex itawwal iż-żmien għal rikaduta ta' kwalunkwe avveniment relatat mal-burdata (manijaku, imhallat jew depressiv), f'pazjenti b'disturb bipolari I. L-għadd ta' pazjenti li kellhom avveniment relatat mal-

burdata kien ta' 91 (22.5%) fil-grupp fuq quetiapine, ta' 208 (51.5%) fil-grupp fuq placebo u ta' 95 (26.1%) fil-grupp ta' kura b'lithium rispettivament. F'pazjenti li rrispondew ghal quetiapine, meta l-kura kontinwa bi quetiapine giet imqabbla mal-qalba ghal lithium, ir-rizultati indikaw li l-bidla ghal kura b'lithium ma tidhirx li hija assoċjata ma' zieda fiż-żmien ghal rikorrenza ta' avveniment relatat mal-burdata.

Il-provi kliniċi wrew li Seroquel huwa effikaċi fi skizofrenija u manija meta jinghata darbtejn kuljum, għalkemm quetiapine għandu half-life farmakokinetiku ta' madwar 7 sigħat. Dan huwa appoġġjat iktar mill-informazzjoni minn studju tat-tomografija tal-emissjoni ta' positron (PET), li identifika li għal quetiapine, l-okkupanza tar-riċetturi 5HT₂- u D₂ tinżamm sa 12-il siegħa. Is-sigurtà u l-effikaċja ta' dozi akbar minn 800 mg/kuljum ma ġewx evalwati.

Sigurtà klinika

Fi provi kliniċi fuq żmien qasir, ikkontrollati bi placebo fi skizofrenija u manija bipolari l-inċidenza aggregata tas-sintomi ekstrapiramidali kienet simili għall-placebo (skizofrenija: 7.8% għal quetiapine u 8.0% għal placebo; manija bipolari: 11.2% għal quetiapine u 11.4% għal placebo). Rati aktar għolja ta' sintomi ekstrapiramidali deheru f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine meta mqabbla ma' daww li ngħataw kura bi placebo fi provi kliniċi fuq żmien qasir u kkontrollati bi placebo f'MDD u dipressjoni bipolari. Fi provi fuq żmien qasir u kkontrollati bi placebo ta' dipressjoni bipolari l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 8.9% għal quetiapine meta mqabbla ma' 3.8% għal placebo. Fi provi kliniċi fuq żmien qasir b'monoterapija u kkontrollati bi placebo f'disturb depressiv maġġuri l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 5.4% għal Seroquel XR u ta' 3.2% għal placebo. Fi prova fuq żmien qasir b'monoterapija u kkontrollata bi placebo f'pazjenti anzjani b'disturb depressiv maġġuri, l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 9.0% għal Seroquel XR u ta' 2.3% għal placebo. Kemm f'depressjoni bipolari kif ukoll f'MDD, l-inċidenza tal-avvenimenti avversi individwali (eż akatizja, disturb ekstrapiramidali, roġħda, diskinesija, distonja, irrikwjetezza, kontrazzjonijiet involontari tal-muskoli, iperattività psikomotorili u riġidità muskolari) ma qabżitx l-4% f'ebda grupp ta' kura.

Fi studji fuq żmien qasir, b'doża fissa (50mg/d sa 800 mg/d), ikkontrollati bi placebo (bejn 3 sa 8 ġimgħat), iż-żieda medja fil-piż għal pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine kienet tvarja minn 0.8 kg għad-doża ta' kuljum ta' 50 mg sa 1.4 kg għad-doża ta' kuljum ta' 600 mg (b'żieda anqas għad-doża ta' kuljum ta' 800 mg), meta mqabbla ma' 0.2 kg għall-pazjenti li ngħataw kura bi placebo. Il-persentaġġ ta' pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine li ziedu ≥7% tal-piż tal-ġisem kien ivarja minn 5.3% għad-doża ta' kuljum ta' 50 mg sa 15.5% għad-doża ta' kuljum ta' 400 mg (b'żieda anqas għad-dozi ta' kuljum ta' 600 u 800 mg), meta mqabbla ma' 3.7% għall-pazjenti li ngħataw kura bi placebo.

Studju randomizzat ta' 6-ġimgħat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra placebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta indika li l-kombinazzjoni ta' SEROQUEL XR ma' lithium twassal għal aktar avvenimenti avversi (63% kontra 48% f'SEROQUEL XR f'kombinazzjoni ma' placebo). Ir-rizultati dwar is-sigurtà urew inċidenza oġħla ta' sintomi ekstrapiramidali rrapportati f'16.8% tal-pazjenti fil-grupp li kellhom lithium miżjud u 6.6% fil-grupp li kellhom placebo miżjud, li l-maġġoranza tagħhom kienu jikkonsistu minn roġħda, irrapportata f'15.6% tal-pazjenti li kellhom lithium miżjud u 4.9% fil-grupp li kellhom placebo miżjud. L-inċidenza ta' ngħas kienet oġħla fil-grupp ta' SEROQUEL XR li kellhom lithium miżjud (12.7%) meta mqabbla mal-grupp ta' SEROQUEL XR li kellhom placebo miżjud (5.5%). Barra minn hekk, kien hemm persentaġġ oġħla ta' pazjenti li kienu qed jirċievu kura fil-grupp li kellu lithium miżjud (8.0%) li kellhom zieda fil-piż (≥7) fl-aħħar tal-kura meta mqabbla ma' pazjenti fil-grupp li kellhom placebo miżjud (4.7%).

Provi itwal ta' prevenzjoni ta' rikaduta kellhom perjodu b'tikketta miftuħa (li jvarja minn 4 sa 36 ġimgħa) li matulu l-pazjenti ngħataw kura bi quetiapine, segwit minn perjodu randomizzat ta' irtirar li matulu l-pazjenti kienu randomizzati għal quetiapine jew għal placebo. Għall-pazjenti li kienu randomizzati għal quetiapine, iż-żieda medja fil-piż matul il-perjodu b'tikketta miftuħa kienet ta' 2.56 kg, u sal-ġimgħa 48 tal-perjodu randomizzat, iż-żieda medja fil-piż kienet ta' 3.22 kg, meta mqabbla mal-linja bażi b'tikketta miftuħa. Għall-pazjenti li kienu randomizzati għal placebo, iż-żieda

medja fil-piż matul il-perjodu b'tikketta miftuħa kienet ta' 2.39 kg, u sal-ġimgha 48 tal-perjodu randomizzat, iż-żieda medja fil-piż kienet ta' 0.89 kg, meta mqabbla mal-linja bażi b'tikketta miftuħa.

Fi studji kontrollati bi placebo f'pazjenti anzjani bi psikożi relatata mad-dimenzja, l-inċidenza ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi għal kull 100 sena pazjent ma kienetx oġġet fil-pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine milli f'pazjenti li ngħataw kura bi placebo .

Fil-provi kollha fuq żmien qasir b' monoterapija u kkontrollati bi placebo f'pazjenti b' għadd tan-newtrofili fil-linja bażi ta' $\geq 1.5 \times 10^9/L$, l-inċidenza ta' mill-inqas okkorrenza waħda ta' bidla fl-għadd tan-newtrofili ta' $< 1.5 \times 10^9/L$, kienet ta' 1.9% f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine meta mqabbla ma' 1.5% f'pazjenti li ngħataw kura bi placebo. L-inċidenza ta' tibdil għal $> 0.5 - < 1.0 \times 10^9/L$ kienet l-istess (0.2%) f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine bħal fil-pazjenti li ngħataw kura bi placebo. Fil-provi kliniċi kollha (ikkontrollati bi placebo, b'tikketta miftuħa, b'komparatur attiv) f'pazjenti b' għadd tan-newtrofili fil-linja bażi ta' $\geq 1.5 \times 10^9/L$, l-inċidenza ta' mill-inqas okkorrenza waħda ta' bidla fl-għadd tan-newtrofili għal $< 1.5 \times 10^9/L$ kienet ta' 2.9% u għal $< 0.5 \times 10^9/L$ kienet ta' 0.21% f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine .

Kura bi quetiapine kien assoċjata ma' tnaqqis fil-livelli ta' ormoni tat-tirojde relatati mad-doża. L-inċidenzi ta' tibdil fit-TSH kienet ta' 3.2 % għal quetiapine kontra 2.7 % għal placebo. L-inċidenza ta' tibdil reċiproku, potenzjalment klinikament sinifikanti kemm fit-T3 jew it-T4 u t-TSH f'dawn il-provi kienet rari, u l-bidliet osservati fil-livelli ta' ormoni tat-tirojde ma kienux assoċjati ma' ipotirojdiżmu klinikament sintomatiku. It-tnaqqis fit-T₄ totali u hieles kien l-oġġet fl-ewwel sitt ġimghat ta' kura bi quetiapine, bl-ebda tnaqqis ulterjuri matul kura fit-tul. Għal madwar 2/3 tal-każijiet kollha, il-waqfien tal-kura bi quetiapine kien assoċjat ma' treġġiġh lura tal-effetti fuq it-T4 totali u hieles, irrISPettivament mit-tul tal-kura.

Katarretti/opaċitajiet tal-lenti

Fi prova klinika biex jiġi vvalutat il-potenzjal katarrettoġeniku ta' Seroquel (200-800 mg/kuljum) kontra risperidone (2-8 mg) f'pazjenti bi skizofrenija jew disturb skizoaffettiv, il-persentaġġ ta' pazjenti b'żieda fil-grad tal-opaċità tal-lenti ma kienx oġġet f'Seroquel (4%) meta mqabbla ma' risperidone (10%), għal pazjenti li kellhom espożizzjoni ta' anqas minn 21 xahar.

Popolazzjoni pedjatrika

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Seroquel kienu studjati fi studju ta' 3-ġimghat ikkontrollat bi placebo għall-kura ta' manija (n= 284 pazjent mill-Istati Uniti, età minn 10-17). Madwar 45% tal-popolazzjoni tal-pazjenti kellhom dijanjosi addizzjonali ta' ADHD. Barra minn hekk, sar studju ta' 6 ġimghat ikkontrollat bi placebo għall-kura ta' skizofrenija (n=222 pazjent, età minn 13-17). Fiż-żewġ studji, il-pazjenti li kienu magħrufa li ma jirripondux għal Seroquel kienu esklużi. Il-kura b'Seroquel bdiet b'50 mg/kuljum u f'jum 2 żdiedet għal 100 mg/kuljum; sussegwentement id-doża giet titrata għad-doża fil-mira (manija 400-600 mg/kuljum; skizofrenija 400-800 mg/kuljum) permezz ta' inkrementi ta' 100 mg/kuljum li ngħataw darbtejn jew tliet darbiet kuljum.

Fl-istudju fuq manija, id-differenza fil-bidla medja fl-LS mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq YMRS (attiv li minnu tnaqqas il-placebo) kienet ta' -5.21 għal Seroquel 400 mg/kuljum u ta' -6.56 għal Seroquel 600 mg/kuljum. Ir-rati ta' dawk li rrispondew (titjib fuq YMRS $\geq 50\%$) kienu ta' 64% għal Seroquel 400 mg/kuljum, ta' 58% għal 600 mg/kuljum u ta' 37% fil-ferġha tal-placebo .

Fl-istudju fuq skizofrenija, id-differenza fil-bidla medja fl-LS mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq PANSS (attiv li minnu tnaqqas il-placebo) kienet ta' -8.16 għal Seroquel 400 mg/kuljum u ta' -9.29 għal Seroquel 800 mg/kuljum. La r-regimen bid-doża l-baxxa (400 mg/kuljum) u l-anqas dak bid-doża l-għolja (800 mg/kuljum) ta' quetiapine ma' kien superjuri għal placebo fir-rigward tal-persentaġġ ta' pazjenti li kisbu rispons, definit bħala tnaqqis ta' $\geq 30\%$ mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq PANSS.

Kemm f'manija kif ukoll f'skizofrenija doži oghla wasslu għal rati ta' rispons numerikament aktar baxxi.

F'tielet prova fuq żmien qasir ikkontrollata bi placebo b' monoterapija b'Seroquel XR f'pazjenti tfal u adolexxenti (10-17 sena) b'dipressjoni bipolari, l-effikaċja ma ntwerietx.

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli dwar iż-żamma tal-effett jew il-prevenzjoni ta' rikorrenza f'dan il-grupp ta' etajiet.

Sigurtà klinika

Fil-provi pedjatriċi fuq żmien qasir bi quetiapine deskritti hawn fuq, ir-rati ta' EPS fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 12.9% kontra 5.3% fil-prova ta' skizofrenija, 3.6% kontra 1.1% fil-prova ta' manija bipolari, u ta' 1.1% kontra 0% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Ir-rati taż-żieda fil-piż ta' $\geq 7\%$ tal-piż tal-gisem fil-linja bażi fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 17% kontra 2.5% fil-provi ta' skizofrenija u ta' manija bipolari, u ta' 12.5% kontra 6% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Ir-rati ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 1.4% kontra 1.3% fil-prova ta' skizofrenija, 1.0% kontra 0% fil-prova ta' manija bipolari, u ta' 1.1% kontra 0% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Matul fażi estiża ta' segwitu wara l-kura tal-prova ta' dipressjoni bipolari, kien hemm żewġ avvenimenti addizzjonali relatati mas-suwiċidju f'żewġ pazjenti; wiehed minn dawn il-pazjenti kien fuq quetiapine meta ġara l-avveniment.

Sigurtà fit-tul

Estensjoni b'tikketta miftuħa ta' 26-ġimgha għall-provi akuti (n=380 pazjent), b'Seroquel mgħoti b'mod flessibbli f'400-800 mg/kuljum, ipprovdiet dejta addizzjonali dwar is-sigurtà. Żidiet fil-piż tad-demmi kienu rrapportati fi tfal u adolexxenti u żieda fl-apetit, sintomi ekstrapiramidali u żidiet fil-prolaktin fis-serum kienu rrapportati bi frekwenza oghla fit-tfal u l-adolexxenti milli f'pazjenti adulti (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8). Fir-rigward taż-żieda fil-piż, meta aġġustat għal tkabbir normali fuq perijodu itwal, żieda ta' mill-inqas devjazzjoni standard ta' 0.5 mil-linja bażi fl-Indiċi tal-Massa tal-Gisem (BMI) intużat bħala miżura ta' bidla klinikament sinifikanti; 18.3% tal-pazjenti li kienu ilhom mill-inqas 26 ġimgha fuq kura bi quetiapine issodisfaw dan il-kriterju.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Quetiapine jiġi assorbit sew u metabolizzat b'mod estensiv wara li jingħata mill-halq. Il-bijodisponibilità ta' quetiapine mhijiex affettwata b'mod sinifikanti bl-għoti mal-ikel. Il-konċentrazzjonijiet ta' molar massimi fi stat fiss tal-metabolit attiv norquetiapine huma ta' 35% ta' dak osservat għal quetiapine.

Il-farmakokinetika ta' quetiapine u norquetiapine huma lineari fil-medda ta' dożaġġ approvat.

Distribuzzjoni

Quetiapine jintrabat madwar 83% mal-proteini tal-plasma.

Bijotrasformazzjoni

Quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied, bil-kompost originali jammonta għal anqas minn 5% tal-materjal mhux mibdul relatat mal-medicina fl-awrina jew fl-ippurgar, wara l-għoti ta' quetiapine radjutikkettat.

Investigazzjonijiet *in vitro* stabbilixxew li CYP3A4 huwa l-enzim ewlieni reponsabbli għall-metabolizmu ta' quetiapine medjat miċ-ċitokromju P450. Norquetiapine jiġi primarjament iffurmat u eliminat permezz ta' CYP3A4.

Madwar 73% tar-radjuattività tiġi eliminata fl-awrina u 21% fl-ippurgar.

Quetiapine u hafna mill-metaboliti tiegħu (inkluż norquetiapine) instabu li huma inibituri dgħajfa tal-attivitàjiet taċ-ċitokromju uman P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 u 3A4 in vitro. Inibizzjoni in vitro ta' CYP hija osservata biss f'konċentrazzjonijiet ta' madwar 5 għal 50 darba oghla minn dawk osservati fil-medda ta' doża ta' 300 sa 800 mg/kuljum fil-bnedmin. Abbażi ta' dawn ir-riżultati in vitro, mhuwiex probabbli li l-ghoti ta' quetiapine flimkien ma' mediċini oħra se jwassal għal inibizzjoni klinikament sinifikanti tal-mediċina tal-metaboliżmu tal-mediċina l-oħra medjat miċ-ċitokromju P450. Minn studji fuq l-annimali jidher li quetiapine jista' jinduċi enzimi taċ-ċitokromju P450. Fi studju speċifiku dwar l-interazzjoni f'pazjenti psikotiċi, madankollu, ma nstabet l-ebda zieda fl-attività taċ-ċitokromju P450 wara l-ghoti ta' quetiapine.

Eliminazzjoni

Il-half lives tal-eliminazzjoni ta' quetiapine u norquetiapine huma ta' madwar 7 u 12-il siegħa, rispettivament. Il-frazzjoni medja tad-doża molar ta' quetiapine hieles u l-metabolit attiv fil-plasma umana norquetiapine jiġi eliminat <5% fl-awrina.

Popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-kinetika ta' quetiapine ma tvarjax bejn l-irġiel u n-nisa.

Anzjani

It-tnehhija medja ta' quetiapine fl-anzjani hija ta' madwar 30 sa 50% aktar baxxa minn dik li dehret f'adulti bejn it-18 u l-65 sena.

Indeboliment tal-Kliwi

It-tnehhija medja ta' quetiapine mill-plasma tnaqqset b'madwar 25% f'individwi b'indeboliment sever tal-kliwi (tnehhija tal-kreatinina ta' anqas minn 30 ml/min/1.73 m²), iżda l-valuri individwali ta' tnehhija huma fil-medda ta' individwi normali.

Indeboliment tal-Fwied

It-tnehhija medja ta' quetiapine mill-plasma tonqos b'madwar 25% f'persuni b'indeboliment epatiku magħruf (b'cirrozi alkoħolika stabbli). Peress li quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied, huwa mistenni li fil-popolazzjoni b'indeboliment tal-fwied il-livelli fil-plasma ikunu oghla. F'dawn il-pazjenti jista' jkun hemm il-htieġa ta' aġġustamenti tad-doża (ara sezzjoni 4.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta farmakokinetika ittiedet bħala kampjun f'9 itfal bejn l-10-12-il sena u 12-il adolexxenti, li kienu fuq kura fi stat fiss b'400 mg ta' quetiapine darbtejn kuljum. Fi stat fiss, il-livelli tad-doża normalizzata fil-plasma tal-kompost oriġinali, quetiapine, fi tfal u adolexxenti (10-17-il sena) kienu ġeneralment simili għal dawk fl-adulti, għalkemm fit-tfal is-C_{max} kien fil-parti għolja tal-medda li kienet osservata fl-adulti. L-AUC u s-C_{max} tal-metabolit attiv, norquetiapine, kienu oghla, ta' madwar 62% u 49% fit-tfal (10-12-il sena), rispettivament u ta' 28% u 14% fl-adolexxenti (13-17-il sena), rispettivament meta mqabbla mal-adulti.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

F'serje ta' studji *in vitro* u *in vivo* dwar il-ġenotossicità ma kien hemm l-ebda evidenza ta' ġenotossicità. F'annimali tal-laboratorju f'livell ta' espożizzjoni klinikament rilevanti dehru d-devjazzjonijiet li ġejjin, li għadhom ma ġewx ikkonfermati minn riċerka klinika fit-tul: Fil-firien, kienet osservata depożizzjoni tal-pigment fil-glandola tat-tirojda; f'xadini cynomolgus ipertrofija taċ-ċelluli follikulari tat-tirojda, tnaqqis fil-livelli tat-T₃ fil-plasma, tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-emoglobina u tnaqqis fl-ghadd taċ-ċelluli homor u bojod tad-demmi; u fil-klieb opaċità tal-lenti u katarretti. (Għal katarretti/opaċitajiet tal-lenti ara sezzjoni 5.1).

Fi studju ta' tossicità embrijofetali fil-fniek kien hemm zieda fl-inċidenza ta' tagħwig karpali/tat-tarsu fil-fetu. Dan l-effett sehh fil-preżenza ta' effetti materni evidenti bħal zieda anqas fil-piż tal-ġisem.

Dawn l-effetti kienu evidenti f'livelli ta' espożizzjoni materna simili jew kemmxejn oghla minn dawk fil-bnedmin bid-doża massima terapewtika. Ir-rilevanza ta' din is-sejba għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-fertilità fil-firien, deher tnaqqis marginali fil-fertilità maskili u psewdo tqala, perjodi mtawla ta' diestrus, zieda fl-intervall ta' qabel il-kopulazzjoni u tnaqqis fir-rata ta' tqaliet. Dawn l-effetti huma relatati ma' livelli elevati ta' prolactin u mhumiex direttament rilevanti għall-bniedem minhabba differenzi fil-kontroll ormonali tar-riproduzzjoni bejn l-ispeċi.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba

Povidone

Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate

Microcrystalline Cellulose

Sodium Starch Glycolate Type A

Lactose Monohydrate

Magnesium Stearate

Kisja

Hypromellose 2910

Macrogol 400

Titanium Dioxide (E171)

Ferric Oxide, Yellow (E172) pilloli ta' 25 mg, 100 mg u 150 mg)

Ferric Oxide, Red (E172) (pilloli ta' 25 mg)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC/aluminju

Daqsijiet tal-pakkett

Folji:

<i>Qawwa tal-Pillola</i>	<i>Kontenut tal-kartuna (pakkett)</i>	<i>Folji</i>
<i>pilloli ta' 25 mg</i>	<i>6 pilloli</i>	<i>folja ta' 6 pilloli</i>

Qawwa tal-Pillola	Kontenut tal-kartuna (pakkett)	Folji
pilloli ta' 100 mg, 150 mg, 200 mg u 300 mg	20 pillola	2 folji ta' 10 pilloli
	30 pillola	3 folji ta' 10 pilloli
	50 pillola	10 folji ta' 5 pilloli
	50 pillola	5 folji ta' 10 pilloli
	60 pillola	6 folji ta' 10 pilloli
		12-il folja ta' 5 pilloli
	100 pillola	10 folji ta' 10 pilloli
	10 pilloli	folja ta' 10 pilloli
	20 pillola	2 folji ta' 10 pilloli
	30 pillola	3 folji ta' 10 pilloli
	50 pillola	10 folji ta' 5 pilloli
	50 pillola	5 folji ta' 10 pilloli
	60 pillola	6 folji ta' 10 pilloli
	90 pillola	9 folji ta' 10 pilloli
	100 pillola	10 folji ta' 10 pilloli
	120 pillola	12-il folja ta' 10 pilloli (150 mg u 300 mg pillola biss)
	180 pillola	18-il folja ta' 10 pilloli (150 mg u 300 mg pillola biss)
	240 pillola	24 folja ta' 10 pilloli (150 mg u 300 mg pillola biss)
Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem (Pakkett Ikkombinat)	8 pilloli	folja li fiha 6 x 25 mg u 2 x 100 mg pilloli
Pakkett tal-Bidu ta' 4 ijiem	10 pilloli	folja li fiha 6 x 25mg, 3 x 100mg u 1 x 200mg pilloli

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

L-ebda htigijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

27 ta' April 1998

12 ta' Ottubru 2009

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 25 mg pilloli miksijin b'rita
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 25 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

6 pilloli miksijin b'rita
20 pillola miksijin b'rita
30 pillola miksijin b'rita
50 pillola miksijin b'rita
60 pillola miksijin b'rita
100 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

11. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel 25 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Seroquel 25 mg pilloli miksijin b'rita

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

Jis

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 100 mg (jew 150 mg, jew 200 mg jew 300 mg) pilloli miksijin b'rita
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 100 mg (jew 150 mg, jew 200 mg jew 300 mg) ta' quetiapine (bhala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksijin b'rita
20 pillola miksijin b'rita
30 pillola miksijin b'rita
50 pillola miksijin b'rita
60 pillola miksijin b'rita
90 pillola miksijin b'rita
100 pillola miksijin b'rita
120 pillola miksijin b'rita (pilloli ta' 150 mg u 300 mg biss)
180 pillola miksijin b'rita (pilloli ta' 150 mg u 300 mg biss)
240 pillola miksijin b'rita (pilloli ta' 150 mg u 300 mg biss)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f' temperatura 'l fuq minn 30°C.

11. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jinghata b'riċetta ta' tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel 100 mg (jew 150 mg, jew 200 mg jew 300 mg)

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 100 mg (jew 150 mg, jew 200 mg jew 300 mg) pilloli miksijin b'rita
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

Jis

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA**

Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 25 mg u 100 mg pilloli miksijin b'rita
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 25 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)
Kull pillola fiha 100 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

8 pilloli miksijin b'rita

Pakkett ikkombinat

Dan il-pakkett fih:

6 x 25 mg pilloli miksijin b'rita

2 x 100 mg pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jinghata b'riċetta ta' tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel 25 u 100 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA Pakkett ta' bidu ta' 3 ijiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel 25 mg u 100 mg pilloli
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

Jis

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OHRAJN

Jum 1
Jum 2
Jum 3
filghodu
filghaxija
25 mg
2x25 mg
100 mg

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KARTUNA Pakkett ta' bidu ta' 4 ijiem****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Seroquel 25 mg, 100 mg u 200 mg miksijin b'rita
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 25 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)
Kull pillola fiha 100 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)
Kull pillola fiha 200 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli miksijin b'rita

Pakkett ikkombinat

Dan il-pakkett fih:

6 x 25 mg pilloli miksijin b'rita

3 x 100 mg pilloli miksijin b'rita

1 x 200 mg pillola miksija b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f' temperatura 'l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jinghata b'riċetta ta' tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel 25 mg, 100 mg u 200 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA Pakkett ta' bidu ta' 4 ijiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Seroquel 25 mg, 100 mg u 200 mg pilloli
quetiapine

2. ISEM TAD- DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

Jis

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

Jum 1

Jum 2

Jum 3

Jum 4

filghodu

filghaxija

25 mg

2x25 mg

100 mg

200 mg

FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg pilloli
Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem (Pakkett ikkombinat)
Seroquel Pakkett tal-Bidu ta' 4 ijiem

quetiapine

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni ohra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara Sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Seroquel u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Seroquel
3. Kif għandek tiehu Seroquel
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Seroquel
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

1. X'inhum Seroquel u għalxiex jintuza

Seroquel fih sustanza msejha quetiapine. Din tagħmel parti minn grupp ta' medicini msejha anti-psikotiċi. Seroquel jista' jintuza għall-kura ta' diversi mard, bħal:

- Dipressjoni bipolari: fejn thossok imdejjaq. Tista' ssib li thossok depress, thossok ħati, b'nuqqas ta' enerġija, titlef l-apetit jew ma tkunx tista' torqod.
- Manija: fejn tista' thossok eċitat hafna, elat, agitat, entużjast jew iperattiv jew ikollok ġudizzju fqir inkluż li tkun aggressiv jew tkun ta' tfixkil.
- Skizofrenija: fejn tista' tisma u thoss affarijiet li m'humix hemm, temmen affarijiet li mhumix veri jew thossok suspettuż b'mod mhux tas-soltu, anzjuż, konfuż, ħati, mimli tensjoni jew depress.

It-tabib tiegħek jista' jkompli jippreskrivilek Seroquel anke meta thossok aħjar.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Seroquel

Tiehux Seroquel :

- Jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal quetiapine jew għal xi sustanza ohra ta' Seroquel (ara sezzjoni 6: Informazzjoni ohra)
- Jekk qed tiehu xi waħda minn dawn il-medicini li ġejjin:
 - xi medicini għall-HIV
 - medicini azole (għall-infezzjonijiet fungali)
 - erythromycin jew clarithromycin (għall-infezzjonijiet)
 - nefazodone (għad-dipressjoni)

Tiehux Seroquel jekk dawn ta' hawn fuq japplikaw għalik. Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tiehu Seroquel.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Seroquel jekk:

- Inti, jew xi hadd fil-familja tieghek, għandkom jew kellkom problemi tal-qalb, per eżempju problemi fir-ritmu tal-qalb, dghjufija tal-muskolu tal-qalb jew infjammazzjoni tal-qalb jew jekk qed tiehu xi medicini li jista' jkollhom impatt fuq kif thabbat qalbek.
- Għandek pressjoni baxxa tad-demmm.
- Kellek puplesija, speċjalment jekk inti anzjan.
- Għandek problemi bil-fwied tieghek.
- Qatt kellek aċċessjoni.
- Għandek id-dijabete jew għandek riskju li taqbdet id-dijabete. Jekk hu hekk, it-tabib tieghek jista' jiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demmm tieghek waqt li tkun qed tiehu Seroquel.
- Taf li fil-passat kellek livelli baxxi ta' ċelloli tad-demmm bojod (li jista' jkun li kienu jew ma kienux ikkawżati minn medicini oħra).
- Inti persuna anzjana bid-dimenzja (telf tal-funzjoni tal-mohh). Jekk iva, Seroquel m'għandux jittiehed minhabba li l-grupp ta' medicini li għalih jappartjeni Seroquel jista' jżid ir-riskju ta' puplesija, jew f'xi każijiet ir-riskju ta' mewt, f'persuni anzjani bid-dimenzja.
- Inti jew xi hadd iehor fil-familja tieghek għandkom storja ta' emboli tad-demmm, peress li medicini bħal dawn kienu assoċjati mal-formazzjoni ta' emboli tad-demmm.

Għid lit-tabib tieghek minnufih jekk tesperjenza xi waħda minn dawn li ġejjin wara li tiehu Seroquel:

- Kombinazzjoni ta' deni, riġidità muskolari severa, johroġlok l-għaraq jew ikollok livell imnaqqas ta' koxjenza (disturb imsejjah "sindromu newrolettiku malinn)." Jista' jkollok bżonn kura medika immedjata.
- Movimenti inkontrollabbli, l-aktar ta' wiċċek jew ta' ilsienek.
- Sturdament jew sens qawwi ta' ngħas. Dan jista' jżid ir-riskju ta' korrimment aċċidentali (waqgħat) f'pazjenti anzjani.
- Aċċessjonijiet.
- Erezzjoni fit-tul u bl-uġiġh (Prijażmu).

Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jiġu kkawżati minn din it-tip ta' medicina.

Għid lit-tabib tieghek mill-aktar fis possibbli jekk ikollok:

- Deni, sintomi bħal tal-influenza, uġiġh fil-grizmejn, jew kwalunkwe infezzjoni oħra, peress li dan jista' jkun riżultat ta' għadd baxx hafna taċ-ċelluli tad-demmm bojod, li jista' jehtieg li Seroquel jitwaqqaf u/jew li tingħata l-kura.
- Stitikezza flimkien ma' uġiġh addominali persistenti, jew stitikezza li ma tkunx irrispondiet għall-kura, peress li dan jista' jwassal għal imblukkar aktar serju tal-musrana.

Hsibijiet suwiċidali u aggravar tad-dipressjoni tieghek

Jekk inti depress xi kultant jista' jkollok hsibijiet li twegġa jew toqtol lilek innifsek. Dawn jistgħu jiżdiedu meta tibda l-kura għall-ewwel darba, peress li dawn il-medicini kollha jiehdu z-żmien biex jahdmu, ġeneralment madwar ġimagħtejn iżda xi kultant aktar. Dawn il-hsibijiet jistgħu anke jiżdiedu jekk tieqaf tiehu l-medicina tieghek f'daqqa. Tista' tkun aktar probabbli li tahseb hekk jekk inti żagħżuġh. Informazzjoni minn provi kliniċi uriet riskju akbar ta' hsibijiet suwiċidali u/jew imġieba suwiċidali fiż-żagħżagħ ta' anqas minn 25 sena b'dipressjoni.

Jekk għandek hsibijiet li twegġa jew toqtol lilek innifsek fi kwalunkwe hin, ikkuntattja lit-tabib tieghek jew mur l-isptar minnufih. Tista' issibha utli li tghid lil xi qarib jew xi habib li inti depress, u itlobhom jaqraw dan il-fuljett. Tista' titlobhom jgħidulek jekk jaħsbu li d-dipressjoni tieghek qed taggrava, jew jekk huma inkwetati dwar tibdil fl-imġieba tieghek.

Żieda fil-piż

Żieda fil-piż giet osservata f'pazjenti li jkunu qed jieħdu Seroquel. Inti u t-tabib tiegħek għandkom tiċċekkjaw il-piż tiegħek regolarment.

Tfal u Adolexxenti

Seroquel mhuwiex għall-użu fi tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena.

Mediċini oħra u Seroquel

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu jew dan l-aħħar haġt xi mediċina oħra

Tieħux Seroquel jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

- Xi mediċini għall-HIV.
- Mediċini azole (għall-infezzjonijiet fungali).
- Erythromycin jew clarithromycin (għall-infezzjonijiet).
- Nefazodone (għad-dipressjoni).

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

- Mediċini għall-epilessija (bħal phenytoin jew carbamazepine).
- Mediċini għall-pressjoni għolja tad-demm.
- Barbiturati (għal problemi tal-irqad).
- Thioridazine jew Lithium (mediċini anti-psikotiċi oħra).
- Mediċini li għandhom impatt fuq il-mod kif tħabbat qalbek, per eżempju, mediċini li jistgħu jikkawżaw żbilanċ fl-elettroliti (livelli baxxi ta' potassju jew ta' manjesju) bħal diuretici (pilloli tal-ilma) jew ċerti antibijotiċi (mediċini għall-kura tal-infezzjonijiet).
- Mediċini li jistgħu jikkawżaw stitikezza.

Qabel ma tieqaf tieħu xi waħda mill-mediċini tiegħek, jekk jogħġbok l-ewwel kellem lit-tabib tiegħek.

Seroquel ma' ikel, xorb u alkohol

- Seroquel jista' jittiehed mal-ikel jew mingħajr ikel.
- Oqgħod attent kemm tixrob alkohol. Dan għaliex l-effett ikkombinat ta' Seroquel u l-alkohol jista' jġieghlek thossok bi nġhas.
- Tixrobx meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tieħu Seroquel. Dan jista' jaffettwa l-mod kif taħdem il-mediċina.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu Seroquel. M'għandekx tieħu Seroquel waqt it-tqala sakemm dan ġie ma jkunx ġie diskuss mat-tabib tiegħek. Seroquelm'għandux jittiehed jekk qed tredda'.

Is-sintomi li ġejjin li jistgħu jirrappreżentaw sintomi ta' irtirar jistgħu jseħħu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li użaw Seroquel fl-aħħar trimestru (l-aħħar tliet xhur tat-tqala tagħhom): roġħda, riġidità u/jew dgħjufija muskolari, nġhas, aġitazzjoni, problemi fit-tehid tan-nifs, u diffikultà fit-tmim. Jekk it-tarbija tiegħek tiżviluppa xi sintomi minn dawn jista' jkollok bżonn tikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-pilloli tiegħek jistgħu iqabbdok in-nġhas. M'għandekx issuq jew tuża għodda jew magni sakemm tkun taf kif il-pilloli jaffettwawk.

Seroquel fih lactose

Seroquel fih lactose li huwa tip ta' zokkor. Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi zokkrijiet, kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Effett fuq Skrinjar ghad-Drogi fl-Awrina

Jekk se jsirlekk skrinjar ghad-drogi fl-awrina, it-tehid ta' Seroquel jista' jikkawża riżultati pożittivi għal methadone jew ċerti mediċini għad-dipressjoni msejha antidipressanti triċikliċi (TCAs) meta jintużaw ċerti metodi ta' ittestjar, anke jekk tista' ma tkunx qed tiehu methadone jew TCAs. Jekk dan isehh, jista' jsir test aktar speċifiku.

3. Kif għandek tiehu Seroquel

Dejjem għandek tiehu Seroquel skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruġek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi fuq id-doża tal-bidu tiegħek. Id-doża ta' manteniment (doża ta' kuljum) se tiddependi fuq il-marda u l-htigijiet tiegħek, iżda generalment tkun bejn 150 mg u 800 mg.

- Għandek tiehu l-pilloli tiegħek darba kuljum, qabel ma torqod jew darbtejn kuljum, skont il-marda tiegħek
- Ibla' l-pilloli tiegħek shah ma' tazza ilma.
- Tista' tiehu l-pilloli tiegħek mal-ikel jew minghajr ikel.
- Tixrob il-meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tiehu Seroquel. Dan jista' jaffettwa l-mod kif taħdem il-mediċina.
- Tieqafx tiehu l-pilloli tiegħek anki jekk thossok aħjar, sakemm ma jghidlekx it-tabib tiegħek.

Problemi fil-fwied

Jekk għandek problemi fil-fwied it-tabib tiegħek jista' jbidillek id-doża tiegħek.

Persuni anzjani

Jekk inti anzjan it-tabib tiegħek jista' jbidillek id-doża tiegħek.

Użu fit-tfal u l-adolessenti

Seroquel m'għandux jintuża minn tfal u adolessenti taħt it-18-il sena.

Jekk tiehu Seroquel aktar milli suppost

Jekk tiehu aktar Seroquel milli ppreskrivilek it-tabib tiegħek, tista' thossok bi nghanas, thossok stordut u tesperjenza taħbit abnormali tal-qalb. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jew l-eqreb sptar minnufih. Żomm il-pilloli Seroquel miegħek.

Jekk tinsa tiehu doża ta' Seroquel

Jekk tinsa tiehu doża, huwa malli tiftakar. Jekk ikun kważi sar il-hin biex tiehu d-doża li jmiss, stenna sa dak il-hin. M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal pillola li tkun insejt tiehu.

Jekk tieqaf tiehu Seroquel

Jekk tieqaf tiehu Seroquel f'daqqa, jista' jkun li ma tkunx tista' torqod (insomnja), jew tista' thossok ma tiflahx (dardir), jew tista' tesperjenza uġiġh ta' ras, dijarea, tkun ma tiflahx (rimettar), sturdament jew irritabilità. It-tabib tiegħek jista' jissuggerilek li tnaqqas id-doża bil-mod qabel ma twaqqaf il-kura.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull mediċina oħra, Seroquel XR jista' jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Effetti sekondarji komuni hafna (jistghu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Sturdament (jista' jwassal għal waqgħat), uġigh ta' ras, ħalq xott.
- Thossok bi nġhas (dan jista' jmur maż-żmien, hekk kif tkompli tiehu Seroquel) (jista' jwassal għal waqgħat).
- Sintomi ta' twaqqif (sintomi li jseħhu meta tieqaf tiehu Seroquel) jinkludu li ma tkunx tista' torqod (insomnja), thossok ma tiflaħx (dardir), uġigh ta' ras, dijarea, tkun ma tiflaħx (rimettar), sturdament, u irritabilità. Huwa rakkomandat li twaqqaf il-kura bil-mod fuq perjodu ta' mill-inqas ġimgħa sa ġimagħtejn.
- Iżżid fil-piż.
- Movimenti muskolari mhux normali. Dawn jinkludu diffikultà biex tibda movimenti muskolari, roġħda, irrikwjetezza jew riġidità muskolari mingħajr uġigh.
- Tibdiliet fl-ammont ta' ċerti xahmijiet (trigliceridi u kolesterol totali)

Effetti sekondarji komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Tahbita mgħaġġla tal-qalb.
- Thoss sensazzjoni li qalbek qed thabbat b'mod qawwi, thabbat mgħaġġel hafna jew tibdil fir-ritmu tal-qalb.
- Stitikezza, stonku mqalleb (indigestjoni).
- Thossok dgħajjef.
- Nefha fid-dirgħajn jew fir-riglejn.
- Pressjoni baxxa tad-demmi meta tqum bilwieqfa. Dan jista' jġieghlek thossok stordut jew iħossok ħazin (jista' jwassal għal waqgħat).
- Żieda fil-livelli taz-zokkor fid-demmi.
- Vista mċajpra.
- Holm abnormali u inkubi
- Thossok aktar bil-ġuħ
- Thossok irritat
- Disturbi fil-kliem u fil-lingwaġġ.
- Hsibijiet ta' suwiċidju u aggravar tad-dipressjoni tiegħek.
- Qtuġħ ta' nifs.
- Rimettar (l-aktar fl-anzjani).
- Deni
- Tibdil fl-ammont ta' ormini fit-tirojde fid-demmi tiegħek
- Tnaqqis fin-numru ta' ċerti tipi ta' ċelloli tad-demmi
- Żidiet fl-ammont ta' enzimi tal-fwied imkejla fid-demmi
- Żidiet fl-ammont tal-ormon prolactin fid-demmi. Żidiet fl-ormon prolactin jistghu f'każijiet rari jwasslu għal dawn li ġejjin:
 - Irġiel u nisa jkollhom nefha f'sidirhom u jipproduċu l-ħalib mis-sider b'mod mhux mistenni.
 - Nisa ma jkollhomx pirjids fix-xaħar jew pirjids irregolari.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100):

- Aċċessjonijiet
- Reazzjonijiet allergiċi li jistghu jinkludu dbabar mgħollijn, nefha fil-ġilda u nefha madwar il-ħalq.
- Sensazzjonijiet spjaċevoli fir-riglejn (imsejha wkoll sindromu tar-riglejn irrikwieti).
- Diffikultà biex tibra'.
- Movimenti inkontrollabbli, l-aktar ta' wiċċek jew ta' ilsienek.
- Disfunzjoni sesswali.
- Dijabete
- Bidla fl-attività elettriċa tal-qalb li tidher fuq ECG (titwil tal-QT)

- Rata tal-qalb li tkun aktar baxxa min-normal li tista' ssehh fil-bidu tal-kura u li tista' tkun assoċjata ma' pressjoni baxxa tad-demmm u hass hażin.
- Diffikultà biex tgħaddi l-awrina.
- Hass hażin (jista' jwassal għal waqgħat)
- Imnieher misdud
- Tnaqqis fl-ammont ta' ċelloli tad-demmm homor
- Tnaqqis fl-ammont ta' sodium fid-demmm

Effetti sekondarji rari (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000):

- Kombinazzjoni ta' temperatura għolja (deni), johroglok l-għaraq, rigidity muskolari, thossok stordut hafna jew ihossok hażin (disturb imsejjah "sindromu newrolettiku malinn").
- Sfurija tal-gilda u tal-għajnejn (suffejra).
- Infjammazzjoni tal-fwied (epatite).
- Erezzjoni fit-tul u bl-uġiġħ (prijażmu).
- Nefha fis-sider u l-produzzjoni mhux mistennija ta' ħalib tas-sider (galaktorreja).
- Disturb mestrwali.
- Emboli tad-demmm fil-vini speċjalment fir-riglejn (sintomi jinkludu nefha, uġiġħ u ħmura fis-sieq), li jistghu jivvjaġġaw mill-vażi tad-demmm lill-pulmun u jikkawżaw uġiġħ fis-sider u diffikultà fit-tehid tan-nifs. Jekk tinnota xi sintomi minn dawn fittex parir mediku minnufih.
- Timxi, titkellem, tiekol jew tagħmel attivitajiet ohra waqt li tkun rieked.
- Tnaqqis fit-temperatura tal-ġisem (ipotermja).
- Infjammazzjoni tal-frixa
- Kundizzjoni (imsejha "sindromu metaboliku") fejn jista' jkollok kombinazzjoni ta' 3 jew aktar minn dawn li ġejjin: żieda fix-xaham madwar żaqkek, tnaqqis fil-"kolesterol tajjeb" (HDL-C), żieda f'tip ta' xaham fid-demmm tiegħek imsejjah trigliceridi, pressjoni għolja tad-demmm u żieda fiz-zokkor fid-demmm tiegħek.
- Kombinazzjoni ta' deni, sintomi bħal tal-influenza, uġiġħ fil-grizmejn, jew kwalunkwe infezzjoni ohra b'għadd baxx hafna ta' ċelluli bojod, kundizzjoni msejha agranuloċitosi.
- Ostruzzjoni tal-imsaren.
- Żieda fil-creatine phosphokinase fid-demmm (sustanza mill-muskoli)

Effetti sekondarji rari hafna (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10,000):

- Raxx sever, infafet, jew irqajja homor fuq il-gilda.
- Reazzjoni allergika severa (imsejha anafilassi) li tista' tikkawża diffikultà fit-tehid tan-nifs jew xokk.
- Nefha mgħaġġla tal-gilda, normalment madwar l-għajnejn, ix-xofftejn u l-gerżuma (anġiodema).
- Kundizzjoni serja ta' infafet fil-gilda, il-ħalq, l-għajnejn u l-ġenitali (sindromu ta' Stevens-Johnson)
- Sekrezzjoni inadegwata ta' ormon li jikkontrolla l-volum tal-awrina.
- Tkissir tal-fibri tal-muskoli u uġiġħ fil-muskoli (rabdomajolizi).
- Aggravar ta' dijabete pre-eżistenti.

Mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli)

- Raxx tal-gilda b'ponot homor u irregolari (eritema multiforme)
- Reazzjoni allergika serja u f'daqqa b'sintomi bħal deni u nfafet fuq il-gilda u tqaxxir tal-gilda (nekrolizi epidermali tossika)
- Sintomi ta' rtirar jistghu jseħhu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li użaw Seroquel waqt it-tqala tagħhom

Il-klassi ta' mediċini li għaliha jappartjeni Seroquel tista' tikkawża problemi fir-ritmu tal-qalb, li jistgħu jkunu serji u f'każijiet severi jistgħu jkunu fatali.

Xi effetti sekondarji jidhru biss meta jittiehed test tad-demm. Dawn jinkludu tibdil fl-ammont ta' ċertu xahmijiet (trigliceridi u kolesterol totali) jew zokkor fid-demm, tibdil fl-ammont ta' ormoni tat-tirojde fid-demm tiegħek, zieda fl-enzimi tal-fwied, tnaqqis fl-għadd ta' ċerti tipi ta' ċelluli tad-demm, tnaqqis fl-ammont ta' ċelluli tad-demm homor, zieda fil-creatine phosphokinase fid-demm (sustanza fil-muskoli), tnaqqis fl-ammont ta' sodju fid-demm u zidiet fl-ammont tal-ormon prolactin fid-demm. F'każijiet rari zidiet fl-ormon prolactin jistgħu jwasslu għal dawn li ġejjin:

- L-irġiel u n-nisa jkollhom nefha f'sidirhom u b'mod mhux mistenni jipproduċu l-halib tas-sider.
- In-nisa ma jkollhomx pirjidi fix-xahar jew pirjids irregolari.

It-tabib tista' jitolbok tagħmel testijiet tad-demm minn żmien għal żmien.

Effetti sekondarji fit-tfal u l-adolessenti

L-istess effetti sekondarji li jistgħu jsejnhu fl-adulti jistgħu jsejnhu wkoll fit-tfal u l-adolessenti.

L-effetti sekondarji li ġejjin deher aktar ta' spiss fit-tfal u l-adolessenti jew ma deherx fl-adulti:

Effetti sekondarji komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Żieda fl-ammont ta' ormon imsejjah prolactin, fid-demm. Zidiet fl-ormon prolactin jista' f'każijiet rari jwasslu għal dawn li ġejjin:
 - Is-subien u l-bniet ikollhom nefha f'sidirhom u b'mod mhux mistenni jipproduċu l-halib tas-sider
 - Il-bniet ma jkollhomx pirjidi fix-xahar jew pirjids irregolari
- Żieda fl-aptit
- Rimettar
- Movimenti muskolari mhux normali. Dawn jinkludu diffikultà biex jinbdew movimenti muskolari, roġħda, irrikwjetezza jew riġidità muskolari mingħajr uġiġħ.
- Żieda fil-pressjoni tad-demm

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Thossok dghajjef, hass hażin (jista' jwassal għal waqgħat).
- Imnieher misdud.
- Thossok irritat.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħzen Seroquel

- Zomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.
- Tużax Seroquel wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.
- Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
- Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagg jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għandekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

• X'fih Seroquel

- Is-sustanza attiva hija quetiapine. Il-pilloli Seroquel fihom 50 mg, 150 mg, 200 mg jew 300 mg ta' quetiapine (bħala quetiapine fumarate).
- Is-sustanzi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola: povidone, calcium hydrogen phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate Tip A, lactose monohydrate, magnesium stearate, hypromellose.

Kisja tal-pillola: hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171). Il-pilloli ta' 25 mg, 100 mg u 150 mg fihom ukoll iron oxide yellow (E172) u l-pilloli ta' 25 mg fihom iron oxide red (E172).

Kif jidher Seroquel u l-kontenut tal-pakkett

Seroquel 25 mg pilloli miksijin b'rita huma kulur il-hawh, tondi u konvessi, u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 25 fuq naħa waħda

Seroquel 100 mg pilloli miksijin b'rita huma sofor, tondi u konvessi, u għandhom imnaqqxa SEROQUEL fuq naħa waħda

Seroquel 150 mg pilloli miksijin b'rita huma sofor ċari, tondi u konvessi u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 150 fuq naħa waħda

Seroquel 200 mg pilloli miksijin b'rita huma bojod, tondi u konvessi u għandhom imnaqqxa SEROQUEL 200 fuq naħa waħda

Seroquel 300 mg pilloli miksijin b'rita huma bojod, f'forma ta' kapsula u għandhom imnaqqxa SEROQUEL fuq naħa waħda u 300 fuq in-naħa l-oħra

Id-daqsijiet tal-pakkett ta' 20, 30, 50, 60 u 100 pillola huma rreġistrati għall-qawwiet kollha. Barra minn hekk, għal pilloli ta' 25 mg, huwa rreġistrat daqs ta' pakkett ta' 6 pilloli. Għal pilloli ta' 100 mg, 150 mg, 200 mg u pilloli 300 mg huma rreġistrati daqsijiet ta' pakkett ta' 10, 90. Għal pilloli ta' 150 mg u 300 mg, huma rreġistrati daqsijiet ta' pakkett ta' 120, 180 u 240 pillola. Għal Pakkett tal-Bidu ta' 3 ijiem, huwa rreġistrat daqs tal-pakkett ta' 8 pilloli u għal Pakkett tal-Bidu ta' 4 ijiem, huwa rreġistrat daqs ta' pakkett ta' 10 pilloli. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Istati Membri tal-EEA b'dawn l-ismijiet:

PAJJIŻ	ISEM KUMMERĊJALI
L-Awstrija	Seroquel
Il-Belġju	Seroquel
Ċipru	Seroquel
Id-Danimarka	Seroquel
L-Estonja	Seroquel
Il-Finlandja	Seroquel
Il-Ġermanja	Seroquel® 25 mg Filmdabletten, Seroquel® 100 mg Filmdabletten, Seroquel® 200 mg

	Filmdabletten, Seroquel® 300 mg Filmdabletten
Il-Ġreċja	Seroquel
L-Islanda	Seroquel
L-Irlanda	Seroquel
L-Italja	Seroquel
Il-Latvja	Seroquel
Il-Litwanja	Seroquel
Il-Lussemburgu	Seroquel
Malta	Seroquel
Il-Pajjiżi l-Baxxi	Seroquel
In-Norveġja	Seroquel
Il-Portugall	Seroquel
Ir-Rumanija	Seroquel
Is-Slovenja	Seroquel
Spanja	Seroquel
L-Isvezja	Seroquel
Ir-Renju Unit	Seroquel

<[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]> *[Għal proċeduri ta' riferiment, kif ikun xieraq]*

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f' {XX/SSSS}.

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT,
TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF**

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 50 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
Seroquel XR 150 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
Seroquel XR 200 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
Seroquel XR 300 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
Seroquel XR 400 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Seroquel XR 50 mg fih 50 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 119 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola
Seroquel XR 150 mg fih 150 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 71 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola
Seroquel XR 200 mg fih 200 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 50 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola
Seroquel XR 300 mg fih 300 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 47 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola
Seroquel XR 400 mg fih 400 mg ta' quetiapine (bhala quetiapine fumarate)
Eċċipjent : 15 mg ta' lattosju (anidru) f'kull pillola

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li terhi l-medicina bil-mod
Il-pilloli Seroquel XR 50 mg huma lewn il-hawh u minquxa b'“XR 50” fuq naħa wahda
Il-pilloli Seroquel XR 150 mg huma bojod u minquxa b'“XR 150” fuq naħa wahda
Il-pilloli Seroquel XR 200 mg huma sofor u minquxa b'“XR 200” fuq naħa wahda
Il-pilloli Seroquel XR 300 mg huma sofor ċari u minquxa b'“XR 300” fuq naħa wahda
Il-pilloli Seroquel XR 400 mg huma bojod u minquxa b'“XR 400” fuq naħa wahda

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Seroquel XR huwa indikat għal:

- kura ta' Skizofrenija
- kura ta' disturb bipolari:
 - o Għall-kura ta' episodji manijaċi moderati għal severi f'disturb bipolari
 - o Għall-kura ta' episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolari
 - o Għall-prevenzjoni ta' rikorrenza ta' episodji manijaċi jew depressivi f'pazjenti b'disturb bipolari li qabel irrispondew għall-kura bi quetiapine.
- kura mizjuda għal episodji depressivi maġġuri f'pazjenti b'Disturb Depressiv Maġġuri (MDD) li kellhom rispons sub-ottimali għal monoterapija b'antidepressant (ara Sezzjoni 5.1). Qabel jibdew il-kura, t-tobba għandhom iqisu l-profil tas-sigurtà ta' SEROQUEL XR (ara Sezzjoni 4.4).

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Jeżistu skedi differenti ta' dożaġġ għal kull indikazzjoni. Għalhekk għandu jiġi aċċertat li l-pazjenti jirċievu informazzjoni ċara dwar id-dożaġġ xieraq għall-kondizzjoni tagħhom.

Seroquel XR għandu jingħata darba kuljum, mingħajr ikel. Il-pilloli għandhom jinbelgħu shaħ u m'għandhomx jinqasmu, jintmagħdu jew jitfarrku.

Adulti:

Għall-kura ta' skizofrenija u episodji manijaċi moderati għal severi f'disturb bipolari

Seroquel XR għandu jingħata mill-anqas siegħa qabel ikla. Fil-bidu tat-terapija d-doża ta' kuljum hija ta' 300 mg f'Jum 1 u ta' 600 mg f'Jum 2. Id-doża rakkomandata ta' kuljum hija ta' 600 mg, madanakollu jekk ikun hemm ġustifikazzjoni klinika d-doża tista' tiżdied għal 800 mg kuljum. Id-doża għandha tiġi aġġustata fil-medda ta' doża effettiva ta' bejn 400 mg sa 800 mg kuljum, skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent. Għal terapija ta' manteniment f'skizofrenija m'hemm il-htieġa li d-doża tiġi aġġustata.

Għall-kura ta' episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolari

Seroquel XR għandu jingħata fil-hin tal-irquad. Id-doża totali ta' kuljum għall-ewwel erbat ijiem ta' terapija hija ta' 50 mg (Jum 1), 100 mg (Jum 2), 200 mg (Jum 3) u 300 mg (Jum 4). Id-doża rakkomandata ta' kuljum hija ta' 300 mg. Fi provi kliniċi, ma deher l-ebda benefiċċju addizzjonali fil-grupp fuq 600 mg meta mqabbel mal-grupp fuq 300 mg (ara sezzjoni 5.1). Pazjenti individwali jistgħu jibbenefikaw minn doża ta' 600 mg. Doži oghla minn 300 mg għandhom jinbdew minn tobbja b'esperjenza fil-kura ta' disturb bipolari. F'pazjenti individwali, fil-każ li jkun hemm tħassib dwar it-tolleranza, provi kliniċi indikaw li jista' jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża għal minimu ta' 200 mg.

Għall-prevenzjoni ta' rikorrenza f'disturb bipolari

Biex jiġi evitat li jkun hemm rikorrenza ta' episodji manijaċi, mħalltin jew depressivi f'disturb bipolari, pazjenti li rrispondew għal Seroquel XR għall-kura akuta ta' disturb bipolari għandhom ikomplu fuq Seroquel XR fl-istess doża li kienet qed tingħata fil-hin tal-irquad. Id-doża ta' Seroquel XR tista' tiġi aġġustata skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali fil-medda tad-doża ta' 300 mg għal 800 mg/kuljum. Huwa importanti li għat-terapija ta' manteniment tintuża l-aktar doża baxxa effettiva.

Għal kura mizjuda ta' episodji depressivi maġġuri f'MDD:

Seroquel XR għandu jingħata qabel il-hin tal-irquad. Id-doża ta' kuljum fil-bidu tat-terapija hija ta' 50 mg f'Jum 1 u 2, u ta' 150 mg f'Jum 3 u 4. Fi provi fuq żmien qasir l-effett kontra d-dipressjoni deher b'150 u 300 mg/kuljum bħala terapija mizjuda (ma' amitriptyline, bupropion, citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline u venlafaxine - ara Sezzjoni 5.1) u b'50 mg/kuljum fi provi qosra ta' monoterapija. Hemm riskju akbar ta' avvenimenti avversi b'doži oghla. Għalhekk it-tobbja għandhom jaċċertaw ruhhom li għall-kura tintuża l-aktar doża baxxa effettiva, li tibda b'50 mg/kuljum. Il-htieġa li d-doża tiżdied minn 150 għal 300 mg/kuljum għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-pazjent individwali.

Qalba mill-pilloli Seroquel li jerħu l-medicina f'daqqa:

Għal dożaġġ aktar konvenjenti, il-pazjenti li jkun qed jingħataw kura b'doži maqsumin ta' pilloli Seroquel li jerħu l-medicina f'daqqa jistgħu jinqalbu għal Seroquel XR fl-ekwivalenti tad-doża totali ta' kuljum li tittiehed darba kuljum. Jista' jkun hemm il-htieġa ta' aġġustamenti individwali tad-doża.

Anzjani:

Bħal b'medicini antipsikotiċi u anti-dipressanti oħra, Seroquel XR għandu jintuża b'kawtela fl-anzjani, speċjalment matul il-perijodu inizjali ta' meta jibdew jingħataw id-doži. Ir-rata tat-titrizzjoni tad-doża ta' Seroquel XR jista' jkollha bżonn tkun aktar bil-mod, u d-doża terapewtika ta' kuljum jista' jkollha tkun aktar baxxa, minn dik li tintuża f'pazjenti iżgħar. Il-medja tat-tneħħija ta' quetiapine mill-plasma tnaqqset bi 30% għal 50% f'pazjenti anzjani meta mqabbla ma' pazjenti iżgħar. Pazjenti

anzjani għandhom jinbdew fuq doża ta' 50 mg/kuljum. Id-doża tista' tiżdied f'inkrementi ta' 50 mg/kuljum sakemm tinkiseb doża effettiva, skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali.

F'pazjenti anzjani b'episodji depressivi maġġuri f'MDD, id-doża għandha tibda b'50 mg/kuljum fil-Jiem 1-3, li tiżdied għal 100 mg/kuljum fil-Jum 4 u 150 mg/kuljum fil-Jum 8. Għandha tintuża l-aktar doża baxxa effettiva, li tibda minn 50 mg/kuljum. Abbazi ta' valutazzjoni tal-pazjent individwali, jekk ikun hemm il-ħtieġa ta' zieda fid-doża għal 300 mg/kuljum din m'għandiex isir qabel il-Jum 22 tal-kura.

L-effikaċja u s-sigurtà ma ġewx ivvalutati f'pazjenti 'l-fuq minn 65 sena b'episodji depressivi fil-qafas ta' disturb bipolari.

Popolazzjoni Pedjatrika

Seroquel XR mhuwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l-adolessenti taħt it-18-il sena, minhabba nuqqas ta' dejta li tappoġġa l-użu f'dan il-grupp ta' etajiet. L-evidenza disponibbli minn provi kliniċi kkontrollati bi placebo hija pprezentata fis-sezzjonijiet 4.4, 4.8, 5.1 u 5.2.

Indeboliment tal-kliewi:

M'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied:

Quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied. Għalhekk, Seroquel XR għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkun magħruf li għandhom indeboliment tal-fwied, speċjalment matul il-perjodu inizjali ta' meta jibdew jingħataw id-doži. Pazjenti b'indeboliment tal-fwied għandhom jinbdew fuq 50 mg/kuljum. Id-doża tista' tiżdied f'inkrementi ta' 50 mg/kuljum għal doża effettiva, skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità tal-pazjent individwali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wiehed mill-eċċipjenti ta' dan il-prodott.

L-ghoti konkomitanti ta' inibituri taċ-ċitokromju P450 3A4, bħal inibituri tal-protease tal-HIV, aġenti antifungali azole, erythromycin, clarithromycin u nefazodone, huwa kontraindikati. (Ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minhabba li Seroquel XR għandu bosta indikazzjonijiet, il-profil tas-sigurtà għandu jitqies fir-rigward tad-dijanjożi tal-pazjent individwali u d-doża li tkun qed tingħata.

L-effikaċja u s-sigurtà fit-tul f'pazjenti b'MDD bħala terapija miżjuda ma ġewx ivvalutati, madanakollu l-effikaċja u s-sigurtà fit-tul ġew ivvalutati bħala monoterapija f'pazjenti adulti (ara Sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Quetiapine mhuwiex rakkomandat għall-użu fit-fal u l-adolessenti taħt it-18 il sena, minhabba nuqqas ta' data li tappoġġa l-użu f'dan il-grupp ta' etajiet. Provi kliniċi bi quetiapine wrew li minbarra l-profil ta' sigurtà magħruf identifikat fl-adulti (ara sezzjoni 4.8), ċerti avveniment avversi sehhew bi frekwenza oġġla fit-tfal u l-adolessenti meta mqabbla mal-adulti (zieda fl-apetit, żidiet tal-prolactin fis-serum, rimettar, rinite u sinkope) jew jista' jkollu implikazzjonijiet differenti għat-tfal u l-adolessenti (sintomi ekstrapiramidali u irritabilità) u wiehed kien identifikat li ma kienx deherx qabel fl-istudju fuq l-adulti (żidiet fil-pressjoni tad-demmi). Fit-tfal u l-adolessenti kienu osservati wkoll bidliet fit-testijiet tal-funzjoni tat-tirojda.

Barra minn hekk, l-implikazzjonijiet tas-sigurtà fit-tul tal-kura bi quetiapine fuq it-tkabbir u l-maturazzjoni ma ġewx studjati għal aktar minn 26 ġimgha. L-implikazzjonijiet fit-tul għall-iżvilupp konjittiv u tal-imġiba mhumiex maghrufa.

Fi provi kliniċi kkontrollati bi placebo b'pazjenti tfal u adolexxenti, quetiapine kien assoċjat ma' zieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali (EPS) meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal skizofrenija, manija bipolar, u dipressjoni bipolar (ara sezzjoni 4.8).

Suwiċidju/ħsibijiet suwiċidali jew aggravar kliniku:

Id-dipressjoni hija assoċjata ma' riskju akbar ta' ħsibijiet suwiċidali, li pazjenti jwegġgħu lilhom infushom u suwiċidju (avvenimenti relatati mas-suwiċidju). Dan ir-riskju jippersisti sakemm ikun hemm remissjoni sinifikanti. Minhabba li matul l-ewwel ftit ġimghat jew aktar tal-kura jista' ma jkunx hemm titjib, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib sakemm isehh dan it-titjib. Mill-esperjenza klinika ġenerali r-riskju ta' suwiċidju jista' jżied fl-istadji bikrin tal-irkupru.

Barra minn hekk it-tobba għandhom iqisu wkoll ir-riskju potenzjali ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju wara li l-kura bi quetiapine titwaqqaf f'daqqa, minhabba l-fatturi ta' riskju maghrufa għall-marda li tkun qed tiġi trattata.

Kundizzjonijiet psikjatriċi ohra li għalihom jiġi preskritt quetiapine jistgħu ukoll ikunu assoċjati ma' riskju akbar ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju. Barra minn hekk, dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jsehhu flimkien ma' episodji depressivi maġġuri. Għalhekk waqt il-kura ta' pazjenti b'disturbi psikjatriċi ohra għandhom jiġu osservati l-istess prekawzzjonijiet li jiġu osservati waqt il-kura ta' pazjenti b'episodji depressivi maġġuri.

Pazjenti bi storja ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju, jew dawk li juru grad sinifikanti ta' ħsibijiet suwiċidali qabel jibdew il-kura huma maghrufa li jista' jkollhom riskju akbar ta' ħsibijiet suwiċidali jew attentati ta' suwiċidju, u għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa waqt il-kura. Meta-analiżi ta' provi kliniċi kkontrollati bi placebo ta' mediċini kontra d-dipressjoni f'pazjenti adulti b'disturbi psikjatriċi uriet riskju akbar ta' mġieba suwiċidali b'mediċini kontra d-dipressjoni meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti taħt il-25 sena.

Flimkien mat-terapija bil-mediċina għandu jkun hemm sorveljanza mill-qrib tal-pazjenti u b'mod partikolari dawk li qegħdin f'riskju għoli speċjalment fil-bidu tal-kura u wara tibdil fid-doża. Il-pazjenti (u dawk li jieħdu ħsieb il-pazjenti) għandhom jiġu avżati dwar il-ħtieġa li jimmonitorjaw għal kull deterjorament kliniku, imġieba jew ħsibijiet suwiċidali u bidliet mhux tas-soltu fl-imġieba u biex ifittxu parir mediku minnufih jekk dawn is-sintomi jippersistu.

Fi studji kliniċi fuq żmien qasir ikkontrollati bi placebo ta' pazjenti b'episodji depressivi maġġuri f'disturb bipolar kienet osservata zieda fir-riskju ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju f'pazjenti adulti żgħar (ta' anqas minn 25 sena) li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine meta mqabbla ma' dawk li kienu qed jirċievu kura bi placebo (3.0% kontra 0%, rispettivament). Fi studji kliniċi ta' pazjenti b'MDD l-inċidenza ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju osservata f'pazjenti adulti żgħar (ta' anqas minn 25 sena) kienet ta' 2.1% (3/144) għal quetiapine u ta' 1.3% (1/75) għall-placebo.

Riskju metaboliku

Minhabba r-riskju osservat għal aggravar tal-profil metaboliku tagħhom, inkluż tibdil fil-piż, glukosju (ara ipergliċemija) u lipidi fid-demm, li deher fl-istudji kliniċi, fil-bidu tal-kura għandhom jiġu vvalutati l-parametri metabolici tal-pazjent u bidliet f'dawn il-parametri għandhom jiġu kkontrollati regolarment matul il-kors tal-kura. Aggravar f'dawn il-parametri għandu jiġi ġestit kif klinikament xieraq (ara wkoll sezzjoni 4.8).

Sintomi ekstrapiramidali:

Fi provi kliniċi kkontrollati bi placebo f'pazjenti adulti quetiapine kien assoċjat ma' żieda fl-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali (EPS) meta mqabbla ma' placebo f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal episodji depressivi maġġuri f'disturbi bipolari u f'disturbi depressiv maġġuri (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

L-użu ta' quetiapine kien assoċjat mal-iżvilupp ta' akatizja, ikkaratterizzata minn irrikwjetezza soġġettivament spjaċevoli jew stressanti jew il-htieġa li jiċċaqalqu ta' spiss flimkien ma' inkapaċità li joqgħodu bilqiegħda jew li jieqfu milli jiċċaqalqu. Dan huwa aktar probabbli li jsehh fl-ewwel ftit ġimgħat ta' kura. F'pazjenti li jizviluppaw dawn is-sintomi, żieda fid-doża tista' tkun detrimental.

Diskinesija Tardiva:

Jekk ikun hemm sinjali u sintomi ta' diskinesija tardiva, għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża jew it-twaqqif ta' quetiapine. Is-sintomi ta' diskajnezja tardiva jistgħu jaggravaw jew saħansitra jitfaċċaw wara li titwaqqaf il-kura (ara Sezzjoni 4.8).

Nghas u sturdament:

Il-kura bi quetiapine kienet assoċjata ma' nghas u sintomi relatati, bħal sedazzjoni (ara Sezzjoni 4.8). Fi provi kliniċi għall-kura ta' pazjenti b'dipressjoni bipolari u b'disturb depressiv maġġuri, ġeneralment dan beda fi żmien l-ewwel 3 ijiem tal-kura u predominantement kien ta' intensità hafifa għal moderata. Pazjenti li jesperjenzaw nghas ta' intensità severa jistgħu jehtieġu kuntatt aktar frekwenti għal minimu ta' ġimagħtejn mill-bidu tan-nghas, jew sakemm is-sintomi jitlejbu u jista' jkun hemm il-htieġa li jiġi kkunsidrat li l-kura titwaqqaf.

Pressjoni Baxxa Ortostatika

Il-kura bi quetiapine kienet assoċjata ma' pressjoni baxxa ortostatika u sturdament relatat (ara Sezzjoni 4.8) li, bħan-nghas normalment tibda matul il-perjodu inizjali tat-titrazzjoni tad-doża. Dan jista' jżid l-inċidenza ta' korriment aċċidentali (waqgħat), speċjalment fil-popolazzjoni anzjana. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti sakemm ikunu familjari mal-effetti potenzjali tal-medikazzjoni.

Quetiapine għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkun magħruf li jkollhom mard kardjovaskulari, mard ċerebrovaskulari, jew kundizzjonijiet oħra li jippreddisponu għal pressjoni baxxa. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa ortostatika għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża jew titrazzjoni aktar bil-mod, speċjalment f'pazjenti b'mard kardjovaskulari sottostanti.

Aċċessjonijiet:

Fi provi kliniċi kkontrollati ma kien hemm l-ebda differenza fl-inċidenza ta' aċċessjonijiet f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine jew placebo. Ma hemm l-ebda dejta disponibbli dwar l-inċidenza ta' aċċessjonijiet f'pazjenti bi storja ta' aċċessjonijiet. Bħal b'antipsikotiċi oħra, hija rakkomandata kawtela waqt il-kura ta' pazjenti bi storja ta' aċċessjonijiet (ara Sezzjoni 4.8).

Sindromu Newrolettiku Malinn:

Is-sindromu newrolettiku malinn kien assoċjat ma' kura b'antipsikotiċi, inkluż quetiapine (ara sezzjoni 4.8). Il-manifestazzjonijiet kliniċi jinkludu ipertermja, stat mentali alterat, riġidità muskolari, instabilità awtonomika, u żieda fil-creatine phosphokinase. F'dan il-każ, quetiapine għandu jitwaqqaf u għandha tingħata kura medika adattata.

Newtropsja severa u agranuloċitosi:

Fi provi kliniċi bi quetiapine newtropsja severa (għadd tan-newtrofili $<0.5 \times 10^9/L$) kienet irrapportata. Hafna mill-każijiet ta' newtropsja severa sehhew fi żmien ftit xhur mill-bidu tat-terapija bi quetiapine. Ma kien hemm l-ebda relazzjoni apparenti mad-doża. Matul l-esperjenza ta' wara tqegħid fis-suq, xi każijiet kienu fatali. Fatturi ta' riskju possibbli għal newtropsja jinkludu għadd baxx ta' ċelluli bojod (WBC) pre-eżistenti u storja ta' newtropsja ikkawżata mill-medicina. Madankollu, xi każijiet sehhew f'pazjenti mingħajr fatturi ta' riskju pre-eżistenti. Quetiapine għandu jitwaqqaf f'pazjenti b'għadd tan-newtrofili $<1.0 \times 10^9/L$. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal

sinjali u sintomi ta' infezzjoni u l-ghadd tan-newtrofili ghandu jigi segwit (sakemm jaqbeż $1.5 \times 10^9/L$) (ara sezzjoni 5.1).

In-newtropenja ghandha tigi kkunsidrata f'pazjenti li jipprezentaw b'infezzjoni jew deni, partikularment fin-nuqqas ta' fattur (i) ovvju(i) ta' predispozzjoni, u ghandha tigi kkontrollata b'mod klinikament xieraq.

Il-pazjenti ghandhom jinghataw parir biex jirrapportaw minnufih id-dehra ta' sinjali/sintomi konsistenti ma' agranuloċitosi jew infezzjoni (eż., deni, dgħjufija, letargija, jew uġigh fil-grizmejn) fi kwalunkwe hin matul it-terapija b'Seroquel XR. Dawn il-pazjenti ghandu jsirillhom għadd fil-pront tal-WBC u tal-ANC, speċjalment fin-nuqqas ta' fatturi ta' predispozzjoni.

Interazzjonijiet:

Ara wkoll sezzjoni 4.5.

L-użu konkomitanti ta' quetiapine ma' indutturi qawwija ta' enzimi epatiċi bħal carbamazepine jew phenytoin inaqqas sostanzjalment il-konċentrazzjonijiet ta' quetiapine fil-plasma, li jista' jaffettwa l-effikaċja tat-terapija bi quetiapine. F'pazjenti li jkunu qed jirċievu indutturi tal-enzimi epatiċi, il-kura bi quetiapine ghandha tinbeda biss jekk it-tabib iqis li l-benefiċċji ta' quetiapine jegħlbu r-riskji tat-tnehhija tal-indutturi tal-enzimi epatiċi. Huwa importanti li kwalunkwe bidla fl-induttur tkun gradwali, u jekk ikun meħtieġ, jigi sostitwit ma' wiehed mhux induttur (eż. sodium valproate).

Piż

Żieda fil-piż kienet irrapportata f'pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi quetiapine, u ghandha tigi mmonitorjata u kkontrollata b'mod klinikament xieraq skont il-linji gwida tal-antipsikotiċi li jkunu qed jintużaw (Ara Sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Iperglicemija:

Iperglicemija u/jew l-iżvilupp jew l-aggravar tad-dijabete xi kultant assoċjata ma' ketoacidożi jew koma kienet irrapportata b'mod rari, inkluzi xi każijiet fatali (ara sezzjoni 4.8). F'xi każijiet, kienet irrapportata żieda preċedenti fil-piż tal-ġisem li tista' tkun fattur ta' predispozzjoni. Huwa rrakkomandat li jkun hemm monitoraġġ kliniku adattat skont il-linji gwida tal-antipsikotiċi li jkunu qed jintużaw. Il-pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b'xi aġent antipsikotiku inkluz quetiapine, ghandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta' iperglicemija, (bħal polidipjsa, polijurja, polifagja u dgħjufija) u l-pazjenti b'dijabete mellitus jew b'fatturi ta' riskju għal dijabete mellitus ghandhom jiġu mmonitorjati b'mod regolari għal aggravar tal-kontroll tal-glukosju. Il-piż ghandu jigi mmonitorjat b'mod regolari .

Lipidi:

Fi provi kliniċi bi quetiapine ġew osservati żidiet fit-trigliceridi, l-LDL u l-kolesterol totali, u tnaqqis fil-kolesterol HDL (ara sezzjoni 4.8). Bidliet fil-lipidi ghandhom jiġu ġestiti b'mod klinikament xieraq.

Titwil tal-QT

Fi provi kliniċi u waqt l-użu skont l-SPC, quetiapine ma kienx assoċjat ma' żieda persistenti fl-intervalli assoluti tal-QT. Wara t-tqeghid fis-suq, it-titwil tal-QT kien irrapportat bi quetiapine fid-dożi terapewtiċi (ara Sezzjoni 4.8) u f'doża eċċessiva (ara Sezzjoni 4.9). Bħal b'antipsikotiċi oħra, ghandha tigi eżerċitata kawtela meta quetiapine jigi preskritt lil pazjenti b'mard kardjovaskulari jew bi storja familjari ta' titwil tal-QT. Ghandha wkoll tigi eżerċitata kawtela meta quetiapine jigi preskritt jew ma' mediċini magħrufa li jżidu l-intervall tal-QT, jew ma' newrolettici konkomitanti, speċjalment fl-anzjani, f'pazjenti b'sindromu kongenitali ta' QT twil, insuffiċjenza kongestiva tal-qalb, ipertrofija tal-qalb, ipokalemija jew ipomagnesimja (ara sezzjoni 4.5).

Kardjomijopatija u Mijokardite

Kardjomijopatija u mijokardite ġew irrapportati fi provi kliniċi u waqt l-esperjenza wara tqeghid fis-suq, madankollu, ma gietx stabbilita relazzjoni kawżali ma' quetiapine. Il-kura bi quetiapine għandha tiġi vvalutata mill-ġdid f'pazjenti b'suspett ta' kardjomijopatija jew mijokardite.

Irtirar

Sintomi akuti ta' irtirar bħal insomnja, dardir, uġiġħ ta' ras, dijarea, rimettar, sturdament, u irritabilità kienu deskritti wara l-waqfien f'daqqa ta' quetiapine. Huwa rakkomandat li jkun hemm twaqqif gradwali fuq perjodu ta' mill-inqas ġimgha sa ġimagħtejn. (ara sezzjoni 4.8)

Pazjenti anzjani bi psikożi relatata mad-dimenzja:

Quetiapine mhuwiex approvat għall-kura ta' psikożi relatata mad-dimenzja.

Fi provi randomizzati kkontrollati bi placebo fil-popolazzjoni b'dimenzja dehret zieda ta' madwar 3-darbiet fir-riskju ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi b'ċerti antipsikotiċi atipici. Il-mekkaniżmu għal din iż-żieda fir-riskju mhuwiex magħruf. Ma tistax tiġi eskluża zieda fir-riskju għal antipsikotiċi oħra jew għal popolazzjonijiet oħra ta' pazjenti. Quetiapine għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'fatturi ta' riskju għal puplesija.

F'meta-analiżi ta' antipsikotiċi atipici, ġie rrapportat li pazjenti anzjani bi psikożi relatata mad-dimenzja huma f'riskju akbar ta' mewt meta mqabbla ma' placebo. Madankollu, f'żewġ studji ta' 10 ġimghat ikkontrollati bi placebo ta' quetiapine fl-istess popolazzjoni ta' pazjenti (n=710; età medja: 83 sena; medda: 56-99 sena) l-inċidenza ta' mortalità f'pazjenti li kienu qed jingħataw kura bi quetiapine kienet ta' 5.5% kontra 3.2% fil-grupp tal-placebo. Il-pazjenti f'dawn il-provi mietu minhabba varjetà ta' kawżi li kienu konsistenti mal-aspettattivi għal din il-popolazzjoni. Din id-dejta ma tistabilixx relazzjoni kawżali bejn kura bi quetiapine u mewt f'pazjenti anzjani bid-dimenzja.

Disfaġja

Disfaġja (Ara sezzjoni 4.8) kienet irrapportata bi quetiapine. Quetiapine għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'riskju ta' pnemonja b'aspirazzjoni.

Stitikezza u ostruzzjoni intestinali

L-istitikezza tirrappreżenta fattur ta' riskju għal ostruzzjoni intestinali. Stitikezza u ostruzzjoni intestinali kienu rrapportati bi quetiapine (ara sezzjoni 4.8 Effetti Mhux Mixtieqa). Dan jinkludi rapporti fatali f'pazjenti li qegħdin f'riskju ogħla ta' ostruzzjoni intestinali, inklużi dawk li qed jirċievu bosta medikazzjonijiet konkometanti li jnaqqsu l-motilità intestinali u/jew li jistgħu ma jirrapportawx is-sintomi ta' stitikezza. Pazjenti b'ostruzzjoni intestinali/ileju għandhom jiġu ġestiti b'monitoraġġ mill-qrib u kura urgenti.

Tromboemboliżmu fil-Vini (VTE)

Każijiet ta' tromboemboliżmu fil-vini (VTE) kienu rrapportati b'mediċini antipsikotiċi. Minhabba li hafna drabi pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b'antipsikotiċi jipprezentaw b'fatturi akkwiziżi ta' riskju għal VTE, għandhom jiġu identifikati l-fatturi kollha possibbli ta' riskju għal VTE qabel u waqt il-kura bi quetiapine u għandhom jittiehdu miżuri preventivi.

Pankreatite

Pankreatite kienet irrapportata fi provi kliniċi u waqt l-esperjenza wara t-tqeghid fis-suq. Fost ir-rapporti ta' wara t-tqeghid fis-suq, filwaqt li mhux il-każijiet kollha kienu mfikkla minn fatturi ta' riskju, hafna pazjenti kellhom fatturi li huma magħrufa li huma assoċjati ma' pankreatite bħal zieda fit-trigliceridi (ara sezzjoni 4.4), ġebel fil-marrara, u konsum ta' alkohol.

Aktar tagħrif

Id-dejta dwar quetiapine f'kombinazzjoni ma' divalproex jew lithium f'episodji manijaċi akuti moderati għal severi hija limitata; madankollu, it-terapija kkombinata kienet ittollerata sew (ara sezzjoni 4.8 u 5.1). Id-dejta uriet effett ulterjuri fil-ġimgha 3.

Lattosju:

Il-pilloli Seroquel XR fihom il-lattosju. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza għal galactose, defiċjenza ta' lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m'għandhomx jiehdu din il-medicina .

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Minhabba l-effetti ta' quetiapine fuq is-sistema nervuża ċentrali ewlenija, quetiapine għandu jintuża b'kawtela meta jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali ohra li jaġixxu fuq is-sistema ċentrali u mal-alkohol .

Iċ-ċitokromju P450 (CYP) 3A4 huwa l-enzim primarjament responsabbli għall-metabolizmu ta' quetiapine medjat miċ-ċitokromju P450. Fi studju ta' interazzjoni fuq voluntiera b'saħħithom, l-għoti ta' quetiapine (doża ta' 25 mg) flimkien ma' ketoconazole, inibitur ta' CYP3A4, ikkawża żieda ta' 5-sa 8-darbiet fl-AUC ta' quetiapine. Abbazi ta' dan, l-użu ta' quetiapine flimkien ma' inibituri ta' CYP3A4 huwa kontraindikata. Barra minn hekk mhuwiex rakkomandat li jittiehed meraq tal-grejpfrut waqt it-terapija bi quetiapine.

Fi prova b'hafna dozi f'pazjenti sabiex tiġi vvalutata l-farmakokinetika ta' quetiapine meta jingħata qabel u waqt il-kura b'carbamazepine (induttur magħruf ta' enzimi epatiċi), l-għoti flimkien ta' carbamazepine zied b'mod sinifikanti t-tneħħija ta' quetiapine. Din iż-żieda fit-tneħħija naqqset l-espożizzjoni sistemika ta' quetiapine (kif imkejla bl-AUC) għal medja ta' 13% tal-espożizzjoni matul l-għoti ta' quetiapine wahdu; għalkemm f'xi pazjenti deher effett akbar. Bħala konsegwenza ta' din l-interazzjoni, jista' jkun hemm konċentrazzjonijiet aktar baxxi fil-plasma, li jistgħu jaffettwaw l-effikaċja tat-terapija bi quetiapine. L-għoti ta' quetiapine flimkien ma' phenytoin (induttur iehor tal-enzimi mikrosomali) ikkawża żieda hafna akbar fit-tneħħija ta' quetiapine b'madwar 450%. F'pazjenti li jkunu qed jirċievu induttur tal-enzimi epatiċi, il-kura bi quetiapine għandha tinbeda biss jekk it-tabib iqis li l-benefiċċji ta' quetiapine jegħlbu r-riskji tat-tneħħija tal-induttur tal-enzimi epatiċi. Huwa importanti li kwalunkwe bidla fl-induttur tkun gradwali, u jekk meħtieġ, jiġi sostitwit b'wiehed li mhux induttur (eż. sodium valproate) (ara sezzjoni 4.4).

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula b'mod sinifikanti bl-għoti fl-istess hin tal-antidepressanti imipramine (inibitur magħruf ta' CYP 2D6) jew fluoxetine (inibitur magħruf ta' CYP 3A4 u CYP 2D6).

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula b'mod sinifikanti bl-għoti fl-istess hin tal-antipsikotiċi risperidone jew haloperidol. L-użu konkomitanti ta' quetiapine u thioridazine ikkawża żieda fit-tneħħija ta' quetiapine b'madwar 70%.

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula wara li ngħata flimkien ma' cimetidine.

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma kinitx mibdula wara li ngħata flimkien ma' quetiapine.

Fi studju randomizzat ta' 6 ġimgħat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra placebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta, kienet osservata inċidenza oghla ta' avvenimenti ekstrapiramidali relatati (b'mod partikulari roġħda), ngħas, u żieda fil-piż fil-grupp li kellu lithium mizjud meta mqabbla mal-grupp li kellu placebo mizjud (ara sezzjoni 5.1).

Il-farmakokinetika ta' sodium valproate u quetiapine ma kinitx mibdula b'mod klinikament rilevanti meta ngħataw flimkien. Studju retrospettiv ta' tfal u adolexxenti li rċeview valproate, quetiapine, jew it-tnejn, sab inċidenza oghla ta' lewkopenja u newtropenja fil-grupp tal-kombinazzjoni kontra l-gruppi ta' monoterapija

Ma sarux studji formali ta' interazzjoni bi prodotti mediċinali kardjovaskulari komunement użati.

Għandha tiġi eżerċitata kawtela meta quetiapine jintuża flimkien ma' prodotti mediċinali magħrufa li jikkawżaw żbilanċ fl-elettroliti jew li jżidu l-intervall tal-QT.

Kien hemm rapporti ta' riżultati pożittivi meta fil-fatt kienu negattivi f'immunoassaggi tal-enzimi għal methadone u antidipressanti triċikliċi f'pazjenti li kienu kienet quetiapine. Huwa rakkomandat li riżultati dubjużi ta' skринing immunoassaggi jiġu konfermati b'teknika kromatografika xierqa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

L-ewwel trimestru

L-ammont moderat ta' dejta ppubblikata minn tqaliet esposti (jiġifieri bejn 300-1,000 riżultat ta' tqala), inkluż rapporti individwali u xi studji ta' osservazzjoni ma jissuggerixx riskju miżjud ta' malformazzjonijiet minhabba l-kura. Madankollu, abbażi tad-dejta kollha disponibbli, ma tistax tinstilet konklużjoni definita. Studji f'annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Għaldaqstant, quetiapine għandu jintuża biss matul tqala jekk il-benefiċċji jiġġustifikaw ir-riskji potenzjali.

It-tielet trimestru

Trabi tat-twelid li kienu esposti għal antipsikotiċi (inkluż quetiapine) matul it-tielet trimestru tat-tqala qegħdin f'riskju ta' reazzjonijiet avversi inkluż sintomi ekstrapiramidali u/jew ta' irtirar li jistgħu jvarjaw fis-serjetà u t-tul wara l-hlas. Kien hemm rapporti ta' aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, roghda, nġhas, distress respiratorju, jew disturb fit-tmigh. Konsekwentement, it-trabi tat-twelid għandhom jiġu mmonitorjati b'attenzjoni.

Treddigh

Abbażi ta' dejta limitata ħafna minn rapporti ppubblikati dwar it-tneħħija ta' quetiapine fil-ħalib tas-sider uman, it-tneħħija ta' quetiapine f'dozi terapewtiċi tidher inkonsistenti. Minhabba nuqqas ta' dejta affidabbli, għandha tittiehed deċiżjoni jekk jitwaqqafx it-treddigh jew jekk titwaqqafx it-terapija b'Seroquel XR b'kunsiderazzjoni tal-benefiċċju tat-treddigh għat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija għall-mara.

Fertilità

L-effetti ta' quetiapine fuq il-fertilità tal-bniedem ma ġewx iġvalutati. Fil-firien deħru effetti relatati ma' żieda fil-livelli ta' prolactin, għalkemm dawn mhumiex direttament rilevanti għall-bniedem (ara sezzjoni 5.3 ta' qabel l-użu kliniku).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Minhabba li l-effetti primarji tiegħu huma fuq is-sistema nervuża ċentrali, quetiapine jista' jinterferixxi ma' attivitajiet li jehtiegu attenzjoni mentali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew iħaddmu magni, sakemm tkun magħrufa s-suxxettibbiltà individwali.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina (ADRs) irrapportati b'mod komuni bi quetiapine ($\geq 10\%$) huma nġhas, sturdament, uġiġh ta' ras, ħalq xott, sintomi ta' irtirar (twaqqif), żidiet fil-livelli tat-trigliceridi fis-serum, żidiet fil-kolesterol totali (l-aktar kolesterol LDL), tnaqqis fil-kolesterol HDL, żieda fil-piż, tnaqqis fl-emoglobina u sintomi ekstrapiramidali.

L-inċidenzi ta' ADRs assoċjati ma' terapija bi quetiapine, huma elenkati hawn taht (Tabella 1) skont il-format rakkomandat mill-Kunsill Għall-Organizzazzjonijiet Internazzjonali tax-Xjenzi Mediċi (Grupp ta' Hidma tas-CIOMS III; 1995).

Tabella 1 ADRs assoċjati ma' terapija bi quetiapine

Il-frekwenzi ta' avvenimenti avversi huma kklassifikati skont dawn li ġejjin: Komuni hafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$, $< 1/1000$), rari hafna ($< 1/10,000$), u mhux maghruf (ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli).

SOC	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Rari Hafna	Mhux maghruf
<i>Disturbi tad-dem u tas-sistema limfatika</i>	Tnaqqis fl-emoglobina ²²	Lewkopenja ^{1, 28} , tnaqqis fl-ghadd tan-newtrofili, zieda fl-esinofili ²⁷	Tromboċitopenja, Anemija, tnaqqis fl-ghadd tal-plejtlits ¹³	Agranuloċitosi ²⁶		Newtropsenja ¹
<i>Disturbi fis-sistema immuni</i>			Sensittività eċċessiva (inklużi reazzjonijiet allergiċi fil-gilda)		Reazzjoni anafilattika ⁵	
<i>Disturbi fis-sistema endokrinarja</i>		Iperprolaktinimja ¹⁵ , tnaqqis fit-T4 totali ²⁴ , tnaqqis fit-T4 hieles ²⁴ , tnaqqis fit-T3 totali ²⁴ , zidiet fit-TSH ²⁴	Tnaqqis fit-T3 hieles ²⁴ , Ipotirojdiżmu ²¹		Sekrezzjoni mhux approprjata tal-ormon antidijuretiku	
<i>Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni</i>	Židiet fil-livelli tat-trigliceridi fis-serum ^{10,30} Židiet fil-kolesterol totali (l-aktar kolesterol LDL) ^{11,30} Tnaqqis fil-kolesterol HDL ^{17,31} , Žieda fil-piż ^{8,30}	Žieda fl-aptit, zieda fil-glukosju fid-dem u għal livelli iperglicemiċi ^{6, 30}	Iponatremja ¹⁹ , Dijabete Mellitus ^{1, 5}	Sindromu metaboliku ²⁹	Tahrax ta' dijabete pre-eżistenti	
<i>Disturbi psikjatriċi</i>		Holm abnormali u inkubi, Hsibijiet suwiċidali u mgieba suwiċidali ²⁰		Sonnambulizmu u reazzjonijiet relatati bħal tpaċpiċ waqt l-irqad u disturbi tal-ikel relatati mal-irqad		
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>	Sturdament ^{4, 16} , nghanas ^{2,16} , uġiġħ ta' ras, Sintomi ekstrapiramidali ^{1, 21}	Disartriya	Aċċessjonijiet ¹ , Sindromu tas-saqajn irrikwieti, Diskinesija tardiva ^{1, 5} , Sinkope ^{4,16}			
<i>Disturbi fil-qalb</i>		Takikardja ⁴ , Palpitazzjonijiet ²³	Titwil tal-QT ^{1,12, 18} Bradikardija ³²			

SOC	Komuni Hafna	Komuni	Mhux Komuni	Rari	Rari Hafna	Mhux maghruf
<i>Disturbi fl- għajnejn</i>		Vista mċajpra				
<i>Disturbi vaskulari</i>		Ipotensjoni ortostatika ^{4,16}		Tromboemboliżm u fil-vini ¹		
<i>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</i>		Dispnea ²³	Rinite			
<i>Disturbi gastro- intestinali</i>	Halq xott	Stitikezza, dispepsja, rimettar ²⁵	Disfaġja ⁷	Pankreatite ¹ , Ostruzzjoni intestinali/ileju		
<i>Disturbi fil- fwied u fil- marrara</i>		Židiet fl-alanine aminotransferas e fis-serum (ALT) ³ , Židiet fil-livelli tal- gamma-GT ³	Židiet fl- aspartate aminotransferas e fis-serum (AST) ³	Suffeja ⁵ , Epatite		
<i>Disturbi fil- gilda u fit- tessuti ta' taħt il-gilda</i>					Angjoedema ⁵ , Sindromu ta' Stevens- Johnson ⁵	Nekroliži Epidermali Tossika, Eritema Multiforme
<i>Disturbi muskolu- skelettriċi u tat- tessuti konnettivi</i>					Rabdomajoliż i	
<i>Disturbi fil- kliwi u fis- sistema urinarja</i>			Žamma tal- awrina			
<i>Kondizzjonijiet ta' waqt it- tqala, il-ħlas u wara l-ħlas</i>						Sindromu ta' irtirar tal- medicini fit- trabi tat-twelid ³¹
<i>Disturbi fis- sistema riproduttiva u fis-sider</i>			Disfunzjoni sesswali	Prijapiżmu, galaktorreja, nefha fis-sider, disturb mestrwali		
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>	Sintomi ta' irtirar ^{1,9}	Astenja hafifa, edema periferali, irritabilità, deni		Sindromu newrolettiku malinn ¹ , ipotermja		
<i>Investigazzjoniji et</i>				Židiet fil-creatine phosphokinase fid-demmm ¹⁴		

1. Ara Sezzjoni 4.4.

2. In-nghas jista' jsehh, normalment matul l-ewwel ġimagħtejn ta' kura u ġeneralment jirriżolvi bl-ġhoti kontinwu ta' quetiapine.

3. Żidiet asintomatiċi (bidla min-normal għal $> 3X$ ULN fi kwalunkwe hin) fit-transaminasi (ALT, AST) jew fil-livelli tal-gamma-GT fis-serum kienu osservati f'xi pazjenti li ngħataw quetiapine. Dawn iż-żidiet kienu ġeneralment reversibbli wara kura kontinwa bi quetiapine.
4. Bħal b'antipsikotiċi oħra b'attività li timblokka l- α_1 adrenereġiku, quetiapine jista' komunement jinduċi ipotensjoni ortostatika, assoċjata ma' sturdament, takikardja u, f'xi pazjenti, sinkope, speċjalment matul il-perjodu inizjali tat-tirazzjoni tad-doża. (Ara sezzjoni 4.4).
5. Il-kalkolu tal-Frekwenza għal dawn l-ADRs ittiehed minn dejta wara t-tqegħid fis-suq biss.
6. Glukosju fid-demmm waqt is-sawm ≥ 126 mg/dL (≥ 7.0 mmol/L) jew glukosju fid-demmm mhux waqt is-sawm ≥ 200 mg/dL (≥ 11.1 mmol/L) f'mill-inqas okkażjoni waħda.
7. Żieda fir-rata ta' disfagġa bi quetiapine kontra placebo kienet osservata biss fil-provi kliniċi b'dipressjoni bipolari.
8. Abbazi ta' zieda ta' $> 7\%$ fil-piż tal-ġisem mil-linja bażi. Issehh b'mod predominanti matul il-ġimgħat tal-bidu tal-kura fl-adulti.
9. Is-sintomi ta' rtirar li ġejjin kienu osservati l-aktar frekwenti fi provi kliniċi akuti kkontrollati bi placebo b'monoterapija, li vvalutaw is-sintomi ta' twaqqif: insomnja, dardir, uġiġħ ta' ras, dijarea, rimettar, sturdament, u irritabilità. L-inċidenza ta' dawn ir-reazzjonijiet kienet naqset b'mod sinifikanti wara l-ewwel ġimgħa li twaqqaf.
10. Trigliceridi ≥ 200 mg/dL (≥ 2.258 mmol/L) (pazjenti ≥ 18 -il sena) jew ≥ 150 mg/dL (≥ 1.694 mmol/L) (pazjenti < 18 -il sena) f'mill-anqas okkażjoni waħda
11. Kolesterol ≥ 240 mg/dL (≥ 6.2064 mmol/L) (pazjenti ≥ 18 -il sena) jew ≥ 200 mg/dL (≥ 5.172 mmol/L) (pazjenti < 18 -il sena) f'mill-anqas okkażjoni waħda. Żieda fil-kolesterol LDL ta' ≥ 30 mg/dL (≥ 0.769 mmol/L) kienet osservata b'mod komuni ħafna. Il-bidla medja fost il-pazjenti li kellhom din iż-żieda kienet ta' 41.7 mg/dL (≥ 1.07 mmol/L).
12. Ara t-test hawn taht
13. Plejtlits $\leq 100 \times 10^9/L$ f'mill-anqas okkażjoni waħda
14. Abbazi ta' rapporti ta' avvenimenti avversi fil-provi kliniċi ta' zieda fil-creatine phosphokinase fid-demmm mhux assoċjata ma' sindromu newrolettiku malinn
15. Livelli tal-prolactin (pazjenti > 18 -il sena): > 20 $\mu\text{g/L}$ (> 869.56 pmol/L) irġiel; > 30 $\mu\text{g/L}$ (> 1304.34 pmol/L) nisa fi kwalunkwe hin.
16. Jista' jwassal għal waqgħat.
17. Kolesterol HDL: < 40 mg/dL (1.025 mmol/L) irġiel; < 50 mg/dL (1.282 mmol/L) nisa fi kwalunkwe hin.
18. L-inċidenza ta' pazjenti li għandhom bidla fil-QTc minn < 450 msec għal ≥ 450 msec b'żieda ta' ≥ 30 msec. Fi provi kkontrollati bi placebo bi quetiapine l-bidla medja u l-inċidenza ta' pazjenti li jkollhom bidla għal livell klinikament sinifikanti hija simili bejn quetiapine u placebo.
19. Bidla minn > 132 mmol/L għal ≤ 132 mmol/L f'mill-anqas okkażjoni waħda.
20. Każijiet ta' ħsbijiet dwar is-suwiċidju u mġieba suwiċidali ġew irrapportati waqt terapija bi quetiapine jew kmieni wara t-twaqqif tal-kura (ara Sezzjonijiet 4.4 u 5.1).
21. Ara Sezzjoni 5.1
22. Tnaqqis fl-emoglobina għal ≤ 13 g/dL (8.07 mmol/L) irġiel, ≤ 12 g/dL (7.45 mmol/L) nisa f'mill-anqas okkażjoni waħda sehh fi 11% tal-pazjenti fuq quetiapine fil-provi kollha inkluż estensjonijiet b'tikketta miftuħa. Għal dawn il-pazjenti, it-tnaqqis massimu medju fl-emoglobina fi kwalunkwe hin kien ta' -1.50 g/dL.
23. Ħafna drabi dawn ir-rapporti sehhew f'sitwazzjoni ta' takikardja, sturdament, pressjoni baxxa ortostatika, u/jew mard respiratorju/kardijaku sottostanti.
24. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fit- T_4 totali, T_4 hieles, T_3 totali u T_3 hieles huwa definit bħala $< 0.8 \times \text{LLN}$ (pmol/L) u tibdil fit-TSH huwa ta' > 5 mIU/L fi kwalunkwe hin.
25. Abbazi taż-żieda fir-rata ta' rimettar f'pazjenti anzjani (≥ 65 sena).
26. Abbazi ta' tibdil fin-newtrofili minn $\geq 1.5 \times 10^9/L$ fil-linja bażi għal $< 0.5 \times 10^9/L$ fi kwalunkwe hin matul il-kura u abbazi ta' pazjenti b'newtropenja severa ($< 0.5 \times 10^9/L$) u b'infezzjoni matul il-provi kliniċi kollha bi quetiapine (Ara Sezzjoni 4.4).
27. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fl-esinofili huwa definit bħala $> 1 \times 10^9$ ċelloli/L fi kwalunkwe hin.
28. Abbazi ta' tibdil mil-linja bażi normali għal valur potenzjalment klinikament importanti fi kwalunkwe hin wara l-linja bażi fil-provi kollha. Tibdil fil-WBCs huwa definit bħala $\leq 3 \times 10^9$ ċelloli/L fi kwalunkwe hin.
29. Abbazi ta' rapporti ta' avvenimenti avversi ta' sindromu metaboliku mill-provi kliniċi kollha bi quetiapine.
30. F'xi pazjenti, aggravar ta' aktar minn fattur metaboliku wiehed ta' piż, glukosju fid-demmm u lipidi kien osservat fi studji tekniċi (Ara Sezzjoni 4.4).
31. Ara Sezzjoni 4.6.
32. Jista' jsehh mal-bidu jew viċin il-bidu tal-kura u jkun assoċjat ma' pressjoni baxxa u/jew sinkope. Il-frekwenza hija bbażata fuq rapporti ta' avvenimenti avversi ta' bradikardja u avvenimenti relatati fil-provi kliniċi kollha bi quetiapine.

Każijiet ta' titwil tal-QT, aritmija ventrikulari, mewt f'daqqa minghajr spjegazzjoni, attakk tal-qalb u torsades de pointes kienu rrapportati bl-użu ta' newrolettici u huma meqjusa effetti tal-klassi.

Popolazzjoni pedjatrika

L-istess ADRs li ġew deskritti hawn fuq għall-adulti għandhom jiġu kkunsidrati għat-tfal u l-adolesxenti. It-tabella li ġejja tiġbor fil-qosor l-ADR li jseħhu f'kategorija ta' frekwenza oghla f'pazjenti tfal u adolesxenti (10-17-il sena) milli fil-popolazzjoni adulta jew ADRs li ma kienux identifikati fil-popolazzjoni adulta.

Tabella 2 ADRs fi tfal u adolesxenti assoċjati ma' terapija bi quetiapine li jseħhu bi frekwenza oghla milli fl-adulti, jew li ma ġewx identifikati fil-popolazzjoni adulta

Il-frekwenzi ta' avvenimenti avversi huma kklassifikati skont dawn li ġejjin: Komuni hafna (>1/10), komuni (>1/100, <1/10), mhux komuni (>1/1000, <1/100), rari (>1/10,000, <1/1000) u rari hafna (<1/10,000).

SOC	Komuni Hafna	Komuni
<i>Disturbi fis-sistema endokrinarja</i>	Żidiet fil-prolactin ¹	
<i>Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni</i>	Żieda fl-aptit	
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>	Sintomi ekstrapiramidali ^{3,4}	Sinkope
<i>Disturbi vaskulari</i>	Żidiet fil-pressjoni tad-demmm ²	
<i>Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali</i>		Rinite
<i>Disturbi gastro-intestinali</i>	Rimettar	
<i>Disturbi generali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>		Irritabilità ³

1. Livelli tal-prolactin (pazjenti < 18-il sena): >20 ug/L (>869.56 pmol/L) irġiel; >26 ug/L (>1130.428 pmol/L) nisa fi kwalunkwe hin. Anqas minn 1% tal-pazjenti kellhom żieda fil-livell tal-prolactin >100 ug/L.
2. Abbażi ta' tibdil 'il fuq minn limiti klinikament sinifikanti (adattat mill-kriterji tal-Istituti Nazzjonali tas-Saħħa) jew żidiet ta' >20 mmHg għal pressjoni sistolika tad-demmm jew ta' >10 mmHg għal pressjoni diastolika tad-demmm fi kwalunkwe hin f'żewġ provi akuti (3-6 ġimgħat) ikkontrollati bi placebo fi tfal u adolesxenti.
3. Nota: Il-frekwenza hija konsistenti ma' dik osservata fl-adulti, iżda tista' tkun assoċjata ma' implikazzjonijiet klinici differenti fit-tfal u l-adolesxenti meta mqabbla mal-adulti.
4. Ara sezzjoni 5.1

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati:

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

B'mod ġenerali, is-sinjali u s-sintomi rappurtati kienu daww b'riżultat ta' esagerazzjoni tal-effetti farmakoloġici magħrufa tas-sustanza attiva, jiġifieri nġhas u sedazzjoni, takikardja u ipotensjoni.

Doża eċċessiva tista' twassal għal titwil tal-QT, aċċessjonijiet, status epilepticus, rabdomajoliżi, dipressjoni respiratorja, żamma tal-awrina, konfużjoni, delirju u/jew aġitazzjoni, koma u mewt. Pazjenti b'mard kardjovaskulari sever pre-eżistenti jistgħu jkunu f'riskju akbar tal-effetti ta' doża eċċessiva. (Ara sezzjoni 4.4, Pressjoni Baxxa Ortostatika).

Immaniġġjar ta' doża eċċessiva

M'hemmx antidotu speċifiku għal quetiapine. F'każijiet ta' sinjali severi, għandu jiġi kkunsidrat l-involviment ta' aktar minn medicina wahda, u huma rakkomandati proċeduri ta' kura intensiva, inkluż li jiġi stabbilit u jinżamm passaġġ tan-nifs patenti, tiġi żgurata ossiġinazzjoni u ventilazzjoni adegwata, u monitoraġġ u appoġġ tas-sistema kardjovaskulari.

Abbażi tal-letteratura pubblika, pazjenti b' delirju u aġitazzjoni u sindromu antikolinerġiku ċar jistgħu jiġu ttrattati b'physostigmine, 1-2 mg (taht monitoraġġ kontinwu b'ECG), Dan mhuwiex rakkomandat bħala kura standard, minhabba l-effett negattiv potenzjali ta' physostigmine fuq il-konduttanza tal-qalb. Physostigmine jista' jintuża jekk ma jkunx hemm aberrazzjonijiet fuq l-ECG. Tużax physostigmine fil-każ ta' disritmiji, kwalunkwe grad ta' imblokk tal-qalb jew twessiegh tal-QRS.

Filwaqt li l-prevenzjoni ta' assorbiment f'każ ta' doża eċċessiva ma kinitx investigata, lavaġġ gastriku jista' jkun indikat f'każijiet ta' avvelenament sever u jekk possibbli għandu jsir fi żmien siegħa minn meta jkun ittiehed. Għandu jiġi kkunsidrat l-ġhoti ta' faħam attivati.

F'każijiet ta' doża eċċessiva bi quetiapine, pressjoni baxxa refrattorja għandha tiġi ttrattata b'miżuri xierqa bħal fluwidi ġol-vina u/jew aġenti simpatomimetici. Epinephrine u dopamine għandhom jiġu evitati, peress li f'sitwazzjoni ta' imblokk alpha minhabba quetiapine stimolazzjoni beta tista' taggrava l-pressjoni baxxa.

Supervizjoni u monitoraġġ mediku mill-qrib għandhom jittkomplew sakemm il-pazjent jirkupra.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antipsikotiċi, Diażepini, oxazepini u tijazepini
Kodiċi ATC: N05A H04

Mekkaniżmu ta' azzjoni:

Quetiapine huwa aġent antipsikotiku atipiku. Quetiapine u l-metabolit attiv fil-plasma umana, norquetiapine jinteraġixxu ma' firxa wiesgħa ta' riċetturi newrotrasmettitori. Quetiapine u norquetiapine juru affinità għal serotonin fil-moħħ (5HT₂) u għar-riċetturi-D₁ u -D₂ ta' dopamine. Din il-kombinazzjoni ta' antagoniżmu għar-riċetturi b'selettività oghla għal 5HT₂ relattiv għal riċetturi-D₂, hija maħsuba li tikkontribwixxi għall-karatteristiċi kliniċi antipsikotiċi u l-effett ekstrapiramidali sekondarju (EPS) baxx ta' Seroquel meta mqabbel ma' antipsikotiċi tipiċi. Quetiapine u norquetiapine m'għandhom l-ebda affinità apprezzabbli fir-riċetturi ta' benzodiazepine iżda affinità għolja fir-riċetturi istaminiġi u adrenerġiċi alpha₁, affinità moderata fir-riċetturi adrenerġiċi alpha₂ u affinità minn moderata għal għolja f'diversi riċetturi muskariniċi. L-inibizzjoni ta' NET u l-azzjoni agonista parzjali f'siti ta' 5HT_{1A} minn norquetiapine jistgħu jikkontribwixxu għall-effikaċja terapewtika ta' Seroquel XR bħala antidipressant.

Effetti farmakodinamiċi:

Quetiapine huwa attiv f'testijiet ta' attività antipsikotika, bħal evitazzjoni kondizzjonata. Jimblokka wkoll l-azzjoni ta' agonisti ta' dopamine, imkejla jew bl-imġieba jew b'mod elettrofizjoloġiku, u jżid il-konċentrazzjonijiet tal-metabolit ta' dopamine, indiċi newrokimiku tal-imblukkar tar-riċettur -D₂.

F'testijiet ta' qabel l-użu kliniku li jwassru l-EPS, quetiapine mhuwiex bhall-antipsikotiċi tipiċi u għandu profil atipiku. Wara li jingħata b'mod kroniku quetiapine ma jikkawżax supersensittività tar-riċettur-D2 ta' dopamine. Quetiapine jikkawża biss katalessi dghajfa f'dożi li huma effettivi biex jimblokkaw ir-riċetturi-D2 ta' dopamine. Wara li jingħata b'mod kroniku quetiapine juri selettività għas-sistema limbika billi jikkawża imblukkar tad-dipolarizzazzjoni tan-newroni mesolimbici li fihom dopamine iżda mhux dawk nigrostrijatali. Wara li jingħata b'mod akut jew kroniku quetiapine juri lijabilità distonika mimima f'xadini Cebus li jkunu ġew sensitizzati b'haloperidol jew li qatt ma kienu hađu l-medicina. (Ara Sezzjoni 4.8)

Effikaċja klinika:

Skizofrenija

L-effikaċja ta' Seroquel XR għall-kura ta' skizofrenija intweriet fi prova waħda ta' 6-ġimghat ikkontrollata bi placebo f'pazjenti li ssodisfaw il-kriterji tad-DSM-IV għal skizofrenija, u studju wieħed attivament ikkontrollat ta' qlib minn Seroquel li jerhi l-medicina f'daqqa għal Seroquel XR fuq pazjenti *outpatients* bi skizofrenija klinikament stabbli.

L-eżitu varjabbli ewlieni fil-prova kkontrollata bi placebo kien il-bidla fil-punteġġ totali fuq PANSS mil-linja bażi għall-valutazzjoni finali. Seroquel XR 400 mg/kuljum, 600 mg/kuljum u 800 mg/kuljum kienu assoċjati ma' titjib statistikament sinifikanti fis-sintomi psikotiċi meta mqabbla ma' placebo. Id-daqs tal-effett tad-dożi ta' 600 mg u ta' 800 mg kien akbar minn dak tad-doża ta' 400 mg.

Fl-istudju fuq 6 ġimghat attivament ikkontrollat dwar il-qlib l-eżitu varjabbli ewlieni kien il-proporzjon ta' pazjenti li wrew nuqqas ta' effikaċja, jiġifieri li waqqfu l-kura waqt l-istudju minhabba nuqqas ta' effikaċja jew li l-punteġġ totali tagħhom fuq PANSS kien żdied b'20% jew aktar mill-mument li ġew randomizzati għal kwalunkwe żjara. F'pazjenti stabilizzati fuq Seroquel li jerhi l-medicina f'daqqa ta' 400 mg sa 800 mg, l-effikaċja nżammet meta l-pazjenti nqalbu għal doża ekwivalenti ta' kuljum ta' Seroquel XR mogħti darba kuljum .

Fi studju fit-tul f'pazjenti skizofreniċi stabbli li kienu nżammu fuq Seroquel XR għal 16-il ġimgha, Seroquel XR kien aktar effettiv mill-placebo fil-prevenzjoni ta' rikaduta. Ir-riskji stmati ta' rikaduta wara 6 xhur ta' kura kienu ta' 14.3% għall-grupp ta' kura b'Seroquel XR meta mqabbla ma' 68.2% għall-placebo. Id-doża medja kienet ta' 669 mg. Ma kien hemm l-ebda sejbiet addizzjonali dwar is-sigurtà assoċjati mal-kura b'Seroquel XR sa 9 xhur (medja ta' 7 xhur). B'mod partikolari, ir-rapporti ta' avvenimenti avversi relatati ma' EPS u zieda fil-piż ma' zieded b'kura fit-tul b'Seroquel XR .

Disturb bipolari

Fil-kura ta' episodji manijaċi moderati għal severi, Seroquel wera effikaċja superjuri għal placebo fit-tnaqqis tas-sintomi manijaċi fil-ġimghat 3 u 12, f'żewġ provi b'monoterapija. L-effikaċja ta' Seroquel XR intweriet aktar b'mod sinifikanti kontra l-placebo fi studju addizzjonali ta' 3 ġimghat. Seroquel XR ingħata f'doża fil-medda ta' bejn 400 mg sa 800 mg/kuljum u d-doża medja kienet ta' madwar 600 mg/kuljum. Dejta dwar Seroquel f'kombinazzjoni ma' divalproex jew lithium f'episodji manijaċi akuti moderati għal severi f'ġimghat 3 u 6 hija limitata; iżda, terapija kkombinata kienet tollerata sew. Id-dejta uriet effett addittiv f'ġimgha 3. It-tieni studju ma weriex effett addittiv f'ġimgha 6 .

Fi prova klinika, f'pazjenti b'episodji depressivi f'disturb bipolari I jew bipolari II, 300 mg/kuljum ta' Seroquel XR wera effikaċja superjuri għall-placebo fit-tnaqqis tal-punteġġ totali fuq MADRS .

F'4 provi kliniċi addizzjonali bi quetiapine, li damu għaddejnin 8 ġimghat f'pazjenti b'episodji depressivi minn moderati għal severi f'disturb bipolari I jew bipolari II, Seroquel IR 300 mg u 600 mg kien superjuri b'mod sinifikanti għal pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi placebo għall-miżuri rilevanti tal-eżitu: titjib medju fuq il-MADRS u għal rispons definit bħala titjib ta' mill-inqas 50% fil-punteġġ totali fuq MADRS mil-linja bażi. Ma kienx hemm differenza fid-daqs tal-effett bejn il-pazjenti li rċewew 300 mg ta' Seroquel IR u dawk li rċewew doża ta' 600 mg.

Fil-faži ta' kontinwazzjoni fi tnejn minn dawn l-istudji, intwera li l-kura fit-tul, tal-pazjenti li rrispondew fuq Seroquel XR 300 mg jew 600 mg, kienet effikaċi meta mqabbla mal-kura bi placebo fir-rigward ta' sintomi depressivi, iżda mhux fir-rigward ta' sintomi manijaċi .

F'żewġ studji għall-prevenzjoni ta' rikorrenza li vvalutaw quetiapine f'kombinazzjoni ma' stabilizzaturi tal-burdata, f'pazjenti b'episodji manijaċi, depressivi jew burdati imħallta, il-kombinazzjoni ma' quetiapine kienet superjuri għal monoterapija bi stabilizzaturi tal-burdata biex itawlu ż-żmien għal rikorrenza ta' kwalunkwe każ relatat mal-burdata (manijaku, imħallat jew depressiv). Quetiapine ingħata darbtejn kuljum b'total ta' 400 mg sa 800 mg kuljum bhala terapija kkombinata ma' lithium jew valproate .

Fi studju randomizzat fuq 6-gimghat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra placebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta, id-differenza fit-titjib medju fuq YMRS bejn il-grupp li kellu lithium miżjud u l-grupp li kellu placebo miżjud kienet ta' 2.8 punti u d-differenza fil-% ta' dawk li rrispondew (definita bhala titjib ta' 50% mil-linja bazi fuq il-YMRS) kienet ta' 11% (79% fil-grupp li kellu lithium miżjud kontra 68% fil-grupp li kellu placebo miżjud).

Fi studju wiehed fit-tul (kura sa sentejn) li vvaluta l-prevenzjoni ta' rikaduta f'pazjenti b'episodji manijaċi, depressivi jew burdati imħallta quetiapine kien superjuri fuq placebo biex itawwal iż-żmien għal rikaduta ta' kwalunkwe avveniment relatat mal-burdata (manijaku, imħallat jew depressiv), f'pazjenti b'disturb bipolari I. L-ghadd ta' pazjenti li kellhom avveniment relatat mal-burdata kien ta' 91 (22.5%) fil-grupp fuq quetiapine, ta' 208 (51.5%) fil-grupp fuq placebo u ta' 95 (26.1%) fil-grupp ta' kura b'lithium rispettivament. F'pazjenti li rrispondew għal quetiapine, meta l-kura kontinwa bi quetiapine giet imqabbla mal-qalba għal lithium, ir-rizultati indikaw li l-bidla għal kura b'lithium ma tidhirx li hija assoċjata ma' żieda fiż-żmien għal rikorrenza ta' avveniment relatat mal-burdata.

Episodji depressivi maġġuri f'MDD

F'żewġ studji fuq żmien qasir (6 gimghat) hadu sehem pazjenti li ma kienux urew rispons adegwat għal mill-anqas antidepressiv wiehed. Seroquel XR 150 mg u 300 mg/kuljum, mogħti bhala kura miżjuda ma' terapija kontinwa b'antidepressant (amitriptyline, bupropion, citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline jew venlafaxine) wera superjorita fuq terapija antidepressiva wehida fit-tnaqqis tas-sintomi depressivi imkejje b'titjib fil-punteġġ totali fuq MADRS (bidla medja fl-LS kontra placebo ta' 2-3.3 punti).

L-effikaċja u s-sigurtà fit-tul fuq pazjenti b' MDD ma ġewx ivvalutati bhala terapija miżjuda, iżda l-effikaċja u s-sigurtà fit-tul kienu vvalutati bhala monoterapija fuq pazjenti adulti (ara hawn taht).

L-istudji li ġejjin saru b'Seroquel XR bhala kura ta' monoterapija, madanakollu Seroquel XR huwa indikat biss għall-użu bhala terapija miżjuda:

Fi tlieta minn erba' studji fuq żmien qasir (sa 8 gimghat) b'monoterapija, f'pazjenti b'disturb depressiv maġġuri, Seroquel XR 50 mg, 150 mg u 300 mg/kuljum wera effikaċja superjuri għall-placebo fit-tnaqqis tas-sintomi depressivi kif imkejje b'titjib fil-punteġġ totali fuq il-Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (bidla medja fl-LS kontra placebo ta' 2-4 punti).

Fi studju ta' prevenzjoni ta' rikaduta b'monoterapija, pazjenti b'episodji depressivi stabilizzati fuq kura b'tikketa miftuħa b'Seroquel XR għal mill-inqas 12-il gimgha kienu randomizzati għal Seroquel XR darba kuljum jew għal placebo sa 52 gimgha. Waqt il-faži randomizzata d-doża medja ta' Seroquel XR kienet ta' 177 mg/kuljum. L-inċidenza ta' rikaduta kienet ta' 14.2% għall-pazjenti li kienu qed jirċievu kura b'Seroquel XR u ta' 34.4% għall-pazjenti li kienu qed jirċievu kura bi placebo.

Fi studju fuq żmien qasir (9 gimghat) ta' pazjenti anzjani li ma kienux qed ibatu minn dimenzja (età minn 66 sa 89 sena) b'disturb depressiv maġġuri, Seroquel XR li ngħata f'dozi flessibbli fil-medda ta'

50 mg sa 300 mg/kuljum wera effikaċja superjuri għall-plaċebo fit-tnaqqis ta' sintomi depressivi kif imkejje minn titjib fil-punteġġ totali fuq MADRS (bidla medja fl-LS kontra plaċebo ta' -7.54). F'dan l-istudju l-pazjenti li kienu randomizzati għal Seroquel XR irċewew 50 mg/kuljum fil-Jiem 1-3, id-doża setgħet tiżdied għal 100 mg/kuljum fil-Jum 4, 150 mg/kuljum fil-Jum 8 u sa 300 mg/kuljum skont ir-rispons kliniku u t-tollerabilità. Id-doża medja ta' Seroquel XR kienet ta' 160 mg/kuljum. Minbarra l-inċidenza ta' sintomi ekstrapiramidali (ara sezzjoni 4.8 u 'Sigurtà Klinika' hawn taht) it-tollerabilità ta' Seroquel XR darba kuljum f'pazjenti anzjani kienet komparabbli għal dik li dehret fl-adulti (età minn 18-65 sena). Il-proporzjon ta' pazjenti randomizzati li kellhom aktar minn 75 sena kien ta' 19%.

Sigurtà klinika

Fi provi kliniċi fuq żmien qasir, ikkontrollati bi plaċebo fi skizofrenija u manija bipolari l-inċidenza aggregata tas-sintomi ekstrapiramidali kienet simili għall-plaċebo (skizofrenija: 7.8% għal quetiapine u 8.0% għal plaċebo; manija bipolari: 11.2% għal quetiapine u 11.4% għal plaċebo). Rati aktar għolja ta' sintomi ekstrapiramidali dehru f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine meta mqabbla ma' dawki li ngħataw kura bi plaċebo fi provi kliniċi fuq żmien qasir u kkontrollati bi plaċebo f'MDD u dipressjoni bipolari. Fi provi fuq żmien qasir u kkontrollati bi plaċebo ta' dipressjoni bipolari l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 8.9% għal quetiapine meta mqabbla ma' 3.8% għal plaċebo. Fi provi kliniċi fuq żmien qasir b'monoterapija u kkontrollati bi plaċebo f'disturb depressiv maġġuri l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 5.4% għal Seroquel XR u ta' 3.2% għal plaċebo. Fi prova fuq żmien qasir b'monoterapija u kkontrollata bi plaċebo f'pazjenti anzjani b'disturb depressiv maġġuri, l-inċidenza aggregata ta' sintomi ekstrapiramidali kienet ta' 9.0% għal Seroquel XR u ta' 2.3% għal plaċebo. Kemm f'dipressjoni bipolari kif ukoll f'MDD, l-inċidenza tal-avvenimenti avversi individwali (eż akatizja, disturb ekstrapiramidali, roġħda, diskinesija, distonja, irrikwjetezza, kontrazzjonijiet involontari tal-muskoli, iperattività psikomotorili u riġidità muscolari) ma qabżitx l-4% f'ebda grupp ta' kura.

Fi studji fuq żmien qasir, b'doża fissa (50mg/d sa 800 mg/d), ikkontrollati bi plaċebo (bejn 3 sa 8 ġimgħat), iż-żieda medja fil-piż għal pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine kienet tvarja minn 0.8 kg għad-doża ta' kuljum ta' 50 mg sa 1.4 kg għad-doża ta' kuljum ta' 600 mg (b'żieda anqas għad-doża ta' kuljum ta' 800 mg), meta mqabbla ma' 0.2 kg għall-pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo. Il-persentaġġ ta' pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine li żiedu $\geq 7\%$ tal-piż tal-ġisem kien ivarja minn 5.3% għad-doża ta' kuljum ta' 50 mg sa 15.5% għad-doża ta' kuljum ta' 400 mg (b'żieda anqas għad-doži ta' kuljum ta' 600 u 800 mg), meta mqabbla ma' 3.7% għall-pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo.

Studju randomizzat ta' 6-ġimgħat ta' lithium u SEROQUEL XR kontra plaċebo u SEROQUEL XR f'pazjenti adulti b'manija akuta indika li l-kombinazzjoni ta' SEROQUEL XR ma' lithium twassal għal aktar avvenimenti avversi (63% kontra 48% f'SEROQUEL XR f'kombinazzjoni ma' plaċebo). Ir-riżultati dwar is-sigurtà urew inċidenza oghla ta' sintomi ekstrapiramidali rrapportati f'16.8% tal-pazjenti fil-grupp li kellhom lithium miżjud u 6.6% fil-grupp li kellhom plaċebo miżjud, li l-maġġoranza tagħhom kienu jikkonsistu minn roġħda, irrapportata f'15.6% tal-pazjenti li kellhom lithium miżjud u 4.9% fil-grupp li kellhom plaċebo miżjud. L-inċidenza ta' ngħas kienet oghla fil-grupp ta' SEROQUEL XR li kellhom lithium miżjud (12.7%) meta mqabbla mal-grupp ta' SEROQUEL XR li kellhom plaċebo miżjud (5.5%). Barra minn hekk, kien hemm persentaġġ oghla ta' pazjenti li kienu qed jirċievu kura fil-grupp li kellu lithium miżjud (8.0%) li kellhom żieda fil-piż (≥ 7) fl-aħħar tal-kura meta mqabbla ma' pazjenti fil-grupp li kellhom plaċebo miżjud (4.7%).

Provi itwal ta' prevenzjoni ta' rikaduta kellhom perjodu b'tikketta miftuħa (li jvarja minn 4 sa 36 ġimgħa) li matulu l-pazjenti ngħataw kura bi quetiapine, segwit minn perjodu randomizzat ta' irtirar li matulu l-pazjenti kienu randomizzati għal quetiapine jew għal plaċebo. Għall-pazjenti li kienu randomizzati għal quetiapine, iż-żieda medja fil-piż matul il-perjodu b'tikketta miftuħa kienet ta' 2.56 kg, u sal-ġimgħa 48 tal-perjodu randomizzat, iż-żieda medja fil-piż kienet ta' 3.22 kg, meta mqabbla mal-linja bażi b'tikketta miftuħa. Għall-pazjenti li kienu randomizzati għal plaċebo, iż-żieda medja fil-piż matul il-perjodu b'tikketta miftuħa kienet ta' 2.39 kg, u sal-ġimgħa 48 tal-perjodu randomizzat, iż-żieda medja fil-piż kienet ta' 0.89 kg, meta mqabbla mal-linja bażi b'tikketta miftuħa.

Fi studji kontrollati bi placebo f'pazjenti anzjani bi psikozi relatata mad-dimenzja, l-inċidenza ta' avvenimenti ċerebrovaskulari avversi għal kull 100 sena pazjent ma kienetx oghla fil-pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine milli f'pazjenti li ngħataw kura bi placebo .

Fil-provi kollha fuq żmien qasir b' monoterapija u kkontrollati bi placebo f'pazjenti b' għadd tan-newtrofili fil-linja bażi ta' $\geq 1.5 \times 10^9/L$, l-inċidenza ta' mill-inqas okkorrenza wahda ta' bidla fl-għadd tan-newtrofili ta' $< 1.5 \times 10^9/L$, kienet ta' 1.9% f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine meta mqabbla ma' 1.5% f'pazjenti li ngħataw kura bi placebo. L-inċidenza ta' tibdil għal $> 0.5 - < 1.0 \times 10^9/L$ kienet l-istess (0.2%) f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine bħal fil-pazjenti li ngħataw kura bi placebo. Fil-provi kliniċi kollha (ikkontrollati bi placebo, b'tikketta miftuħa, b'komparatur attiv) f'pazjenti b' għadd tan-newtrofili fil-linja bażi ta' $\geq 1.5 \times 10^9/L$, l-inċidenza ta' mill-inqas okkorrenza wahda ta' bidla fl-għadd tan-newtrofili għal $< 1.5 \times 10^9/L$ kienet ta' 2.9% u għal $< 0.5 \times 10^9/L$ kienet ta' 0.21% f'pazjenti li ngħataw kura bi quetiapine .

Kura bi quetiapine kien assoċjata ma' tnaqqis fil-livelli ta' ormoni tat-tirojde relatati mad-doża. L-inċidenzi ta' tibdil fit-TSH kienet ta' 3.2 % għal quetiapine kontra 2.7 % għal placebo. L-inċidenza ta' tibdil reċiproku, potenzjalment klinikament sinifikanti kemm fit-T3 jew it-T4 u t-TSH f'dawn il-provi kienet rari, u l-bidliet osservati fil-livelli ta' ormoni tat-tirojde ma kienux assoċjati ma' ipotiroidizmu klinikament sintomatiku. It-tnaqqis fit-T₄ totali u hieles kien l-ogħla fl-ewwel sitt ġimgħat ta' kura bi quetiapine, bl-ebda tnaqqis ulterjuri matul kura fit-tul. Għal madwar 2/3 tal-kazijiet kollha, il-waqfien tal-kura bi quetiapine kien assoċjat ma' treġġigh lura tal-effetti fuq it-T4 totali u hieles, irrISPettivament mit-tul tal-kura.

Katarretti/opacitajiet tal-lenti

Fi prova klinika biex jiġi vvalutat il-potenzjal katarrettoġeniku ta' Seroquel (200-800 mg/kuljum) kontra risperidone (2-8 mg/kuljum) f'pazjenti bi skizofrenija jew disturb skizoaffettiv, il-persentaġġ ta' pazjenti b'żieda fil-grad tal-opacità tal-lenti ma kienx oghla f'Seroquel (4%) meta mqabbla ma' risperidone (10%), għal pazjenti li kellhom espożizzjoni ta' anqas minn 21 xahar.

Popolazzjoni pedjatrika

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Seroquel kienu studjati fi studju ta' 3-ġimgħat ikkontrollat bi placebo għall-kura ta' manija (n= 284 pazjent mill-Istati Uniti, età minn 10-17). Madwar 45% tal-popolazzjoni tal-pazjenti kellhom dijanjosi addizzjonali ta' ADHD. Barra minn hekk, sar studju ta' 6 ġimgħat ikkontrollat bi placebo għall-kura ta' skizofrenija (n=222 pazjent, età minn 13-17). Fiż-żewġ studji, il-pazjenti li kienu magħrufa li ma jirripondux għal Seroquel kienu esklużi. Il-kura b'Seroquel bdiet b'50 mg/kuljum u f'jum 2 żdiedet għal 100 mg/kuljum; sussegwentement id-doża giet titrata għad-doża fil-mira (manija 400-600 mg/kuljum; skizofrenija 400-800 mg/kuljum) permezz ta' inkrementi ta' 100 mg/kuljum li ngħataw darbtejn jew tliet darbiet kuljum.

Fl-istudju fuq manija, id-differenza fil-bidla medja fl-LS mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq YMRS (attiv li minnu tnaqqas il-placebo) kienet ta' -5.21 għal Seroquel 400 mg/kuljum u ta' -6.56 għal Seroquel 600 mg/kuljum. Ir-rati ta' dawk li rrispondew (titjib fuq YMRS $\geq 50\%$) kienu ta' 64% għal Seroquel 400 mg/kuljum, ta' 58% għal 600 mg/kuljum u ta' 37% fil-fergħa tal-placebo .

Fl-istudju fuq skizofrenija, id-differenza fil-bidla medja fl-LS mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq PANSS (attiv li minnu tnaqqas il-placebo) kienet ta' -8.16 għal Seroquel 400 mg/kuljum u ta' -9.29 għal Seroquel 800 mg/kuljum. La r-reġimen bid-doża l-baxxa (400 mg/kuljum) u l-anqas dak bid-doża l-gholja (800 mg/kuljum) ta' quetiapine ma' kien superjuri għal placebo fir-rigward tal-persentaġġ ta' pazjenti li kisbu rispons, definit bħala tnaqqis ta' $\geq 30\%$ mil-linja bażi fil-punteġġ totali fuq PANSS. Kemm f'manija kif ukoll f'skizofrenija dozi oghla wasslu għal rati ta' rispons numerikament aktar baxxi.

F'tielet prova fuq zmien qasir ikkontrollata bi placebo b' monoterapija b' Seroquel XR f' pazjenti tfal u adolexxenti (10-17 sena) b' dipressjoni bipolari, l-effikaċja ma ntwerietx.

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli dwar iż-żamma tal-effett jew il-prevenzjoni ta' rikorrenza f' dan il-grupp ta' etajiet.

Sigurtà klinika

Fil-provi pedjatriċi fuq zmien qasir bi quetiapine deskritti hawn fuq, ir-rati ta' EPS fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 12.9% kontra 5.3% fil-prova ta' skizofrenija, 3.6% kontra 1.1% fil-prova ta' manija bipolari, u ta' 1.1% kontra 0% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Ir-rati taż-żieda fil-piż ta' $\geq 7\%$ tal-piż tal-ġisem fil-linja bażi fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 17% kontra 2.5% fil-provi ta' skizofrenija u ta' manija bipolari, u ta' 12.5% kontra 6% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Ir-rati ta' avvenimenti relatati mas-suwiċidju fil-fergħa attiva kontra placebo kienu ta' 1.4% kontra 1.3% fil-prova ta' skizofrenija, 1.0% kontra 0% fil-prova ta' manija bipolari, u ta' 1.1% kontra 0% fil-prova ta' dipressjoni bipolari. Matul fażi estiżi ta' segwitu wara l-kura tal-prova ta' dipressjoni bipolari, kien hemm żewġ avvenimenti addizzjonali relatati mas-suwiċidju f' żewġ pazjenti; wiehed minn dawn il-pazjenti kien fuq quetiapine meta ġara l-avveniment.

Sigurtà fit-tul

Estensjoni b'tikketta miftuha ta' 26-ġimgha għall-provi akuti (n=380 pazjent), b' Seroquel mgħoti b' mod flessibbli f' 400-800 mg/kuljum, ipprovdiet dejta addizzjonali dwar is-sigurtà. Żidiet fil-piż tad-demmi kienu rrapportati fi tfal u adolexxenti u żieda fl-apetit, sintomi ekstrapiramidali u żidiet fil-prolaktin fis-serum kienu rrapportati bi frekwenza oġġla fit-tfal u l-adolexxenti milli f' pazjenti adulti (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8). Fir-rigward taż-żieda fil-piż, meta aġġustat għal tkabbir normali fuq perijodu itwal, żieda ta' mill-inqas devjazzjoni standard ta' 0.5 mil-linja bażi fl-Indiċi tal-Massa tal-Ġisem (BMI) intużat bħala miżura ta' bidla klinikament sinifikanti; 18.3% tal-pazjenti li kienu ilhom mill-inqas 26 ġimgha fuq kura bi quetiapine issodisfaw dan il-kriterju.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment:

Quetiapine jiġi assorbit sew wara li jingħata mill-ħalq. Seroquel XR jilħaq l-oġġla konċentrazzjonijiet ta' quetiapine u norquetiapine fil-plasma madwar 6 sigħat wara li jingħata (T_{max}). Il-konċentrazzjonijiet molari massimi fi stat fiss tal-metabolit attiv norquetiapine huma ta' 35% ta' dak osservat għal quetiapine .

Il-farmakokinetika ta' quetiapine u norquetiapine huma lineari u proporzjonali mad-doża għal dozi sa 800 mg mogħtija darba kuljum. Meta Seroquel XR mogħti darba kuljum jiġi mqabbel mal-istess doża totali ta' kuljum ta' quetiapine fumarate b' rilaxx f' daqqa (Seroquel b' rilaxx f' daqqa) mogħti darbtejn kuljum, l-erja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plasma mal-hin (AUC) hija ekwivalenti, iżda l-konċentrazzjoni massima fil-plasma (C_{max}) hija ta' 13% aktar baxxa fi stat fiss. Meta Seroquel XR jiġi mqabbel ma' Seroquel b' rilaxx f' daqqa, l-AUC tal-metabolit norquetiapine huwa ta' 18% aktar baxx . Fi studju li eżamina l-effetti tal-ikel fuq il-bijodisponibilità ta' quetiapine, instab li ikla b' kontenut għoli ta' xaham tikkawża żidiet statistikament sinifikanti fis-C_{max} u l-AUC ta' Seroquel XR ta' madwar 50% u 20% rispettivament. Ma jistax jiġi eskluż li l-effett ta' ikla b' kontenut għoli ta' xaham fuq il-formulazzjoni jista' jkun akbar. Għall-kuntrarju, ikla ħafifa ma kelliex effett statistikament sinifikanti fuq is-C_{max} jew l-AUC ta' quetiapine. Huwa rakkomandat li Seroquel XR jittiehed darba kuljum mingħajr ikel.

Distribuzzjoni:

Quetiapine jintrabat madwar 83% mal-proteini tal-plasma.

Bijotrasformazzjoni:

Quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied, bil-kompost oriġinali jammonta għal anqas minn 5% tal-materjal mhux mibdul relatat mal-medicina fl-awrina jew fl-ippurgar, wara l-ghoti ta' quetiapine radjutikkettat.

Investigazzjonijiet *in vitro* stabbilixxew li CYP3A4 huwa l-enzim ewlieni reponsabbli għall-metabolizmu ta' quetiapine medjat miċ-ċitokromju P450. Norquetiapine jiġi primarjament iffurmat u eliminat permezz ta' CYP3A4.

Quetiapine u hafna mill-metaboliti tiegħu (inkluż norquetiapine) instabu li huma inibituri dgħajfa tal-attivitajiet taċ-ċitokromju uman P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 u 3A4 *in vitro*. Inibizzjoni *in vitro* ta' CYP hija osservata biss f'konċentrazzjonijiet ta' madwar 5 għal 50 darba oghla minn dawk osservati fil-medda ta' doża ta' 300 sa 800 mg/kuljum fil-bnedmin. Abbażi ta' dawn ir-riżultati *in vitro*, mhuwiex probabbli li l-ghoti ta' quetiapine flimkien ma' medicini oħra se jwassal għal inibizzjoni klinikament sinifikanti tal-medicina tal-metabolizmu tal-medicina l-oħra medjat miċ-ċitokromju P450. Minn studji fuq l-annimali jidher li quetiapine jista' jinduċi enzimi taċ-ċitokromju P450. Fi studju speċifiku dwar l-interazzjoni f'pazjenti psikotiċi, madankollu, ma nstabat l-ebda zieda fl-attività taċ-ċitokromju P450 wara l-ghoti ta' quetiapine.

Eliminazzjoni:

Il-half lives tal-eliminazzjoni ta' quetiapine u norquetiapine huma ta' madwar 7 u 12-il siegħa, rispettivament. Madwar 73% ta' medicina radjutikkettata ġiet eliminata fl-awrina u 21% fl-ippurgar b'anqas minn 5% tar-radjuattività totali tirrapreżenta materjal mhux mibdul relatat mal-medicina. Il-frazzjoni medja tad-doża molar ta' quetiapine hieles u l-metabolit attiv fil-plasma umana norquetiapine jiġi eliminat <5% fl-awrina.

Popolazzjonijiet speċjali

Sess:

Il-farmakokinetika ta' quetiapine ma tvarjax bejn l-irġiel u n-nisa.

Anzjani:

It-tnehhija medja ta' quetiapine fl-anzjani hija ta' madwar 30 sa 50% aktar baxxa minn dik li dehret f'adulti bejn it-18 u l-65 sena.

Indeboliment tal-kliwi:

It-tnehhija medja ta' quetiapine mill-plasma tnaqqset b'madwar 25% f'individwi b'indeboliment sever tal-kliwi (tnehhija tal-kreatinina ta' anqas minn 30 ml/min/1.73 m²), iżda l-valuri individwali ta' tnehhija huma fil-medda ta' individwi normali.

Indeboliment tal-fwied:

It-tnehhija medja ta' quetiapine mill-plasma tonqos b'madwar 25% f'persuni b'indeboliment epatiku magħruf (b'cirrozi alkoħolika stabbli). Peress li quetiapine jiġi metabolizzat b'mod estensiv mill-fwied, huwa mistenni li fil-popolazzjoni b'indeboliment tal-fwied il-livelli fil-plasma ikunu oghla. F'dawn il-pazjenti jista' jkun hemm il-htieġa ta' aġġustamenti tad-doża (ara sezzjoni 4.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta farmakokinetika ittiehdet bħala kampjun f'9 itfal bejn l-10-12-il sena u 12-il adolexxenti, li kienu fuq kura fi stat fiss b'400 mg ta' quetiapine (Seroquel) darbtejn kuljum. Fi stat fiss, il-livelli tad-doża normalizzata fil-plasma tal-kompost oriġinali, quetiapine, fi tfal u adolexxenti (10-17-il sena) kienu ġeneralment simili għal dawk fl-adulti, għalkemm fit-tfal is-C_{max} kien fil-parti għolja tal-medda li kienet osservata fl-adulti. L-AUC u s-C_{max} tal-metabolit attiv, norquetiapine, kienu oghla, ta' madwar 62% u 49% fit-tfal (10-12-il sena), rispettivament u ta' 28% u 14% fl-adolexxenti (13-17-il sena), rispettivament meta mqabbla mal-adulti.

M'hemmx tagħrif disponibbli għal Seroquel XR fi tfal u adolexxenti.

5.3 Taghrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

F'serje ta' studji *in vitro* u *in vivo* dwar il-ġenotossicità ma kien hemm l-ebda evidenza ta' ġenotossicità. F'annimali tal-laboratorju f'livell ta' espożizzjoni klinikament rilevanti dehru d-devjazzjonijiet li ġejjin, li għadhom ma ġewx ikkonfermati minn riċerka klinika fit-tul: Fil-firien, kienet osservata depożizzjoni tal-pigment fil-glandola tat-tirojde; f'xadini cynomolgus ipertrofija taċ-ċelluli follikulari tat-tirojde, tnaqqis fil-livelli tat-T₃ fil-plasma, tnaqqis fil-koncentrazzjoni tal-emoglobina u tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli ħomor u bojod tad-demm; u fil-klieb opaċità tal-lenti u katarretti. (Għal katarretti/opaċitajiet tal-lenti ara sezzjoni 5.1).

Fi studju ta' tossicità embrijofetali fil-fniek kien hemm żieda fl-inċidenza ta' tagħwiġ karpali/tat-tarsu fil-fetu. Dan l-effett sehh fil-preżenza ta' effetti materni evidenti bħal żieda anqas fil-piż tal-ġisem. Dawn l-effetti kienu evidenti f'livelli ta' espożizzjoni materna simili jew kemmxejn oghla minn dawk fil-bnedmin bid-doża massima terapewtika. Ir-rilevanza ta' din is-sejba għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-fertilità fil-firien, deher tnaqqis marginali fil-fertilità maskili u psewdo tqala, perjodi mtawla ta' diestrus, żieda fl-intervall ta' qabel il-kopulazzjoni u tnaqqis fir-rata ta' tqaliet. Dawn l-effetti huma relatati ma' livelli elevati ta' prolactin u mhumix direttament rilevanti għall-bniedem minhabba differenzi fil-kontroll ormonali tar-riproduzzjoni bejn l-ispeċi.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba

Cellulose, microcrystalline

Sodium citrate

Lactose monohydrate

Magnesium stearate

Hypromellose 2208

Kisja

Hypromellose 2910

Macrogol 400

Titanium dioxide (E171)

Iron oxide, yellow (E172) (pilloli ta' 50, 200 u 300 mg)

Iron oxide, red (E172) (pilloli ta' 50 mg)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ma jehtiegħ xi kundizzjonijiet speċjali ta' kif jinħażen.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Polychlorotrifluoroethylene u polyvinylchloride b'folja tal-aluminju

Qawwa tal-Pillola	Kontenut tal-kartuna (pakkett)	Folji
Pilloli ta' 50 mg, 150 mg 200 mg, 300 mg u 400 mg	10 pilloli	Folja 1 ta' 10 pilloli
	30 pillola	3 folji ta' 10 pilloli
	50 pillola	10 folji ta' 5 pilloli
	50 pillola	5 folji ta' 10 pilloli
	60 pillola	6 folji ta' 10 pilloli
	100 pillola	10 folji ta' 10 pilloli
	100 pillola	100 folja ta' pillola 1

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

L-ebda htigijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 50 mg pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 50 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
30 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
50 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
60 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
100 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel XR 50 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 50 mg pilloli li jerġu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 150 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 150 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
30 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
50 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
60 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
100 pillola li jerhu l-medicina bil-mod

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jinghata b'riċetta ta' tabib.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel XR 150 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 150 mg pilloli li jerġu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 200 mg pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 200 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
30 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
50 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
60 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
100 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel XR 200 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 200 mg pilloli li jerġu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 300 mg pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 300 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli li jerhu l-mediċina bil-mod
30 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
50 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
60 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod
100 pillola li jerhu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel XR 300 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 300 mg pilloli li jerġu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GHALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 400 mg pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 400 mg ta' quetiapine (bħala fumarate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta' taghrif għal aktar informazzjoni.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

10 pilloli li jerhu l-medicina bil-mod
30 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
50 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
60 pillola li jerhu l-medicina bil-mod
100 pillola li jerhu l-medicina bil-mod

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ
--

[Biex timentela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Seroquel XR 400 mg

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seroquel XR 400 mg pilloli li jerġu l-medicina bil-mod
quetiapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

AstraZeneca

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Seroquel XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg pilloli li jerħu l-medicina bil-mod

quetiapine

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Zomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara Sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Seroquel XR u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Seroquel XR
3. Kif għandek tieħu Seroquel XR
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahzen Seroquel XR
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Seroquel XR u għalxiex jintuża

Seroquel XR fih sustanza msejha quetiapine. Din tagħmel parti minn grupp ta' medicini msejha anti-psikotiċi. Seroquel XR jista' jintuża għall-kura ta' diversi mard, bħal:

- Dipressjoni bipolari u episodji depressivi maġġuri f'disturb depressiv maġġuri: fejn thossok imdejjaq. Tista' ssib li thossok depress, thossok hati, b'nuqqas ta' enerġija, titlef l-aptit jew ma tkunx tista' torqod.
- Manija: fejn tista' thossok eċitat hafna, elat, agitat, entużjast jew iperattiv jew ikollok ġudizzju fqir inkluz li tkun aggressiv jew tkun ta' tfixkil.
- Skizofrenija: fejn tista' tisma u thoss affarijiet li m'humix hemm, temmen affarijiet li mhumix veri jew thossok suspettuż b'mod mhux tas-soltu, anzjuż, konfuż, hati, mimli tensjoni jew depress.

Meta Seroquel XR jkun qed jittiehed għall-kura ta' episodji depressivi maġġuri f'disturb depressiv maġġuri, għandu jittiehed flimkien ma' medicina oħra li tkun qed tintuża għall-kura ta' din il-marda.

It-tabib tiegħek jista' jkompli jippreskrivilek Seroquel XR anke meta thossok aħjar.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Seroquel XR

Tieħux Seroquel XR :

- Jekk inti allergiku (tbat minn sensitività eċċessiva) għal quetiapine jew għal xi sustanza oħra ta' Seroquel XR (ara sezzjoni 6: Informazzjoni oħra)
- Jekk qed tieħu xi waħda minn dawn il-medicini li ġejjin:
 - xi medicini għall-HIV
 - medicini azole (għall-infezzjonijiet fungali)
 - erythromycin jew clarithromycin (għall-infezzjonijiet)
 - nefazodone (għad-dipressjoni)

Tiehu Seroquel XR jekk dawn ta' hawn fuq japplikaw ghalik. Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Seroquel XR.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek qabel tiehu Seroquel XR jekk:

- Inti, jew xi hadd fil-familja tieghek, għandkom jew kellkom problemi tal-qalb, per eżempju problemi fir-ritmu tal-qalb, dgħjufija tal-muskolu tal-qalb jew infjammazzjoni tal-qalb jew jekk qed tiehu xi mediċini li jista' jkollhom impatt fuq kif thabbat qalbek.
- Għandek pressjoni baxxa tad-demm.
- Kellek puplesija, speċjalment jekk inti anzjan.
- Għandek problemi bil-fwied tieghek.
- Qatt kellek aċċessjoni.
- Għandek id-dijabete jew għandek riskju li taqbdet id-dijabete. Jekk hu hekk, it-tabib tieghek jista' jiċċekkja l-livelli taz-zokkor fid-demm tieghek waqt li tkun qed tiehu Seroquel XR.
- Taf li fil-passat kellek livelli baxxi ta' ċelloli tad-demm bojod (li jista' jkun li kienu jew ma kienux ikkawżati minn mediċini oħra).
- Inti persuna anzjana bid-dimenzja (telf tal-funzjoni tal-moħħ). Jekk iva, Seroquel XR m'għandux jittiehed minhabba li l-grupp ta' mediċini li għalih jappartjeni Seroquel XR jista' jżid ir-riskju ta' puplesija, jew f'xi każijiet ir-riskju ta' mewt, f'persuni anzjani bid-dimenzja.
- Inti jew xi hadd ieħor fil-familja tieghek għandkom storja ta' emboli tad-demm, peress li mediċini bħal dawn kienu assoċjati mal-formazzjoni ta' emboli tad-demm.

Għid lit-tabib tieghek minnufih jekk tesperjenza xi wahda minn dawn li ġejjin wara li tiehu Seroquel XR:

- Kombinazzjoni ta' deni, riġidità muskolari severa, johroġlok l-għaraq jew ikollok livell imnaqqas ta' koxjenza (disturb imsejjah "sindromu newrolettiku malinn"). Jista' jkollok bżonn kura medika immedjata.
- Movimenti inkontrollabbli, l-aktar ta' wiċċek jew ta' ilsienek.
- Sturdament jew sens qawwi ta' ngħas. Dan jista' jżid ir-riskju ta' korrimment aċċidentali (waqgħat) f'pazjenti anzjani.
- Aċċessjonijiet.
- Erezzjoni fit-tul u bl-uġiġħ (Prijiapiżmu).

Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jiġu kkawżati minn din it-tip ta' mediċina.

Għid lit-tabib tieghek mill-aktar fis possibbli jekk ikollok:

- Deni, sintomi bħal tal-influenza, uġiġħ fil-grizmejn, jew kwalunkwe infezzjoni oħra, peress li dan jista' jkun riżultat ta' għadd baxx hafna taċ-ċelluli tad-demm bojod, li jista' jehtieg li Seroquel XR jitwaqqaf u/jew li tingħata l-kura.
- Stitikezza flimkien ma' uġiġħ addominali persistenti, jew stitikezza li ma tkunx irrispondiet għall-kura, peress li dan jista' jwassal għal imblukkar aktar serju tal-musrana.

Hsibijiet suwiċidali u aggravar tad-dipressjoni tieghek

Jekk inti depress xi kultant jista' jkollok hsibijiet li twegġa jew toqtol lilek innifsek. Dawn jistgħu jiżdiedu meta tibda l-kura għall-ewwel darba, peress li dawn il-mediċini kollha jiehdu ż-żmien biex jahdmu, ġeneralment madwar ġimagħtejn iżda xi kultant aktar. Dawn il-hsibijiet jistgħu anke jiżdiedu jekk tieqaf tiehu l-mediċina tieghek f'daqqa. Tista' tkun aktar probabbli li taħseb hekk jekk inti zagħżuġ. Informazzjoni minn provi kliniċi uriet riskju akbar ta' hsibijiet suwiċidali u/jew imġieba suwiċidali fiż-zagħżagħ ta' anqas minn 25 sena b'dipressjoni.

Jekk għandek hsibijiet li twegġa jew toqtol lilek innifsek fi kwalunkwe hin, ikkuntattja lit-tabib tieghek jew mur l-isptar minnufih. Tista' issibha utli li tgħid lil xi qarib jew xi ħabib li inti depress, u

itlobhom jaqraw dan il-fuljett. Tista' titlobhom jghidulek jekk jahsbu li d-dipressjoni tieghek qed taggrava, jew jekk huma inkwetati dwar tibdil fl-imġieba tieghek.

Żieda fil-piż

Żieda fil-piż giet osservata f'pazjenti li jkunu qed jieħdu Seroquel XR. Inti u t-tabib tieghek għandkom tiċċekkjaw il-piż tieghek regolarment.

Tfal u Adolexxenti

Seroquel XR mhuwiex għall-użu fi tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena.

Mediċini ohra u Seroquel XR

Għid lit-tabib tieghek jekk qed tieħu jew dan l-aħħar haġt xi mediċina ohra.

Tieħux Seroquel XR jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

- Xi mediċini għall-HIV.
- Mediċini azole (għall-infezzjonijiet fungali).
- Erythromycin jew clarithromycin (għall-infezzjonijiet).
- Nefazodone (għad-dipressjoni).

Għid lit-tabib tieghek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

- Mediċini għall-epilessija (bħal phenytoin jew carbamazepine).
- Mediċini għall-pressjoni għolja tad-demm.
- Barbiturati (għal problemi tal-irqad).
- Thioridazine jew Lithium (mediċini anti-psikotiċi ohra).
- Mediċini li għandhom impatt fuq il-mod kif thabbat qalbek, per eżempju, mediċini li jistgħu jikkawżaw żbilanċ fl-elettroliti (livelli baxxi ta' potassju jew ta' manjesju) bħal diuretici (pilloli tal-ilma) jew ċerti antibijotiċi (mediċini għall-kura tal-infezzjonijiet).
- Mediċini li jistgħu jikkawżaw stitikezza.

Qabel ma tieqaf tieħu xi waħda mill-mediċini tieghek, jekk jogħġbok l-ewwel kellem lit-tabib tieghek.

Seroquel XR ma' ikel, xorb u alkohol

- Seroquel XR jista' jiġi affettwat mill-ikel u għalhekk għandek tieħu l-pilloli tieghek mill-anqas siegħa qabel ikla jew qabel ma torqod.
- Oqgħod attent kemm tixrob alkohol. Dan għaliex l-effett ikkombinat ta' Seroquel XR u l-alkohol jista' jġieghlek thossok bi ngras.
- Tixrobx meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tieħu Seroquel XR. Dan jista' jaffettwa l-mod kif taħdem il-mediċina.

Tqala u treddigh

Jekk inti tqila jew qed tredda, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tieghek qabel tieħu Seroquel XR. M'għandekx tieħu Seroquel XR waqt it-tqala sakemm dan ġie ma jkunx ġie diskuss mat-tabib tieghek. Seroquel XR m'għandux jittiehed jekk qed tredda.

Is-sintomi li ġejjin li jistgħu jirrappreżentaw sintomi ta' irtirar jistgħu jseħhu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li użaw Seroquel fl-aħħar trimestru (l-aħħar tliet xhur tat-tqala tagħhom): roġhda, riġidità u/jew dgħjufija muskolari, ngras, aġitazzjoni, problemi fit-tehid tan-nifs, u diffikultà fit-tmim. Jekk it-tarbija tieghek tiżviluppa xi sintomi minn dawn jista' jkollok bżonn tikkuntattja lit-tabib tieghek.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-pilloli tieghek jistghu iqabbdur in-nghas. M'ghandekx issuq jew tuza ghodda jew magni sakemm tkun taf kif il-pilloli jaffettwaw.

Seroquel XR fih lactose

Seroquel XR fih lactose li huwa tip ta' zokkor. Jekk it-tabib tieghek qallek li ghandek intolleranza ghal xi zokkrijiet, kellek lit-tabib tieghek qabel tiehu din il-medicina.

Effett fuq Skrinjar ghad-Drogi fl-Awrina

Jekk se jsirlek skrinjar ghad-drogi fl-awrina, it-tehid ta' Seroquel jista' jikkawza rizultati pozittivi ghal methadone jew certi medicini ghad-dipressjoni msejha antidipressanti tricikli (TCAs) meta jintuzaw certi metodi ta' ittestjar, anke jekk tista' ma tkunx qed tiehu methadone jew TCAs. Jekk dan isehh, jista' jsir test aktar specifiku.

3. Kif ghandek tiehu Seroquel XR

Dejjem ghandek tiehu Seroquel XR skont il-parir ezatt tat-tabib tieghek. Dejjem ghandek ta'certa ruhek mat-tabib jew mal-ispizjar tieghek jekk ikollok xi dubju. It-tabib tieghek se jiddeciedi fuq id-doza tal-bidu tieghek. Id-doza ta' manteniment (doza ta' kuljum) se tiddependi fuq il-marda u l-htigijiet tieghek, izda generalment tkun bejn 150 mg u 800 mg.

- Ghandek tiehu l-pilloli tieghek darba kuljum.
- Taqsamx, tomghodx u tfarrakx il-pilloli .
- Ibla' l-pilloli tieghek shah ma' tazza ilma.
- Hu l-pilloli tieghek minghajr ikel (mill-anqas siegha qabel ikla jew qabel ma torqod, it-tabib tieghek se jghidlek meta.
- Tixrobx il-meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tiehu Seroquel XR. Dan jista' jaffettwa l-mod kif tahdem il-medicina.
- Tieqafx tiehu l-pilloli tieghek anki jekk thossok ahjar, sakemm ma jghidlekx it-tabib tieghek.

Problemi fil-fwied

Jekk ghandek problemi fil-fwied it-tabib tieghek jista' jbidillek id-doza tieghek.

Persuni anzjani

Jekk inti anzjan it-tabib tieghek jista' jbidillek id-doza tieghek.

Uzu fit-tfal u l-adolesxenti

Seroquel XR m'ghandux jintuza minn tfal u adolesxenti taht it-18-il sena.

Jekk tiehu Seroquel XR aktar milli suppost

Jekk tiehu aktar Seroquel XR milli ppreskrivilek it-tabib tieghek, tista' thossok bi nghan, thossok stordut u tesperjenza tahbit abnormali tal-qalb. Ikkuntattja lit-tabib tieghek jew l-eqreb sptar minnufih. Zomm il-pilloli Seroquel XR mieghek.

Jekk tinsa tiehu doza ta' Seroquel XR

Jekk tinsa tiehu doza, hudha malli tiftakar. Jekk ikun kwazi sar il-hin biex tiehu d-doza li jmiss, stenna sa dak il-hin. M'ghandekx tiehu doza doppja biex tpatti ghal pillola li tkun insejt tiehu.

Jekk tieqaf tiehu Seroquel XR

Jekk tieqaf tiehu Seroquel XR f'daqqa, jista' jkun li ma tkunx tista' torqod (insomnja), jew tista' thossok ma tiflahx (dardir), jew tista' tesperjenza ugigh ta' ras, dijarea, tkun ma tiflahx (rimettar), sturdament jew irritabilita. It-tabib tieghek jista' jissuggerilek li tnaqqas id-doza bil-mod qabel ma twaqqaf il-kura.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, Seroquel XR jista' jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Effetti sekondarji komuni hafna (jistghu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Sturdament (jista' jwassal għal waqgħat), ugiġh ta' ras, ħalq xott.
- Thossok bi nghan (dan jista' jmur maż-żmien, hekk kif tkompli tiehu Seroquel) (jista' jwassal għal waqgħat).
- Sintomi ta' twaqqif (sintomi li jsehhu meta tieqaf tiehu Seroquel) jinkludu li ma tkunx tista' torqod (insomnija), thossok ma tiflahx (dardir), ugiġh ta' ras, dijarea, tkun ma tiflahx (rimettar), sturdament, u irritabilità. Huwa rakkomandat li twaqqaf il-kura bil-mod fuq perjodu ta' mill-inqas ġimgħa sa ġimgħtejn.
- Izzid fil-piż.
- Movimenti muskolari mhux normali. Dawn jinkludu diffikultà biex tibda movimenti muskolari, roġħda, irrikwjetezza jew riġidità muskolari mingħajr ugiġh.
- Tibdiliet fl-ammont ta' ċerti xahmijiet (trigliceridi u kolesterol totali)

Effetti sekondarji komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Tahbita mgħaġġla tal-qalb.
- Thoss sensazzjoni li qalbek qed tħabbat b'mod qawwi, tħabbat mgħaġġel hafna jew tibdil fir-ritmu tal-qalb.
- Stitikezza, stonku mqalleb (indigestjoni).
- Thossok dghajjef.
- Nefha fid-dirghajn jew fir-riġlejn.
- Pressjoni baxxa tad-demmi meta tqum bilwieqfa. Dan jista' jġieghlek thossok stordut jew iħossok ħazin (jista' jwassal għal waqgħat).
- Żieda fil-livelli taz-zokkor fid-demmi.
- Vista mċajpra.
- Holm abnormali u inkubi
- Thossok aktar bil-ġuħ
- Thossok irritat
- Disturbi fil-kliem u fil-lingwaġġ.
- Ħsibijiet ta' suwiċidju u aggravar tad-dipressjoni tiegħek.
- Qtuġh ta' nifs.
- Rimettar (l-aktar fl-anzjani).
- Deni
- Tibdil fl-ammont ta' ormini fit-tirojde fid-demmi tiegħek
- Tnaqqis fin-numru ta' ċerti tipi ta' ċelloli tad-demmi
- Żidiet fl-ammont ta' enzimi tal-fwied imkejla fid-demmi
- Żidiet fl-ammont tal-ormoni prolactin fid-demmi. Żidiet fl-ormoni prolactin jistghu f'każijiet rari jwasslu għal dawn li ġejjin:

- Irġiel u nisa jkollhom nefha f'sidirhom u jipproduċu l-halib mis-sider b'mod mhux mistenni.
- Nisa ma jkollhomx pirjids fix-xahar jew pirjids irregolari.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistghu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100):

- Aċċessjonijiet

- Reazzjonijiet allergiċi li jistgħu jinkludu dbabar mgħollijn, nefha fil-ġilda u nefha madwar il-ħalq.
- Sensazzjonijiet spjaċevoli fir-riglejn (imsejha wkoll sindromu tar-riglejn irrikwieti).
- Diffikultà biex tibla'.
- Movimenti inkontrollabbli, l-aktar ta' wiċċek jew ta' ilsienek.
- Disfunzjoni sesswali.
- Dijabete
- Bidla fl-attività elettriċa tal-qalb li tidher fuq ECG (titwil tal-QT)
- Rata tal-qalb li tkun aktar baxxa min-normal li tista' ssehh fil-bidu tal-kura u li tista' tkun assoċjata ma' pressjoni baxxa tad-demm u hass ħazin.
- Diffikultà biex tgħaddi l-awrina.
- Hass ħazin (jista' jwassal għal waqgħat)
- Imnieher misdud
- Tnaqqis fl-ammont ta' ċelloli tad-demm homor
- Tnaqqis fl-ammont ta' sodium fid-demm

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000):

- Kombinazzjoni ta' temperatura għolja (deni), johroglok l-għaraq, rigidità muskolari, thossok stordut hafna jew ihossok ħazin (disturb imsejjah "sindromu newrolettiku malinn").
- Sfurija tal-ġilda u tal-ghajnejn (suffeja).
- Infjammazzjoni tal-fwied (epatite).
- Erezzjoni fit-tul u bl-uġiġħ (prijaipizmu).
- Nefha fis-sider u l-produzzjoni mhux mistennija ta' ħalib tas-sider (galaktorreja).
- Disturb mestrwali.
- Emboli tad-demm fil-vini speċjalment fir-riglejn (sintomi jinkludu nefha, uġiġħ u ħmura fis-sieq), li jistgħu jivvjaġġaw mill-važi tad-demm lill-pulmun u jikkawżaw uġiġħ fis-sider u diffikultà fit-tehid tan-nifs. Jekk tinnota xi sintomi minn dawn fittex parir mediku minnufih.
- Timxi, titkellem, tiekol jew tagħmel attivitajiet ohra waqt li tkun rieqed.
- Tnaqqis fit-temperatura tal-ġisem (ipotermja).
- Infjammazzjoni tal-frixa
- Kundizzjoni (imsejha "sindromu metaboliku") fejn jista' jkollok kombinazzjoni ta' 3 jew aktar minn dawn li ġejjin: zieda fix-xaħam madwar żaqkek, tnaqqis fil-"kolesterol tajjeb" (HDL-C), zieda f'tip ta' xaħam fid-demm tiegħek imsejjah trigliċeridi, pressjoni għolja tad-demm u zieda fiz-zokkor fid-demm tiegħek.
- Kombinazzjoni ta' deni, sintomi bħal tal-influwenza, uġiġħ fil-grizmejn, jew kwalunkwe infezzjoni ohra b'għadd baxx hafna ta' ċelluli bojod, kundizzjoni msejha agranuloċitosi.
- Ostruzzjoni tal-imsaren.
- Żieda fil-creatine phosphokinase fid-demm (sustanza mill-muskoli)

Effetti sekondarji rari hafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10,000):

- Raxx sever, infafet, jew irqajja homor fuq il-ġilda.
- Reazzjoni allergika severa (imsejha anafilassi) li tista' tikkawża diffikultà fit-tehid tan-nifs jew xokk.
- Nefha mgħaġġla tal-ġilda, normalment madwar l-ghajnejn, ix-xofftejn u l-gerżuma (anġiodema).
- Kundizzjoni serja ta' infafet fil-ġilda, il-ħalq, l-ghajnejn u l-ġenitali (sindromu ta' Stevens-Johnson)
- Sekrezzjoni inadegwata ta' ormon li jikkontrolla l-volum tal-awrina.
- Tkissir tal-fibri tal-muskoli u uġiġħ fil-muskoli (rabdomajolizi).
- Aggravar ta' dijabete pre-eżistenti.

Mhux maghruf (ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli)

- Raxx tal-ġilda b'ponot homor u irregolari (eritema multiforme)
- Reazzjoni allergika serja u f'daqqa b'sintomi bħal deni u nfafet fuq il-ġilda u tqaxxir tal-ġilda (nekrolizi epidermali tossika)
- Sintomi ta' rtirar jistgħu jseħhu fi trabi tat-twelid ta' ommijiet li użaw Seroquel XR waqt it-tqala tagħhom

Il-klassi ta' mediċini li għaliha jappartjeni Seroquel XR tista' tikkawża problemi fir-ritmu tal-qalb, li jistgħu jkunu serji u f'każijiet severi jistgħu jkunu fatali.

Xi effetti sekondarji jidhru biss meta jittiehed test tad-demmm. Dawn jinkludu tibdil fl-ammont ta' ċertu xahmijiet (trigliceridi u kolesterol totali) jew zokkor fid-demmm, tibdil fl-ammont ta' ormoni tat-tirojde fid-demmm tiegħek, żieda fl-enzimi tal-fwied, tnaqqis fl-ghadd ta' ċerti tipi ta' ċelluli tad-demmm, tnaqqis fl-ammont ta' ċelluli tad-demmm homor, żieda fil-creatine phosphokinase fid-demmm (sustanza fil-muskoli), tnaqqis fl-ammont ta' sodju fid-demmm u żidiet fl-ammont tal-ormon prolactin fid-demmm. F'każijiet rari żidiet fl-ormon prolactin jistgħu jwasslu għal dawn li ġejjin:

- L-irġiel u n-nisa jkollhom nefha f'sidirhom u b'mod mhux mistenni jipproduċu l-ħalib tas-sider.
- In-nisa ma jkollhomx pirjid fix-xahar jew pirjids irregolari.

It-tabib tista' jitolbok tagħmel testijiet tad-demmm minn żmien għal żmien.

Effetti sekondarji fit-tfal u l-adolessenti

L-istess effetti sekondarji li jistgħu jseħhu fl-adulti jistgħu jseħhu wkoll fit-tfal u l-adolessenti.

L-effetti sekondarji li ġejjin deheru aktar ta' spiss fit-tfal u l-adolessenti jew ma deherux fl-adulti:

Effetti sekondarji komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

- Żieda fl-ammont ta' ormon imsejjah prolactin, fid-demmm. Żidiet fl-ormon prolactin jista' f'każijiet rari jwasslu għal dawn li ġejjin:
 - o Is-subien u l-bniet ikollhom nefha f'sidirhom u b'mod mhux mistenni jipproduċu l-ħalib tas-sider
 - o Il-bniet ma jkollhomx pirjid fix-xahar jew pirjids irregolari
- Żieda fl-aptit
- Rimettar
- Movimenti muskolari mhux normali. Dawn jinkludu diffikultà biex jinbdew movimenti muskolari, roghda, irrikwjetezza jew riġidità muskolari mingħajr uġigh.
- Żieda fil-persjoni tad-demmm

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- Thossok dghajef, ħass ħazin (jista' jwassal għal waqgħat).
- Imnieher misdud.
- Thossok irritat.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħzen Seroquel XR

- Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.
- Tużax Seroquel XR wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.
- Seroquel XR ma jehtieġx kundizzjonijiet speċjali ta' kif jinħażen.
- Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagg jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Seroquel XR

- Is-sustanza attiva hija quetiapine. Il-pilloli Seroquel XR fihom 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg jew 400 mg ta' quetiapine (bħala quetiapine fumarate).
- Is-sustanzi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola: microcrystalline cellulose, sodium citrate, lactose monohydrate, magnesium stearate, hypromellose.

Kisja tal-pillola: hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171). Il-pilloli ta' 50 mg, 200 mg u 300 mg fihom ukoll iron oxide yellow (E172) u l-pilloli ta' 50 mg fihom iron oxide red (E172).

Kif jidher Seroquel XR u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli kollha li jerhu l-mediċina bil-mod għandhom forma ta' kapsula u mmarkati b'XR u l-qawwa. Il-pilloli ta' 50 mg huma kulur il-hawh; il-pilloli ta' 150 mg huma kulur abjad, il-pilloli ta' 200 mg huma kulur isfar; il-pilloli ta' 300 mg huma kulur isfar ċar u l-pilloli ta' 400 mg huma kulur abjad.

Id-daqsijiet tal-pakkett ta' 10, 30, 50, 60 u 100 pillola huma rreġistrati għall-qawwiet kollha. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkun fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

<[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

{Isem u indirizz}

<{telefon}>

<{fax}>

<{e-mail}>

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri TAL-EEA b'dawn l-ismijiet:

PAJJIŻ	ISEM KUMMERĊJALI
L-Awstrija	Seroquel XR
Il-Belġju	Seroquel XR
Ċipru	Seroquel XR
Ir-Repubblika Ċeka	Seroquel Prolong
Id-Danimarka	Seroquel Prolong
L-Estonja	Seroquel XR
Il-Finlandja	Seroquel Prolong
Franza	Xeroquel LP
Il-Germanja	Seroquel Prolong® 50 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 150 mg Retardtabletten,

	Seroquel Prolong® 200 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 300 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 400 mg Retardtabletten
Il-Greċja	Seroquel XR
L-Ungerija	Seroquel XR
L-Islanda	Seroquel Prolong
L-Irlanda	Seroquel XR
L-Italja	Seroquel compresse a rilascio prolungato
Il-Latvja	Seroquel XR
Il-Litwanja	Seroquel XR
Il-Lussemburgu	Seroquel XR
Malta	Seroquel XR
Il-Pajjiżi l-Baxxi	Seroquel XR
In-Norveġja	Seroquel Depot
Il-Portugall	Seroquel SR
Ir-Rumanija	Seroquel XR
Is-Slovakkja	Seroquel XR
Is-Slovenja	Seroquel SR
Spanja	Seroquel Prolong
L-Isvezja	Seroquel Depot
Ir-Renju Unit	Seroquel XL

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f' {XX/SSSS}.