

<u>EU nummers</u>	<u>Fantasie naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Doelr-soort(e)n</u>	<u>Toedieningswijze</u>	<u>Verpakking</u>	<u>Inhoud</u>	<u>Verpakkings-grootte</u>	<u>Wachttermijn</u>
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden.	Rundvee: subcutaan of intravenous gebruikt. Varken: intramusculair gebruikt. Paard: intraveneus gebruik.	Flacon (glas)	50 ml	1 flacon	Rundvee: Orgaan(vlees): 15 dagen. Melk: 5 dagen. Varkens en paarden: Orgaan(vlees): 5 dagen.
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden.	Rundvee: subcutaan of intravenous gebruikt. Varken: intramusculair gebruikt. Paard: intraveneus gebruik.	Flacon (glas)	100 ml	1 flacon	Rundvee: Orgaan(vlees): 15 dagen. Melk: 5 dagen. Varkens en paarden: Orgaan(vlees): 5 dagen.
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden.	Rundvee: subcutaan of intravenous gebruikt. Varken: intramusculair gebruikt. Paard: intraveneus gebruik.	Flacon (glas)	250 ml	1 flacon	Rundvee: Orgaan(vlees): 15 dagen. Melk: 5 dagen. Varkens en paarden: Orgaan(vlees): 5 dagen.
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Orale suspensie	Paarden	Oraal	Flacon (Polyethyleen)	125 ml	1 flacon	Vlees- en slachtafval: 3 dagen
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Orale suspensie	Paarden	Oraal	Flacon (Polyethyleen)	336 ml	1 flacon	Vlees- en slachtafval: 3 dagen

EMA/V/C/002283 /X/012	Emdoca m	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Hond, kat	Hond: subcutaan of intravenous gebruik. Kat: subcutaan gebruik.	Flacon (glas)	20 ml	1 flacon	Niet van toepassing
EMA/V/C/002283 /X/012	Emdoca m	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Hond, kat	Hond: subcutaan of intravenous gebruik. Kat: subcutaan gebruik.	Flacon (glas)	50 ml	1 flacon	Niet van toepassing
EMA/V/C/002283 /X/012	Emdoca m	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Runderen, varkens	Runderen: subcutaan of intravenous gebruik. Varkens: intramusculair gebruik.	Flacon (glas)	50 ml	1 flacon	Runderen: Vlees- en slachtafval: 15 dagen. Varkens: Vlees- en slachtafval: 5 dagen.
EMA/V/C/002283 /X/012	Emdoca m	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Runderen, varkens	Runderen: subcutaan of intravenous gebruik. Varkens: intramusculair gebruik.	Flacon (glas)	100 ml	1 flacon	Runderen: Vlees- en slachtafval: 15 dagen. Varkens: Vlees- en slachtafval: 5 dagen.
EMA/V/C/002283 /X/012	Emdoca m	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Runderen, varkens	Runderen: subcutaan of intravenous gebruik. Varkens: intramusculair gebruik.	Flacon (glas)	250 ml	1 flacon	Runderen: Vlees- en slachtafval: 15 dagen. Varkens: Vlees- en slachtafval: 5 dagen.