

EU-nummers	Fantasie-naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakking s-grootte	Wacht-termijn
EU/2/20/262/001	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lyofilisaat en suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik	Lyofilisaat: glazen flacon Suspensie: glazen flacon	Lyofilisaat: 10 doses (10 ml); Suspensie: 20 ml	Lyofilisaat: 1 flacon; Suspensie: 1 flacon	Nul dagen
EU/2/20/262/002	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lyofilisaat en suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik	Lyofilisaat: glazen flacon Suspensie: PET flacon	Lyofilisaat: 10 doses (10 ml); Suspensie: 20 ml	Lyofilisaat: 1 flacon; Suspensie: 1 flacon	Nul dagen
EU/2/20/262/003	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lyofilisaat en suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik	Lyofilisaat: glazen flacon Suspensie: glazen flacon	Lyofilisaat: 25 doses (10 ml); Suspensie: 50 ml	Lyofilisaat: 1 flacon; Suspensie: 1 flacon	Nul dagen
EU/2/20/262/004	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lyofilisaat en suspensie voor injectie	Varkens	Intramusculair gebruik	Lyofilisaat: glazen flacon Suspensie: PET flacon	Lyofilisaat: 25 doses (10 ml); Suspensie: 50 ml	Lyofilisaat: 1 flacon; Suspensie: 1 flacon	Nul dagen

--¹

C. perfringens componenten:

- Type A, alfa-toxoïd ≥ 125 rU / ml *
- Type C, bèta1-toxoïd ≥ 3354 rU / ml *
- Type A, bèta2-toxoïd ≥ 794 rU / ml *

E. coli componenten:

- F4ab fimbriale adhesine ≥ 23 rU / ml *
- F4ac fimbriale adhesine ≥ 19 rU / ml *
- F5 fimbriale adhesine ≥ 13 rU / ml *
- F6 fimbriale adhesine ≥ 37 rU / ml *

*toxoidgehalte en fimbriale adhesinen in relatieve eenheden per ml, bepaald in een ELISA tegen een interne standaard.