

EU-nummers	Fantasienaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier soort(en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachtttermijn
EU/2/18/233/001	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen) Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 7 ml (1 000 doses); Oplosmiddel: 50 ml	Suspensie: 1 flacon Oplosmiddel (Hipramune T): 1 flacon	Nul dagen
EU/2/18/233/002	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen) Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 35 ml (5 000 doses); Oplosmiddel: 250 ml	Suspensie: 1 flacon Oplosmiddel (Hipramune T): 1 flacon	Nul dagen
EU/2/18/233/003	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen) Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 70 ml (10 000 doses); Oplosmiddel: 500 ml	Suspensie: 1 flacon Oplosmiddel (Hipramune T): 1 flacon	Nul dagen
EU/2/18/233/004	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen); Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 7 ml (1 000 doses); Oplosmiddel: 50 ml	Suspensie: 1 flacon; Oplosmiddel (Hipracell): 1 flacon	Nul dagen
EU/2/18/233/005	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen); Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 35 ml (5 000 doses); Oplosmiddel: 250 ml	Suspensie: 1 flacon; Oplosmiddel (Hipracell): 1 flacon	Nul dagen
EU/2/18/233/006	EVANT	--1	Suspensie en oplosmiddel voor orale spray	Kippen	Oraal gebruik	Flacon (glazen); Oplosmiddel: flacon (PP)	Suspensie: 70 ml (10 000 doses); Oplosmiddel: 500 ml	Suspensie: 1 flacon; Oplosmiddel (Hipracell): 1 flacon	Nul dagen

--1 *Eimeria acervulina*, stam 003 - 332 - 450* gesporuleerde oöcysten

*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen.

Eimeria maxima, stam 013 - 196 - 265* gesporuleerde oöcysten

*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen.

Eimeria mitis, stam 006 - 293 - 397* gesporuleerde oöcysten

*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen.

Eimeria praecox, stam 007 - 293 - 397* gesporuleerde oöcysten

*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen.

Eimeria tenella, stam 004 - 276 - 374* gesporuleerde oöcysten

*Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia, volgens de in vitro procedures van de fabrikant ten tijde van het mengen.