

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	100 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/003	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	10 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/004	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	32 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/005	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	100 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Subcutaan of intraveneus gebruik (honden), subcutaan gebruik (katten)	Injectieflacon (glas)	10 ml	1 injectieflacon	Niet van toepassing
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	50 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	100 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspensie	Paarden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	100 ml	1 fles	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	100 ml	12 injectieflacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Subcutaan of intraveneus gebruik (honden), subcutaan gebruik (katten)	Injectieflacon (glas)	20 ml	1 injectieflacon	Niet van toepassing
EU/2/97/004/012	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	15 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/013	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	30 ml	1 fles	Niet van toepassing

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	50 ml	12 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	100 ml	12 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/026	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Katten, cavia's	Oraal gebruik	Polyethyleen fles	15 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	20 ml	1 injectie-flacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	20 ml	12 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Honden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	180 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Paarden	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	250 ml	1 fles	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	250 ml	1 injectie-flacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens), intraveneus gebruik (paarden)	Injectieflacon (glas)	250 ml	6 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens/paarden) Melk: 5 dagen
EU/2/97/004/033	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Katten, cavia's	Oraal gebruik	Polyethyleen fles	10 ml	1 fles	Niet van toepassing

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/034	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Katten, cavia's	Oraal gebruik	Polyethyleen fles	3 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	20 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	20 ml	12 injectieflacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	50 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Subcutaan of intraveneus gebruik (rundvee), intramusculair gebruik (varkens)	Injectieflacon (glas)	50 ml	12 injectieflacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten	Subcutaan gebruik	Injectieflacon (glas)	10 ml	1 injectieflacon	Niet van toepassing
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten	Subcutaan gebruik	Injectieflacon (glas)	20 ml	1 injectieflacon	Niet van toepassing
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Varkens	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	100 ml	1 fles	(Orgaan)vlees: 5 dagen

EU-nummers	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldier-soort(en)	Toedienings-weg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings-grootte	Wachttermijn
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Varkens	Oraal gebruik	Fles (polyethyleen)	250 ml	1 fles	(Orgaan)vlees: 5 dagen
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	1 blister- verpakking (7 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	12 blister- verpakkingen (84 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	36 blister- verpakkingen (252 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	1 blister- verpakking (7 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	12 blister- verpakkingen (84 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	Blister- verpakkingen (Alu/Alu)	7 tabletten	36 blister- verpakkingen (252 tabletten)	Niet van toepassing
EU/2/97/004/049	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oraal gebruik	Katten, cavia's	Oraal gebruik	Polyethyleen fles	30 ml	1 fles	Niet van toepassing
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en paarden	Intraveneus gebruik (rundvee en paarden); Subcutaan gebruik (rundvee)	Injectieflacon (glas)	50 ml	1 injectie- flacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)

<b>EU-nummers</b>	<b>Fantasiernaam</b>	<b>Sterkte</b>	<b>Farmaceutische vorm</b>	<b>Doeldier-soort(en)</b>	<b>Toedienings-weg</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Inhoud</b>	<b>Verpakking-s-grootte</b>	<b>Wachttermijn</b>
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en paarden	Intraveneus gebruik (rundvee en paarden); Subcutaan gebruik (rundvee)	Injectieflacon (glas)	100 ml	1 injectie-flacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en paarden	Intraveneus gebruik (rundvee en paarden); Subcutaan gebruik (rundvee)	Injectieflacon (glas)	50 ml	12 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en paarden	Intraveneus gebruik (rundvee en paarden); Subcutaan gebruik (rundvee)	Injectieflacon (glas)	100 ml	12 injectie-flacons	(Orgaan)vlees: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)