

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 igła
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 2 igły
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 igieł
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 20 igieł

--¹

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

Polisacharyd pneumokokowy serotyp 3 ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 8 ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9N ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 10A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 12F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 15A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy z deOAc15B (de-O-acetylated serotyp 15B) ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 16F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 17F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 20A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 22F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23A ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23B ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 24F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 33F ¹	4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 35B ¹	4 µg

¹Skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ jest nietoksycznym zmutowanym toksoidem błoniczym (pochodzącym ze szczepu C7 *Corynebacterium diphtheriae*) uzyskiwanym z zastosowaniem technologii rekombinacji w komórkach bakterii *Pseudomonas fluorescens*.

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera około 65 µg białka nośnikowego CRM₁₉₇.