

<u>Numer procedury EMA</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/13/829/001	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	fiolka (ze szkła)	0.5 ml	10 fiolek
EU/1/13/829/002	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułka-strzykawka
EU/1/13/829/003	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk
EU/1/13/829/004	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła))	0.5 ml	1 ampułka-strzykawka + 1 igła
EU/1/13/829/005	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 igieł
EU/1/13/829/006	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułka-strzykawka + 2 igły
EU/1/13/829/007	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk + 20 igieł
EU/1/13/829/008	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	50 ampułko-strzykawk
EU/1/13/829/009	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	50 (5 x 10) ampułko-strzykawk (opakowanie zbiorcze)
EU/1/13/829/010	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułka-strzykawka + 1 igła w osłonie zabezpieczającej
EU/1/13/829/011	Hexyon	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułka-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 igieł w osłonie zabezpieczającej
--1	Jedna dawka ¹ (0,5 ml) zawiera:						
	Toksoid błoniczy			nie mniej niż 20 j.m. (30 Lf)			
	Toksoid tężcowy			nie mniej niż 40 j.m. (10 Lf)			
	Antygeny <i>Bordetella pertussis</i>						
	Toksoid krztuścowy			25 mikrogramów			
	Hemaglutynina włókienkowa			25 mikrogramów			
	Wirus poliomyelitis (inaktywowany)						
	Typ 1 (Mahoney)			29 jednostek antygeny D			
	Typ 2 (MEF-1)			7 jednostek antygeny D			
	Typ 3 (Saukett)			26 jednostki antygeny D			

Antygen powierzchniowy wirusa wzv B	10 mikrogramów
Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b (fosforan polirybozylorybitolu)	12 mikrogramów
skoniugowany z białkiem tężcowym	22-36 mikrogramów

¹ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,6 mg Al³⁺)