

Numer EU	Nazwa handlowa	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki docelowe	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/08/090/001	Loxicom	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	15 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/002	Loxicom	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	30 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/003	Loxicom	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	10 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/004	Loxicom	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	32 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/005	Loxicom	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	100 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Dożylnie lub podskórnie	Fiolka (szkło)	10 ml	1 Fiolka	Nie dotyczy
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Dożylnie lub podskórnie	Fiolka (szkło)	20 ml	1 Fiolka	Nie dotyczy
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Dożylnie lub podskórnie	Fiolka (szkło)	100 ml	1 Fiolka	Nie dotyczy
EU/2/08/090/009	Loxicom	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	15 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świny i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świny: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	30 ml	1 Fiolka	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni

Numer EU	Nazwa handlowa	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki docelowe	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	50 ml	1 Fiolka	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	100 ml	1 Fiolka	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	250 ml	1 Fiolka	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	250 ml	6 Fiolki	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	30 ml	12 Fiolki	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni

Numer EU	Nazwa handlowa	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki docelowe	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	50 ml	12 Fiolki	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	100 ml	12 Fiolki	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podskórnego lub dożylnego Świnie: domięśniowego Konie: dożylnego	Fiolka (szkło)	250 ml	12 Fiolki	Bydło: Mięso i podroby: 15 dni Mleko: 5 dni Świn i koni Mięso i podroby: 5 dni
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 tabletek	Nie dotyczy

Numer EU	Nazwa handlowa	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki docelowe	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Tabletka do żucia	Psy.	Podanie doustne.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 tabletek	Nie dotyczy
EU/2/08/090/027	Loxicom	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	5 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	30 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Pasta doustna	Konie	Podanie doustne	Strzykawka (LDPE)	8.4 g	1 ampułko-strzykawka	Tkanki jadalne: 3 dni.
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Pasta doustna	Konie	Podanie doustne	Strzykawka (LDPE)	8.4 g	7 ampułko-strzykawki	Tkanki jadalne: 3 dni.
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Pasta doustna	Konie	Podanie doustne	Strzykawka (LDPE)	8.4 g	14 ampułko-strzykawki	Tkanki jadalne: 3 dni.
EU/2/08/090/032	Loxicom	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	200 ml	1 butelka ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy
EU/2/08/090/033	Loxicom	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka (PET), strzykawka dozująca (PP/PE)	100 ml	2 butelki ze strzykawką dozującą	Nie dotyczy