

<u>Numer pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/25/2010/001	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) w blistrze	0,2 ml	1 ampułko-strzykawka
EU/1/25/2010/002	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) w blistrze	0,2 ml	2 ampułko-strzykawki
EU/1/25/2010/003	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) w blistrze	0,2 ml	10 ampułko-strzykawe
EU/1/25/2010/004	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) na tacce	0,2 ml	1 ampułko-strzykawka
EU/1/25/2010/005	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) na tacce	0,2 ml	2 ampułko-strzykawki
EU/1/25/2010/006	mNEXSPIKE	-- ¹	Dyspersja do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (COC) na tacce	0,2 ml	10 ampułko-strzykawe

--¹ Jedna dawka (0,2 ml) zawiera 10 mikrogramów mRNA SARS-CoV-2.
mNEXSPIKE jest jednoniciowym, informacyjnym RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzanym z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji *in vitro* na matrycy DNA, kodującym domenę N-końcową i domenę wiążącą receptor białka kolca (ang. spike, S) wirusa SARS-CoV-2 (XBB.1.5).