

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Mo c</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/24/1871/001	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	1 fiolka + 1 ampułkostrzykawka + 1 adapter fiolki + 1 igła
EU/1/24/1871/002	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	5 fiolek + 5 ampułkostrzykawk + 5 adapterów fiolki + 5 igieł
EU/1/24/1871/003	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	10 fiolek + 10 ampułkostrzykawk + 10 adapterów fiolki + 10 igieł
EU/1/24/1871/004	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	1 fiolka + 1 ampułkostrzykawka + 1 adapter fiolki
EU/1/24/1871/005	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	5 fiolek + 5 ampułkostrzykawk + 5 adapterów fiolki
EU/1/24/1871/006	Penbraya	-- ¹	proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	proszek: fiolka (szklana); zawiesina: ampułkostrzykawka (szklana)	proszek: 5 µg; zawiesina: 0,5 ml	10 fiolek + 10 ampułkostrzykawk + 10 adapterów fiolki
-- ¹	polisacharyd Neisseria meningitidis grupy A ^{2,3}			5 mikrogramów			
	polisacharyd Neisseria meningitidis grupy C ^{2,3}			5 mikrogramów			
	polisacharyd Neisseria meningitidis grupy W ^{2,3}			5 mikrogramów			
	polisacharyd Neisseria meningitidis grupy Y ^{2,3}			5 mikrogramów			
	białko fHbp podrodziny A ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B ^{4,5,6}			60 mikrogramów			
	białko fHbp podrodziny B ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B ^{4,5,6}			60 mikrogramów			

² skoniugowane z toksoidem tężcowym (TT) jako nośnikiem białkowym

³ wytwarzane w komórkach Neisseria meningitidis

⁴ adsorbowane na fosforanie glinu

⁵ fHbp (białko wiążące czynnik H)

⁶ wytwarzane w komórkach Escherichia coli metodą rekombinacji DNA