

<u>Numer pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 igła
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 igieł
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	50 ampułko-strzykawk
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- ¹	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml	50 ampułko-strzykawk + 50 igieł

--¹ --¹

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

Polisacharyd pneumokokowy serotypu 1 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 3 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 4 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 5 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 6A ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 6B ^{1,2}	4,4 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 7F ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 8 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 9V ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 10A ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 11A ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 12F ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 14 ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 15B ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 18C ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 19A ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 19F ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 22F ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 23F ^{1,2}	2,2 µg
Polisacharyd pneumokokowy serotypu 33F ^{1,2}	2,2 µg

¹skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM₁₉₇ (około 51 µg na dawkę)

²adsorbowany na fosforanie glinu (0,125 mg glinu na dawkę)