

<u>Numer EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Rodzaj opakowania</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	fiolka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 fiolka
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	fiolka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 fiolki + 2 jałowe strzykawki + 4 gaziki nasączone alkoholem
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	fiolka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 fiolek + 7 jałowych strzykawek + 14 gazików nasączonych alkoholem
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 ampułko-strzykawek
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	fiolka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 fiolki + 2 jałowe strzykawki z igłą z zabezpieczeniem + 4 gaziki nasączone alkoholem
EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	fiolka (szklana)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 fiolek + 7 jałowych strzykawek z igłą z zabezpieczeniem + 14 gazików nasączonych alkoholem