

<u>Numer pozwolenia (EU)</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/09/508/001	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułkostrzykawka
EU/1/09/508/002	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułkostrzykawk
EU/1/09/508/003	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułkostrzykawka + 1 igła
EU/1/09/508/004	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	10 ampułkostrzykawk + 10 igieł
EU/1/09/508/005	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	1 ampułkostrzykawka + 2 igły
EU/1/09/508/006	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	0,5 ml	1 fiolka
EU/1/09/508/007	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	0,5 ml	10 fiolek
EU/1/09/508/008	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	0,5 ml	100 fiolek
EU/1/09/508/009	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	1,0 ml	100 fiolek (wielodawkowych)
EU/1/09/508/010	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml	50 ampułkostrzykawk
EU/0/00/000/012	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	2,0 ml	10 fiolek (wielodawkowych)
EU/0/00/000/013	Synflorix	-- ¹	zawiesina do wstrzykiwań	podanie domięśniowe	fiolka (szkło)	2,0 ml	100 fiolek (wielodawkowych)

--¹ 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Polisacharyd pneumokokowy serotyp 1* ¹	1 mikrogram
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 4* ¹	3 mikrogramy
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 5* ¹	1 mikrogram
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B* ¹	1 mikrogram
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F* ¹	1 mikrogram
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V* ¹	1 mikrogram

Polisacharyd pneumokokowy serotyp 14* ¹	1 mikrogram
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C* ²	3 mikrogramy
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F* ³	3 mikrogramy
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F* ¹	1 mikrogram

* adsorbowany na fosforanie glinu 0,5 miligrama Al³⁺

¹ skoniugowany z białkiem nośnikowym D (pochodzącym z bezotoczkowych

szczepów *Haemophilus influenzae*) 9-16 mikrogramów

² skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 5-10 mikrogramów

³ skoniugowany z toksoidem błoniczym jako nośnikiem białkowym 3-6 mikrogramów