

| <b><u>Numer<br/>Pozwolenia EU</u></b> | <b><u>Nazwa<br/>(własna)</u></b> | <b><u>Moc</u></b> | <b><u>Postać<br/>farmaceutyczna</u></b> | <b><u>Droga<br/>podania</u></b> | <b><u>Opakowanie<br/>bezpośrednie</u></b>           | <b><u>Zawartość<br/>(stężenie)</u></b> | <b><u>Wielkość opakowania</u></b>                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/18/1340/001                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | fiolka (szklana)                                    | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 1 fiolka + 1 strzykawka +<br>2 igły                                                      |
| EU/1/18/1340/002                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | fiolka (szklana)                                    | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 2 (2 × 1) fiolek +<br>2 (2 × 1) strzykawki +<br>4 (2 × 2) igły (opakowanie<br>zbiorcze)  |
| EU/1/18/1340/003                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | fiolka (szklana)                                    | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 6 (6 × 1) fiolek +<br>6 (6 × 1) strzykawk +<br>12 (6 × 2) igieł (opakowanie<br>zbiorcze) |
| EU/1/18/1340/004                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 1 ampułko-strzykawka                                                                     |
| EU/1/18/1340/005                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 2 ampułko-strzykawki                                                                     |
| EU/1/18/1340/006                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 6 (3 × 2) ampułko-strzykawk<br>(opakowanie zbiorcze)                                     |
| EU/1/18/1340/007                      | TAKHZYRO                         | 150 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 1 ml<br>(150 mg/ml)                    | 1 ampułko-strzykawka                                                                     |
| EU/1/18/1340/008                      | TAKHZYRO                         | 150 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 1 ml<br>(150 mg/ml)                    | 2 ampułko-strzykawki                                                                     |
| EU/1/18/1340/009                      | TAKHZYRO                         | 150 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana)                     | 1 ml<br>(150 mg/ml)                    | 6 (3 × 2) ampułko-strzykawk<br>(opakowanie zbiorcze)                                     |
| EU/1/18/1340/010                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana) we<br>wstrzykiwaczu | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 1 wstrzykiwacz<br>półautomatyczny napełniony                                             |
| EU/1/18/1340/011                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana) we<br>wstrzykiwaczu | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 2 wstrzykiwacze<br>półautomatyczne napełnione                                            |
| EU/1/18/1340/012                      | TAKHZYRO                         | 300 mg            | Roztwór do<br>wstrzykiwań               | Podanie<br>podskórne            | ampułko-strzykawka<br>(szklana) we<br>wstrzykiwaczu | 2 ml<br>(150 mg/ml)                    | 6 (3 × 2) wstrzykiwaczy<br>półautomatycznych<br>napełnionych (opakowanie<br>zbiorcze)    |