

Número EU	Nome comercial	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécies alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Apresentação	Intervalo de segurança
EU/2/08/090/001	Loxicom	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	15 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/002	Loxicom	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	30 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/003	Loxicom	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	10 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/004	Loxicom	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	32 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/005	Loxicom	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	100 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e Gatos	Endovenosa ou subcutânea	Frasco para injectáveis (vidro)	10 ml	1 Frasco para injectáveis	Não aplicável
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e Gatos	Endovenosa ou subcutânea	Frasco para injectáveis (vidro)	20 ml	1 Frasco para injectáveis	Não aplicável
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e Gatos	Endovenosa ou subcutânea	Frasco para injectáveis (vidro)	100 ml	1 Frasco para injectáveis	Não aplicável
EU/2/08/090/009	Loxicom	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	15 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	30 ml	1 Frasco para injectáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias

Número EU	Nome comercial	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécies alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Apresentação	Intervalo de segurança
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	50 ml	1 Frasco para injectáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	100 ml	1 Frasco para injectáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	250 ml	1 Frasco para injectáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	250 ml	6 Frascos para injectáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias

Número EU	Nome comercial	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécies alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Apresentação	Intervalo de segurança
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	30 ml	12 Frascos para injetáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	50 ml	12 Frascos para injetáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	100 ml	12 Frascos para injetáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, suínos e eqüinos	Bovinos: subcutânea ou intravenosa Suínos: o uso intramuscular Cavalos: uso intravenoso	Frasco para injectáveis (vidro)	250 ml	12 Frascos para injetáveis	Bovinos: Carnes e miudezas: 15 dias Leite: 5 dias Os porcos e cavalos Carnes e miudezas: 5 dias

Número EU	Nome comercial	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécies alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Apresentação	Intervalo de segurança
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		10 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		20 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		100 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Comprimidos palatáveis.	Cães	Via oral.	Blister (PVC/PVDC/Alu)		500 comprimidos	Não aplicável
EU/2/08/090/027	Loxicom	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	5 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	30 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Pasta oral	Cavalos	Via oral	Seringa (LDPE)	8.4 g	1 Seringa pré-carregada	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Pasta oral	Cavalos	Via oral	Seringa (LDPE)	8.4 g	7 Seringas pré-carregadas	Carne e vísceras: 3 dias

Número EU	Nome comercial	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécies alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Apresentação	Intervalo de segurança
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Pasta oral	Cavalos	Via oral	Seringa (LDPE)	8.4 g	14 Seringas pré-carregadas	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/08/090/032	Loxicom	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	200 ml	1 frasco com seringa doseadora	Não aplicável
EU/2/08/090/033	Loxicom	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Cães	Via oral	Frasco (PET), seringa de medição (PP/PE)	100 ml	2 frascos com seringa doseadora	Não aplicável