

<u>Número (UE) da AIM</u>	<u>Nome (de fantasia)</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Acondicionamento primário</u>	<u>Conteúdo (Concentração)</u>	<u>Dimensão da embalagem</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia + 1 agulha
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias + 10 agulhas
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	50 seringas pré-cheias
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	50 seringas pré-cheias + 50 agulhas

-- ¹ Uma dose (0,5 ml) contém:

Polissacárido do serótipo 1 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 3 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 4 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 5 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 6A do pneumococos ^{1, 2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 6B do pneumococos ^{1,2}	4,4 µg
Polissacárido do serótipo 7F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 8 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 9V do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 10A do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 11A do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 12F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 14 do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 15B do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 18C do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 19A do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 19F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 22F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 23F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg
Polissacárido do serótipo 33F do pneumococos ^{1,2}	2,2 µg

¹ Conjugado com a proteína transportadora CRM₁₉₇ (aproximadamente 51 µg por dose)

² Absorvido em fosfato de alumínio (0,125 mg de alumínio)