

Número EU	Nome de fantasia	Dosagem	Forma farmacêutica	Espécie-alvo	Via de administração	Embalagem	Conteúdo	Dimensão da embalagem	Intervalo de segurança
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	42 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (PET) seringa (PP)	200 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensão oral	Canina	Via Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Comprimidos para mastigar	Cães	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dose unitária)	não aplicável
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensão oral	Equinos	Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 seringa	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensão oral	Equinos	Oral	Frasco (HDPE) seringa (PP)	250 ml	1 frasco + 1 seringa	Carne e vísceras: 3 dias
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, porcos e equinos	Bovinos: s.c./i.v. porcos: i.m. equinos: i.v.	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, porcos e equinos	Bovinos: s.c./i.v. porcos: i.m. equinos: i.v.	Frascos (vidro)	50 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)

EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, porcos e equinos	Bovinos: s.c./i.v. porcos: i.m. equinos: i.v.	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	Solução injectável	Bovinos, porcos e equinos	Bovinos: s.c./i.v. porcos: i.m. equinos: i.v.	Frascos (vidro)	250 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Leite: 5 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Equinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: s.c./i.v. Gatos: s.c.	Frascos (vidro)	10 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: s.c./i.v. Gatos: s.c.	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Cães e gatos.	Cães: s.c./i.v. Gatos: s.c.	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	não aplicável
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Bovinos e porcos	Bovinos: intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular	Frascos (vidro)	20 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Bovinos e porcos	Bovinos: intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular	Frascos (vidro)	50 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	Solução injectável	Bovinos e porcos	Bovinos: intravenosa subcutânea Porcos: intramuscular	Frascos (vidro)	100 ml	1 frascos	Carne e vísceras: 15 dias (Bovinos) Carne e vísceras: 5 dias (Porcos)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Grânulos em	Equinos	Administrar	Saquetas	1.5 g	100 saquetas	Carne e vísceras:

			saqueta.		com o alimento.	(papel/PE/alu/PE)			3 dias
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (HDPE), seringa (PP)	10 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (HDPE), seringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (PP), seringa (PP)	3 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensão oral	Gatos	Via Oral	Frasco (PP), seringa (PP)	5 ml	1 frasco + 1 seringa	não aplicável
EU/2/07/078/026	Rheumocam	330 mg	Grânulos em saqueta.	Equinos	Administrar com o alimento.	Saquetas (papel/PE/alu/PE)	1.5 g	10 saquetas	Carne e vísceras: 3 dias