Número (UE) da AIM	Nome (de fantasia)	Dosagem	Forma farmacêutica	Via de administração	Acondicionamento Primário	Conteúdo (Concentração)	Dimensão da embalagem
EU/1/15/1079/001	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia
EU/1/15/1079/002	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias
EU/1/15/1079/003	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia + 1 agulha
EU/1/15/1079/004	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia + 2 agulhas
EU/1/15/1079/005	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias + 10 agulhas
EU/1/15/1079/006	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias + 20 agulhas
EU/1/15/1079/007	Vaxelis	--[1]	Suspensão injetável	Via intramuscular	seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	50 (5x10) seringas pré-cheias (embalagem múltipla)

--[1] Uma dose (0,5 ml) contém:

Anatoxina diftérica[1]	não inferior a 20 UI[6]
Anatoxina tetânica[1]	não inferior a 40 UI[6]
Antigénios de Bordetella pertussis[1]:	
Anatoxina da tosse convulsa (PT)	20 microgramas
Hemaglutinina filamentosa(FHA)	20 microgramas
Pertactina (PRN)	3 microgramas
Fímbrias Tipos 2 e 3 (FIM)	5 microgramas
Antigénio de superfície da hepatite B[2],[3]	10 microgramas
Poliovírus (inativado)[4]:	
Tipo 1 (Mahoney)	40 unidades do antigénio D[5];
Tipo 2 (MEF-1)	8 unidades do antigénio D[5]
Tipo 3 (Saukett)	32 unidades do antigénio D[5]
Polissacárido de *Haemophilus influenzae* tipo b	
(fosfato de poliribosilribitol [PRP])	3 microgramas
Conjugado com proteína meningocócica[2]	50 microgramas

[1] adsorvida em fosfato de alumínio (0,17 mg Al^{3+})
[2] adsorvida em sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo (0,15 mg Al^{3+})
[3] produzido em levedura (*Saccharomyces cerevisiae*) por tecnologia de ADN recombinante
[4] produzido em células Vero
[5] ou quantidade antigénica equivalente determinada por método imunoquímico adequado.
[6] ou atividade equivalente determinada através de uma avaliação de imunogenicidade.