



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/82162/2025
EMA/H/C/006467

Usymro (*ustecinumab*)

Um resumo sobre Usymro e por que está autorizado na UE

O que é Usymro e para que é utilizado?

Usymro é um medicamento utilizado no tratamento de:

- psoríase em placas moderada a grave (uma doença que causa manchas vermelhas e escamosas na pele). É utilizado em adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade cuja doença não tenha melhorado com outras terapêuticas sistêmicas (que abrangem todo o organismo) para a psoríase, como ciclosporina, metotrexato ou PUVA (radiação ultravioleta A associada à administração de psoraleno) ou que não as possam utilizar. PUVA é um tipo de tratamento em que o doente recebe um medicamento denominado psoraleno, antes de ser exposto à luz ultravioleta;
- artrite psoriática ativa (inflamação das articulações associada à psoríase) em adultos, quando a doença não tenha melhorado suficientemente com outros tratamentos denominados «medicamentos antirreumáticos modificadores da doença» (DMARD). Usymro pode ser utilizado isoladamente ou em associação com metotrexato (um DMARD);
- doença de Crohn ativa moderada a grave (uma doença que causa a inflamação do intestino) em adultos e crianças que pesem pelo menos 40 kg e cuja doença não tenha melhorado suficientemente com outros tratamentos ou que não possam receber outros tratamentos.

Usymro contém a substância ativa ustecinumab e é um medicamento biológico. É um medicamento biossimilar, o que significa que Usymro é altamente similar a outro medicamento biológico (medicamento de referência) já autorizado na UE. O medicamento de referência para Usymro é Stelara. Para mais informações sobre os medicamentos biossimilares, consulte [aqui](#).

Como se utiliza Usymro?

Usymro só pode ser obtido mediante receita médica e deve ser utilizado sob a supervisão de um médico com experiência no diagnóstico e tratamento das doenças para as quais Usymro está indicado.

Na psoríase em placas e na artrite psoriática, Usymro é administrado sob a forma de injeção por via subcutânea (sob a pele). A primeira injeção é seguida por outra injeção 4 semanas mais tarde. Em seguida, é administrada uma injeção a cada 12 semanas.

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



Na doença de Crohn, o tratamento com Usymro é iniciado na forma de uma perfusão (administração gota a gota) numa veia durante, pelo menos, 1 hora. Oito semanas após a primeira perfusão, Usymro é administrado através de injeção por via subcutânea. Os doentes continuam o tratamento com Usymro através de injeção por via subcutânea a cada 8 ou 12 semanas, dependendo da resposta ao tratamento.

Após receberem treino adequado, os doentes ou prestadores de cuidados podem injetar Usymro, se o médico considerar adequado.

Para mais informações sobre a utilização de Usymro, consulte o Folheto Informativo ou contacte o seu médico ou farmacêutico.

Como funciona Usymro?

A substância ativa de Usymro, o ustecinumab, é um anticorpo monoclonal, um tipo de proteína que foi concebida para reconhecer e ligar-se a uma estrutura específica que se encontra no organismo. O ustecinumab liga-se a 2 moléculas mensageiras no sistema imunitário denominadas interleucina 12 e interleucina 23. Ambas estão envolvidas na inflamação e noutros processos que são importantes na psoríase, na artrite psoriática e na doença de Crohn. Ao ligar-se a estas moléculas e bloquear a sua atividade, o ustecinumab reduz a atividade do sistema imunitário e os sintomas destas doenças.

Quais os benefícios demonstrados por Usymro durante os estudos?

Os estudos laboratoriais realizados que compararam Usymro com Stelara mostraram que a substância ativa de Usymro é altamente similar à substância ativa de Stelara em termos de estrutura, pureza e atividade biológica. Esses estudos também mostraram que a administração de Usymro produz níveis da substância ativa no organismo semelhantes aos observados com Stelara.

Além disso, um estudo realizado em 556 adultos com psoríase em placas moderada a grave mostrou que Usymro foi tão eficaz como Stelara na melhoria dos sintomas da doença. Após 8 semanas de tratamento, as pontuações PASI (uma medida de avaliação da gravidade da doença e da área de pele afetada) melhoraram em cerca de 76 % nas pessoas que receberam Usymro e em cerca de 77 % nas que receberam Stelara.

Dado que Usymro é um medicamento biossimilar, não é necessário repetir todos os estudos sobre a eficácia do ustecinumab realizados com Stelara.

Quais são os riscos associados a Usymro?

Para a lista completa de efeitos secundários e de restrições de utilização de Usymro, consulte o Folheto Informativo.

A segurança de Usymro foi avaliada e, com base em todos os estudos realizados, considera-se que os efeitos secundários do medicamento são comparáveis aos do medicamento de referência Stelara.

Os efeitos secundários mais frequentes associados ao ustecinumab (que podem afetar mais de 1 em cada 20 pessoas) incluem dor de cabeça e nasofaringite (inflamação do nariz e da garganta). O efeito secundário mais grave associado ao ustecinumab (que pode afetar 1 em cada 1000 pessoas) é a reação de hipersensibilidade (reação alérgica) grave, incluindo anafilaxia (reação alérgica súbita e grave com dificuldade em respirar, inchaço, sensação de desmaio, batimento cardíaco acelerado, suores e perda de consciência).

Usymro é contraindicado em doentes com uma infeção ativa que o médico considere importante.

Por que foi aprovado Usymro?

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que, em conformidade com os requisitos da UE para os medicamentos biossimilares, Usymro tem uma estrutura, uma pureza e uma atividade biológica altamente similares à de Stelara e é distribuído no organismo da mesma forma. Além disso, um estudo realizado em adultos com psoríase em placas mostrou que Usymro e Stelara são equivalentes em termos de segurança e eficácia na psoríase em placas.

Todos estes dados foram considerados suficientes para concluir que Usymro terá os mesmos efeitos que Stelara nas suas utilizações aprovadas. Por conseguinte, a Agência considerou que, à semelhança de Stelara, os benefícios de Usymro são superiores aos riscos identificados e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE.

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz de Usymro?

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram incluídas recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização segura e eficaz de Usymro.

Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Usymro são continuamente monitorizados. Os efeitos secundários comunicados com Usymro são cuidadosamente avaliados e são tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes.

Outras informações sobre Usymro

Estão disponíveis mais informações sobre o medicamento no sítio Web da Agência:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/usymro.