

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	10 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	32 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	100 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini și pisici	Administrare subcutanată sau intravenoasă (câini); administrare subcutanată (pisici)	Flacon (sticlă)	10 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); administrare intramusculară (porcine); administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	50 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/ cabaline) Lapte: 5 zile

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspensie orală	Cabaline	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: 3 zile
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	100 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Câini și pisici	Administrare subcutanată sau intravenoasă (câini), administrare subcutanată (pisici)	Flacon (sticlă)	20 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	15 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	30 ml	1 flacon	Nu este cazul

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	50 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	100 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine cabaline) Lapte: 5 zile
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Pisici, porci de Guineea	Administrare orală	Polietilenă flacon	15 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	20 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	20 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensie orală	Câini	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	180 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspensie orală	Cabaline	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	250 ml	1 flacon	Carne și organe: 3 zile
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	250 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine și cabaline	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine), administrare intramusculară (porcine), administrare intravenoasă (cabaline)	Flacon (sticlă)	250 ml	6 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine/cabaline) Lapte: 5 zile

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Pisici, porci de Guineea	Administrare orală	Polietilenă flacon	10 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Pisici, porci de Guineea	Administrare orală	Polietilenă flacon	3 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	20ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	20 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	50 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, porcine	Administrare subcutanată sau intravenoasă (bovine); Administrare intramusculară (porcine)	Flacon (sticlă)	50 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (porcine)

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Pisici	Administrare subcutanată	Flacon (sticlă)	10 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Soluție injectabilă	Pisici	Administrare subcutanată	Flacon (sticlă)	20 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspensie orală	Porcine	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: 5 zile
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspensie orală	Porcine	Administrare orală	Flacon (polietilenă)	250 ml	1 flacon	Carne și organe: 5 zile
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	1 blister (7 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	12 blistere (84 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	36 blistere (252 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	1 blister (7 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	12 blistere (84 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Comprimate masticabile	Câini	Administrare orală	Blistere (Alu/Alu)	7 comprimate	36 blistere (252 comprimate)	Nu este cazul
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensie orală	Pisici, porci de Guineea	Administrare orală	Polietilenă flacon	30 ml	1 flacon	Nu este cazul
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și cabaline	Administrare Intravenoasă (bovine și cabaline); Administrare subcutanată (bovine)	Flacon (sticlă)	50 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (cabaline) Lapte: 5 zile (bovine)

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și cabaline	Administrare Intravenoasă (bovine și cabaline); Administrare subcutanată (bovine)	Flacon (sticlă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (cabaline) Lapte: 5 zile (bovine)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și cabaline	Administrare Intravenoasă (bovine și cabaline); Administrare subcutanată (bovine)	Flacon (sticlă)	50 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (cabaline) Lapte: 5 zile (bovine)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine și cabaline	Administrare Intravenoasă (bovine și cabaline); Administrare subcutanată (bovine)	Flacon (sticlă)	100 ml	12 flacoane	Carne și organe: 15 zile (bovine), 5 zile (cabaline) Lapte: 5 zile (bovine)