

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	10 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	32 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	100 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Psy a mačky	Subkutánne alebo intravenózne použitie (psy), subkutánne použitie (mačky)	Injekčná liekovka (sklo)	10 ml	1 injekčná liekovka	Netýka sa.
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Perorálna suspenzia	Kone	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	100 ml	1 fľaša	Mäso a vnútornosti: 3 dni.
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Psy a mačky	Subkutánne alebo intravenózne použitie (psy), subkutánne (mačky)	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	1 injekčná liekovka	Netýka sa.
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	15 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	30 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/026	Metacam	0.5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Mačky, morčatá	Perorálne použitie	Polyetylén fľaša	15 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	1 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Psy	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	180 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Perorálna suspenzia	Kone	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	250 ml	1 fľaša	Mäso a vnútornosti: 3 dni
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	250 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a kone	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané), intravenózne použitie (kone)	Injekčná liekovka (sklo)	250 ml	6 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané) Mlieko: 5 dní.
EU/2/97/004/033	Metacam	0.5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Mačky, morčatá	Perorálne použitie	Polyetylén fľaša	10 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/034	Metacam	0.5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Mačky, morčatá	Perorálne použitie	Polyetylén fľaša	3 ml	1 fľaša	Netýka sa.
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané	Subkutánne alebo intravenózne použitie (hovädzí dobytok), intramuskulárne použitie (ošípané)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (ošípané).
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky	Subkutánne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	10 ml	1 injekčná liekovka	Netýka sa.
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injekčný roztok	Mačky	Subkutánne použitie	Injekčná liekovka (sklo)	20 ml	1 injekčná liekovka	Netýka sa.
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Perorálna suspenzia	Ošípané	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	100 ml	1 fľaša	Mäso a vnútornosti: 5 dni
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Perorálna suspenzia	Ošípané	Perorálne použitie	Fľaša (polyetylén)	250 ml	1 fľaša	Mäso a vnútornosti: 5 dni
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	1 blister (7 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	12 blisterov (84 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	36 blisterov (252 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	1 blister (7 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	12 blisterov (84 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Žuvacie tablety	Psy	Perorálne použitie	Blistre (Alu/Alu)	7 tabliet	36 blisterov (252 tabliet)	Netýka sa.
EU/2/97/004/049	Metacam	0.5 mg/ml	Perorálna suspenzia	Mačky, morčatá	Perorálne použitie	Polyetylén fľaša	30 ml	1 fľaša	Netýka sa.

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a kone	Intravenózne použitie (hovädzí dobytok a kone), subkutánne použitie (hovädzí dobytok)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a kone	Intravenózne použitie (hovädzí dobytok a kone), subkutánne použitie (hovädzí dobytok)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	1 injekčná liekovka	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a kone	Intravenózne použitie (hovädzí dobytok a kone), subkutánne použitie (hovädzí dobytok)	Injekčná liekovka (sklo)	50 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok a kone	Intravenózne použitie (hovädzí dobytok a kone), subkutánne použitie (hovädzí dobytok)	Injekčná liekovka (sklo)	100 ml	12 injekčných liekoviek	Mäso a vnútornosti: 15 dní (hovädzí dobytok), 5 dní (kone) Mlieko: 5 dní (hovädzí dobytok)