

<u>EU (MA) številka</u>	<u>Izmišljen o ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Ciljna živalska vrsta</u>	<u>Način uporabe</u>	<u>Pakiranje</u>	<u>Vsebina</u>	<u>Velikost pakiranja</u>	<u>Karenca</u>
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči in konji	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba Konji: intravenska uporaba	viala (steklo)	50 ml	1 viala	Govedo meso in organi: 15 dni mleko: 5 dni Prašiči in konji meso in organi: 5 dni
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči in konji	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba Konji: intravenska uporaba	viala (steklo)	100 ml	1 viala	Govedo meso in organi: 15 dni mleko: 5 dni Prašiči in konji meso in organi: 5 dni
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo, prašiči in konji	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba Konji: intravenska uporaba	viala (steklo)	250 ml	1 viala	Govedo meso in organi: 15 dni mleko: 5 dni Prašiči in konji meso in organi: 5 dni
EMA/V/C/002283/X/ 013	Emdocam	15 mg/ml	peroralna suspenzija	konji	peroralno	viala (polietilen)	125 ml	1 viala	Meso in organi: 3 dni
EMA/V/C/002283/X/ 013	Emdocam	15 mg/ml	peroralna suspenzija	konji	peroralno	viala (polietilen)	336 ml	1 viala	Meso in organi: 3 dni

EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	Psi: subkutana ali intravenska uporaba Mačke: subkutana uporaba	viala (steklo)	20 ml	1 viala	ni smiselno
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	psi, mačke	Psi: subkutana ali intravenska uporaba Mačke: subkutana uporaba	viala (steklo)	50 ml	1 viala	ni smiselno
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo in prašiči	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba	viala (steklo)	50 ml	1 viala	Govedo: meso in organi: 15 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo in prašiči	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba	viala (steklo)	100 ml	1 viala	Govedo: meso in organi: 15 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	raztopina za injiciranje	govedo in prašiči	Govedo: subkutana ali intravenska uporaba Prašiči: intramuskularna uporaba	viala (steklo)	250 ml	1 viala	Govedo: meso in organi: 15 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni