

<u>Številka EU</u>	<u>(Izmišljeno) ime</u>	<u>Jakost</u>	<u>Farmacevtska oblika</u>	<u>Pot uporabe</u>	<u>Ovojnina</u>	<u>Vsebina (koncentracija)</u>	<u>Velikost pakiranja</u>
EU/1/08/463/001	Relistor	12 mg/0,6 ml	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	viala (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	1 viala
EU/1/08/463/002	Relistor	12 mg/0,6 ml	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	viala (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 viali + 2 sterilni brizgi + 4 alkoholni zloženci
EU/1/08/463/003	Relistor	12 mg/0,6 ml	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	viala (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 vial + 7 sterilnih brizg + 14 alkoholnih zložencev
EU/1/08/463/004	Relistor	8 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (20 mg/ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/08/463/005	Relistor	8 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (20 mg/ml)	7 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/006	Relistor	8 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (20 mg/ml)	8 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/007	Relistor	8 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,4 ml (20 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/008	Relistor	12 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	4 napolnjene injekcijske brizge
EU/1/08/463/009	Relistor	12 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/010	Relistor	12 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	8 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/011	Relistor	12 mg	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	napolnjena injekcijska brizga (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	10 napolnjenih injekcijskih brizg
EU/1/08/463/012	Relistor	12 mg/0,6 ml	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	viala (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	2 viali + 2 sterilni brizgi z iglo z varovalom + 4 alkoholni zloženci
EU/1/08/463/013	Relistor	12 mg/0,6 ml	raztopina za injiciranje	subkutana uporaba	viala (steklena)	0,6 ml (20 mg/ml)	7 vial + 7 sterilnih brizg z iglo z varovalom + 14 alkoholnih zložencev