

<u>EMA:s procedurnummer</u>	<u>(Läkemedlets) namn</u>	<u>Styrka</u>	<u>Läkemedelsform</u>	<u>Administrerings sätt</u>	<u>Innerförpackning</u>	<u>Innehåll (koncentration)</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: injektionsflaska (typ I glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 injektionsflaska
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: injektionsflaska (typ I glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 injektionsflaskor
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta utan nål
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor utan nål
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta + 1 nål
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor + 10 nålar

EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta + 2 nålar
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 förfyllda sprutor + 20 nålar
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0,5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor + 20 nålar
EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension	Subkutan eller intramuskulär användning	Pulver: injektionsflaska (typ I glas) Lösning: förfylld spruta (typ I glas)	0.5 ml	20 injektionsflaskor + 20 förfyllda sprutor + 40 nålar

§ Levande försvagat mässlingvirus¹, stam Enders Edmonston inte mindre än 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
 Levande försvagat påssjukevirus¹, stam Jeryl LynnTM (B nivå).. inte mindre än 4,30 log₁₀ TCID₅₀*
 Levande försvagat rubellavirus², stam Wistar RA 27/3) inte mindre än 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
 Levande försvagat varicellavirus³, stam Oka/Merck)..... inte mindre än 3,99 log₁₀ PFU**

* 50% tissue culture infectious dose

** plaque-forming units

(¹) Framställt i kycklingembryocellkultur.

(²) Framställt i humana diploida lungfibroblaster (WI-38).

(³) Framställt i humana diploida (MRC-5) celler.