

<u>MTnr</u>	<u>(Läkemedlets) namn</u>	<u>Styrka</u>	<u>Läkemedelsform</u>	<u>Administrerings- sätt</u>	<u>Inner- förpackning</u>	<u>Innehåll (koncentration)</u>	<u>Förpackningsstorlek</u>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Injektions- flaska (glas)	2 ml (150 mg/ml)	1 injektionsflaska + 1 spruta + 2 nålar
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Injektions- flaska (glas)	2 ml (150 mg/ml)	2 (2 × 1) injektionsflaskor + 2 (2 × 1) sprutor + 4 (2 × 2) nålar (multiförpackning)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Injektions- flaska (glas)	2 ml (150 mg/ml)	6 (6 × 1) injektionsflaskor + 6 (6 × 1) sprutor + 12 (6 × 2) nålar (multiförpackning)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	2 ml (150 mg/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	2 ml (150 mg/ml)	2 förfyllda sprutor
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) förfyllda sprutor (multiförpackning)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	1 ml (150 mg/ml)	1 förfylld spruta
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	1 ml (150 mg/ml)	2 förfyllda sprutor
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas)	1 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) förfyllda sprutor (multiförpackning)
EU/1/18/1340/010	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas) i förfylld injektions- penna	2 ml (150 mg/ml)	1 förfylld injektionspenna
EU/1/18/1340/011	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas) i förfylld injektions- penna	2 ml (150 mg/ml)	2 förfyllda injektionspennor
EU/1/18/1340/012	TAKHZYRO	300 mg	Injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	Förfylld spruta (glas) i förfylld injektions- penna	2 ml (150 mg/ml)	6 (3 × 2) förfyllda injektionspennor (multiförpackning)