

VEDLEGG I
PREPARATOMTALE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mikrogram seleksipag.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 400 mikrogram seleksipag.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mikrogram seleksipag.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 800 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 000 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 200 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 400 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 600 mikrogram seleksipag.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Filmdrasjert tablett

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 3,0 mm i diameter, lysegul, filmdrasjert tablett med “1” preget på den ene siden.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, lysegul, filmdrasjert tablett med “2” preget på den ene siden.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, rød, filmdrasjert tablett med “4” preget på den ene siden.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, lysfiolett, filmdrasjert tablett med “6” preget på den ene siden.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, grønn, filmdrasjert tablett med “8” preget på den ene siden.

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, oransje, filmdrasjert tablett med “10” preget på den ene siden.

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, mørkfiolett, filmdrasjert tablett med “12” preget på den ene siden.

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, mørkegul, filmdrasjert tablett med “14” preget på den ene siden.

Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, 7,3 mm i diameter, brun, filmdrasjert tablett med “16” preget på den ene siden.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjon

Uptravi er indisert for langvarig behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne pasienter i WHO funksjonsklasse (FC) II–III, enten som kombinasjonsbehandling hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med en endotelinreseptor-antagonist (ERA) og/eller en PDE-5-hemmer (hemmer av fosfodiesterase type 5), eller som monoterapi hos pasienter som disse behandlingene ikke er egnet for.

Effekt er vist i en PAH-populasjon, inkludert idiopatisk og arvelig PAH, PAH relatert til bindevevssykdom og PAH relatert til korrigert og ukomplisert medfødt hjertesykdom (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen skal kun igangsettes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.

Dosering

Individuell dosetitrering

Hver pasient skal opptitreres til høyeste individuelt tolererte dose, som kan være i området fra 200 mikrogram to ganger daglig til 1 600 mikrogram to ganger daglig (individuell vedlikeholdsdose).

Anbefalt startdose er 200 mikrogram to ganger daglig, med omtrent 12 timers mellomrom. Dosen økes trinnvis med 200 mikrogram to ganger daglig, vanligvis med en ukes mellomrom. I begynnelsen av behandlingen og ved hvert opptitreringstrinn er det anbefalt å ta første dose om kvelden. Under dosetitreringen kan det forekomme bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til seleksipag (som hodepine, diaré, kvalme og oppkast, kjevesmerte, myalgi, smerte i ekstremiteter, artralgi og rødme). Disse bivirkningene er vanligvis forbigående eller kan kontrolleres med symptomatisk behandling (se pkt. 4.8). Dersom en pasient øker til en dose som ikke tolereres, skal dosen reduseres til forrige dosenivå.

Hos pasienter der opptitrering ble begrenset av andre årsaker enn bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til seleksipag, kan man vurdere et nytt forsøk på opptitrering til høyeste individuelt tolererte dose, inntil en maksimumsdose på 1 600 mikrogram to ganger daglig.

Individuell vedlikeholdsdose

Vedlikeholdsdosen skal være høyeste tolererte dose som ble nådd under dosetitreringen. Dersom behandlingen etter en tid tåles dårligere ved en gitt dose, skal symptomatisk behandling og/eller dosereduksjon til forrige lavere dose vurderes.

Avbrytelse og seponering

Dersom en dose blir glemt, skal den tas så snart som mulig. Den glemte dosen skal ikke tas dersom neste planlagte dose skal tas i løpet av ca. 6 timer.

Dersom behandlingen blir glemt i 3 dager eller mer, skal behandlingen med Uptravi gjenopptas ved en lavere dose og deretter opptitreres.

Det er begrenset erfaring med brå seponering av seleksipag hos pasienter med PAH. Det er ingen evidens for akutt rebound-effekt.

Dersom det tas en beslutning om å seponere Uptravi, skal det gjøres gradvis mens en alternativ behandling blir introdusert.

Dosejustering ved samtidig administrasjon av moderate CYP2C8-hemmere

Ved samtidig administrasjon av moderate CYP2C8-hemmere (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid), skal total døgndose av Uptravi reduseres til det halve ved å administrere halvparten av hver dose to ganger daglig. Alternativt kan en doseringsfrekvens på én gang daglig, for å oppnå halvparten av døgndosen av Uptravi, opprettholdes hos pasienter som allerede er velkontrollert ved doseringsregime én gang daglig, eller kan brukes hos pasienter hvor relevant(e) dosestyrke(r) for dosering med halvparten av dosen to ganger daglig ikke er tilgjengelig(e). Dersom behandlingen ikke tolereres ved en gitt dose, skal symptomatisk behandling og/eller en dosereduksjon til neste lavere dose vurderes. Når samtidig administrasjon av en moderat CYP2C8-hemmer avsluttes, skal total døgndose av Uptravi økes, hvis aktuelt. Maksimumsdosen på 1 600 mikrogram to ganger daglig skal ikke overskrides (se pkt. 4.5).

Spesielle populasjoner

Eldre (≥ 65 år)

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre personer (se pkt. 5.2). Det er begrenset klinisk erfaring med pasienter over 75 år. Uptravi skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen (se pkt. 4.4).

Nedsatt leverfunksjon

Seleksipag skal ikke administreres til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C; se pkt. 4.4). For pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) skal startdosen av behandlingen være 100 mikrogram to ganger daglig, og dosen bør økes trinnvis med ukentlig intervall på 100 mikrogram to ganger daglig, inntil det oppstår bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til seleksipag og som ikke tolereres eller kontrolleres medisinsk. Hos disse pasientene er maksimumsdosen 800 mikrogram to ganger daglig. Alternativt kan en doseringsfrekvens på én gang daglig, for å oppnå halvparten av døgndosen av Uptravi, opprettholdes hos pasienter som allerede er velkontrollert ved doseringsregime én gang daglig, eller kan brukes hos pasienter hvor relevant(e) dosestyrke(r) for dosering med halvparten av dosen to ganger daglig ikke er tilgjengelig(e). Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A).

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Det er ikke nødvendig å endre startdosen hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert glomerulær filtrasjonsrate [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m²). Dosetitrering skal utføres med forsiktighet hos disse pasientene (se pkt. 4.4).

Pediatrik populasjon

Sikkerhet og effekt av seleksipag hos barn i alderen 0 år til yngre enn 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Administrering av seleksipag i den pediatrike populasjonen er ikke anbefalt. Dyrestudier indikerer økt risiko for invaginasjon, men den kliniske relevans av disse funnene er ikke kjent (se pkt. 5.3).

Administrasjonsmåte

Oral bruk.

De filmdrasjerte tablettene skal tas peroralt morgen og kveld. For å bedre tolerabiliteten er det anbefalt å ta Uptravi med mat. I begynnelsen av hver opptitreringsfase skal første økte dose tas om kvelden.

De filmdrasjerte tablettene skal svelges med vann. Tablettene skal ikke deles eller knuses, da tablettdrasjeringen beskytter virkestoffet mot lys.

Svaksynte eller blinde pasienter skal oppfordres til å be en annen person om hjelp når de skal ta Uptravi i titreringsperioden.

4.3 Kontraindikasjoner

- Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
- Alvorlig koronar hjertesykdom eller ustabil angina.
- Hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene.
- Dekompensert hjertesvikt, såfremt den ikke er under nøye medisinsk overvåking.
- Alvorlige arytmier.
- Cerebrovaskulære hendelser (f.eks. transient iskemisk anfall, slag) i løpet av de siste 3 månedene.
- Medfødt eller ervervet klaffefeil med klinisk relevant forstyrrelse av myokardfunksjonen, som ikke er relatert til pulmonal hypertensjon.
- Samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil, se pkt. 4.5).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Hypotensjon

Seleksipag har vasodilaterende egenskaper som kan føre til redusert blodtrykk. Før forskrivning av Uptravi skal legen vurdere nøye om pasienter med visse underliggende tilstander kan bli negativt påvirket av den vasodilaterende effekten (f.eks. pasienter på antihypertensiv behandling eller pasienter

med hypotensjon ved hvile, hypovolemi, alvorlig obstruksjon i venstre ventrikkels utløp eller autonom dysfunksjon) (se pkt. 4.8).

Hypertyreoidisme

Hypertyreoidisme er observert i forbindelse med Uptravi. Testing av skjoldbruskkjertelens funksjon anbefales når det er klinisk indisert basert på tegn eller symptomer på hypertyreoidisme (se pkt. 4.8).

Veno-okklusiv lungesykdom

Det er rapportert tilfeller av lungeødem ved bruk av vasodilatorer (hovedsakelig prostasyklinere) hos pasienter med veno-okklusiv lungesykdom. Muligheten for veno-okklusiv lungesykdom skal derfor tas i betraktning dersom tegn på lungeødem forekommer når Uptravi blir administrert til pasienter med PAH. Dersom det blir bekreftet, skal behandlingen seponeres.

Eldre (≥ 65 år)

Det er begrenset klinisk erfaring med seleksipag hos pasienter over 75 år, og Uptravi skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen (se pkt. 4.2).

Nedsatt leverfunksjon

Det er ingen klinisk erfaring med seleksipag hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C), og behandling skal derfor ikke administreres til disse pasientene. Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten er høyere hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B; se pkt. 5.2). Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon bør total døgndose av Uptravi reduseres (se pkt. 4.2).

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ($eGFR < 30$ ml/min/1,73 m²) må det utvises forsiktighet under dosetitrering. Det er ingen erfaring med Uptravi hos pasienter som får dialyse (se pkt. 5.2), og Uptravi skal derfor ikke brukes hos disse pasientene.

Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder, må bruke effektiv antikonsepsjon mens de bruker seleksipag (se pkt. 4.6).

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Andre legemidlers effekt på seleksipag

Seleksipag blir hydrolysert til sin aktive metabolitt av karboksylesteraser (se pkt. 5.2). Både seleksipag og den aktive metabolitten gjennomgår oksidativ metabolisering hovedsakelig av CYP2C8 og i mindre grad av CYP3A4. Glukuronideringen av den aktive metabolitten katalyseres av UGT1A3 og UGT2B7. Seleksipag og den aktive metabolitten er substrater for OATP1B1 og OATP1B3. Seleksipag er et svakt substrat for efflukspumpen P-glykoprotein (P-gp). Den aktive metabolitten er et svakt substrat for brystkreftresistens-protein (BCRP).

Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten blir ikke påvirket av warfarin.

Hemmere av CYP2C8

Bruk av 600 mg gemfibrozil, en sterk CYP2C8-hemmer, to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten, den største bidragsyteren til effekt, økte omtrent 11 ganger. Samtidig administrasjon av Uptravi med sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er kontraindisert (se pkt. 4.3).

Samtidig administrasjon av Uptravi med klopidogrel (metningsdose på 300 mg eller vedlikeholdsdose på 75 mg en gang daglig), en moderat CYP2C8-hemmer, hadde ingen relevant effekt på eksponeringen for seleksipag, men økte eksponeringen for den aktive metabolitten ca. 2,2 og 2,7 ganger etter henholdsvis metningsdose og vedlikeholdsdose. Total døgndose av Uptravi skal reduseres ved å halvere hver dose ved samtidig administrasjon av moderate CYP2C8-hemmere (f.eks. klopidogrel, deferasiroks og teriflunomid). Alternativt kan en doseringsfrekvens på én gang daglig, for å oppnå halvparten av døgndosen av Uptravi, opprettholdes hos pasienter som allerede er velkontrollert ved doseringsregime én gang daglig, eller kan brukes hos pasienter hvor relevant(e) dosestyrke(r) for dosering med halvparten av dosen to ganger daglig ikke er tilgjengelig(e). Når samtidig administrasjon av en moderat CYP2C8-hemmer avsluttes, økes total døgndose av Uptravi, hvis aktuelt. Maksimumsdosen på 1 600 mikrogram to ganger daglig skal ikke overskrides (se pkt. 4.2).

Induktorer av CYP2C8

Bruk av 600 mg rifampicin, en induktor av CYP2C8 (og UGT-enzymene), én gang daglig, ga ingen endring i eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ble halvert. Dosejustering av seleksipag kan være nødvendig ved samtidig administrasjon av CYP2C8-induktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin).

Hemmere av UGT1A3 og UGT2B7

Effekten av sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere (valproinsyre, probenecid og flukonazol), på eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten, er ikke studert. Det må utvises forsiktighet når disse legemidlene blir administrert samtidig med Uptravi. En potensiell farmakokinetisk interaksjon med sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere kan ikke utelukkes.

Hemmere og induktorer av CYP3A4

Bruk av 400 mg/100 mg lopinavir/ritonavir, en sterk CYP3A4-hemmer, to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten av seleksipag ikke ble endret. Tatt i betraktning at den aktive metabolitten er 37 ganger mer potent, er denne effekten ikke klinisk relevant. At en sterk hemmer av CYP3A4 ikke påvirker farmakokinetikken til den aktive metabolitten, indikerer at CYP3A4 ikke er viktig for eliminering av den aktive metabolitten, og det forventes ikke at CYP3A4-induktorer skal ha noen effekt på farmakokinetikken til den aktive metabolitten.

PAH-spesifikke behandlinger

I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter, førte bruk av seleksipag i kombinasjon med både en ERA og en PDE-5-hemmer til 30 % lavere eksponering for den aktive metabolitten.

Transportørhemmere (lopinavir/ritonavir)

Bruk av lopinavir/ritonavir, en sterk hemmer av OATP (OATP1B1 og OATP1B3) og av P-gp, i dosen 400 mg/100 mg to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten av seleksipag ikke ble endret. Siden den farmakologiske effekten hovedsakelig skyldes den aktive metabolitten, er dette ikke klinisk relevant.

Effekten av seleksipag på andre legemidler

Seleksipag og den aktive metabolitten hemmer eller inducerer ikke cytokrom P450-enzymene og transportenzymene ved klinisk relevante konsentrasjoner.

Antikoagulanter eller hemmere av blodplateaggregering

Seleksipag hemmer blodplateaggregering *in vitro*. I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter ble ingen økt blødningsrisiko påvist med seleksipag sammenlignet med placebo, heller ikke når seleksipag ble administrert med antikoagulanter (som heparin, antikoagulanter av kumarin-type) eller hemmere av blodplateaggregering. I en studie med friske personer endret ikke seleksipag (400 mikrogram to ganger daglig) eksponeringen for S-warfarin (CYP2C9-substrat) eller R-warfarin (CYP3A4-substrat) etter en enkeltdose på 20 mg warfarin. Seleksipag påvirker ikke den farmakodynamiske effekten av warfarin på INR (internasjonalt normalisert ratio).

Midazolam

Ved steady state etter opptitrering til 1 600 mikrogram seleksipag to ganger om dagen ble det ikke observert noen klinisk relevant endring i eksponering for midazolam, et sensitivt intestinalt og hepatisk CYP3A4-substrat, eller dets metabolitt, 1-hydroksymidazolam. Samtidig administrering av seleksipag med CYP3A4-substrater krever ikke dosejustering.

Hormonelle antikonseptiva

Spesifikke interaksjonsstudier med hormonelle antikonseptiva er ikke utført. Siden seleksipag ikke påvirker eksponeringen for CYP3A4-substratene midazolam og R-warfarin eller CYP2C9-substratet S-warfarin, er redusert effekt av hormonelle antikonseptiva ikke forventet.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder må bruke effektiv antikonsepsjon mens de bruker seleksipag (se pkt. 4.4).

Graviditet

Det er ingen data på bruk av seleksipag hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet. Ved in vitro-testing av reproduksjonstoksisitet hadde seleksipag og dets hovedmetabolitt 20 til 80 ganger lavere aktivitet ved prostasyklin-reseptorer (IP-reseptorer) hos dyrearter enn hos mennesker. Sikkerhetsmarginene for potensielle IP-reseptor-medierte effekter på reproduksjon er derfor lavere enn for ikke-IP-relaterte effekter (se pkt. 5.3).

Uptravi er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.

Amming

Det er ikke kjent om seleksipag eller dets metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Hos rotter utskilles seleksipag eller dets metabolitter i melken (se pkt. 5.3). En risiko for et diende barn kan ikke utelukkes. Uptravi skal ikke brukes under amming.

Fertilitet

Ingen kliniske data er tilgjengelig. I rottestudier forårsaket seleksipag i høye doser forbigående forstyrrelser i østrussyklus, men påvirket ikke fertilitet (se pkt. 5.3). Eventuell relevans for mennesker er ikke kjent.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Uptravi har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasientens kliniske status og bivirkningsprofilen til seleksipag (som hodepine eller hypotensjon, se pkt. 4.8) skal tas i betraktning når man vurderer pasientens evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene er hodepine, diaré, kvalme og oppkast, kjevesmerte, myalgi, smerte i ekstremiteter, artralgi og rødme. Disse reaksjonene forekommer hyppigere under opptitreringsfasen. De fleste av disse reaksjonene er av lett til moderat intensitet.

Sikkerheten til seleksipag er evaluert i en langtids, placebo-kontrollert fase 3-studie med 1 156 pasienter med symptomatisk PAH. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 76,4 uker (median

70,7 uker) for pasienter som fikk seleksipag, mot 71,2 uker (median 63,7 uker) for pasienter som fikk placebo. Eksponeringen for seleksipag var opptil 4,2 år.

Bivirkningstabell

Bivirkninger fra den kliniske hovedstudien er oppgitt i tabellen nedenfor. Bivirkningene er rangert etter frekvens innenfor hvert organklasser (SOC) og presentert etter synkende alvorlighetsgrad. Frekvenser er definert som svært vanlige ($\geq 1/10$), vanlige ($\geq 1/100$ til $< 1/10$), mindre vanlige ($\geq 1/1000$ til $< 1/100$), sjeldne ($\geq 1/10000$ til $< 1/1000$), svært sjeldne ($< 1/10000$).

Organklasser	Svært vanlige	Vanlige	Mindre vanlige
Sykdommer i blod og lymfatiske organer		Anemi* Redusert hemoglobin*	
Endokrine sykdommer		Hypertyreoidisme* Redusert tyreoidastimulerende hormon	
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer		Nedsatt matlyst Redusert vekt	
Nevrologiske sykdommer	Hodepine*		
Hjertesykdommer			Sinustakykardi*
Karsykdommer	Rødme*	Hypotensjon*	
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum	Nasofaryngitt (av ikke-infeksiøs opprinnelse)	Nesetetthet	
Gastrointestinale sykdommer	Diaré* Oppkast* Kvalme*	Abdominal smerte Dyspepsi*	
Hud- og underhudssykdommer		Utslett Urtikaria Erytem	
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett	Kjevesmerte* Myalgi* Artralgi* Smerte i ekstremiteter*		
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet		Smerte	

* Se avsnittet Beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Farmakologiske effekter relatert til titrering og vedlikeholdsbehandling

Bivirkninger relatert til virkningsmekanismen til seleksipag, blir ofte observert, spesielt i perioden med individuell dosetitrering, og er oppgitt i tabellen nedenfor:

Prostasylignende/relaterte bivirkninger	Titrering		Vedlikehold	
	Seleksipag	Placebo	Seleksipag	Placebo
Hodepine	64 %	28 %	40 %	20 %
Diaré	36 %	12 %	30 %	13 %
Kvalme	29 %	13 %	20 %	10 %
Kjevesmerte	26 %	4 %	21 %	4 %
Myalgi	15 %	5 %	9 %	3 %

Smerte i ekstremiteter	14 %	5 %	13 %	6 %
Oppkast	14 %	4 %	8 %	6 %
Rødme	11 %	4 %	10 %	3 %
Artralgi	7 %	5 %	9 %	5 %

Disse bivirkningene er vanligvis forbigående eller kan vanligvis kontrolleres med symptomatisk behandling. Av pasientene på seleksipag seponerte 7,5 % behandlingen på grunn av disse bivirkningene. Den omtrentlige raten av bivirkninger som var alvorlige, var 2,3 % i seleksipag-gruppen og 0,5 % i placebo-gruppen. I klinisk praksis er det observert at gastrointestinale bivirkninger responderer på legemidler mot diaré, oppkast og kvalme og/eller legemidler mot funksjonelle gastrointestinale sykdommer. Smertefulle bivirkninger blir ofte behandlet med analgetika (som paracetamol).

Redusert hemoglobin

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med PAH-pasienter var gjennomsnittlig absolutt endring i hemoglobin ved regelmessige besøk sammenlignet med baseline, i området $-0,34$ til $-0,02$ g/dl i seleksipag-gruppen, mot $-0,05$ til $0,25$ g/dl i placebo-gruppen. En reduksjon i hemoglobinkonsentrasjon fra baseline til under 10 g/dl ble rapportert hos 8,6 % av de seleksipag-behandlede pasientene og hos 5,0 % av pasientene på placebo.

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med pasienter med nydiagnostisert PAH var gjennomsnittlig absolutt endring i hemoglobin ved regelmessige besøk sammenlignet med baseline, i området $-1,77$ til $-1,26$ g/dl i gruppen med trippelbehandling (seleksipag, macitentan, tadalafil), mot $-1,61$ til $-1,28$ g/dl i gruppen med dobbelbehandling (placebo, macitentan og tadalafil). En reduksjon i hemoglobinkonsentrasjon fra baseline til under 10 g/dl ble rapportert hos 19,0 % av pasientene i gruppen med trippelbehandling og 14,5 % i gruppen med dobbelbehandling. Anemi ble rapportert med frekvensen svært vanlig (13,4 %) i gruppen med trippelbehandling og frekvensen vanlig (8,3 %) i gruppen med dobbelbehandling.

Tester av tyreoidfunksjonen

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med PAH-pasienter ble hypertyreoidisme rapportert hos 1,6 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot ingen tilfeller i placebo-gruppen (se pkt. 4.4). I seleksipag-gruppen ble det observert en reduksjon (opptil $-0,3$ MU/liter fra en baseline median på 2,5 MU/liter) i median tyreoida-stimulerende hormon ved de fleste besøk. I placebo-gruppen var det liten endring i medianverdier. Det var ingen gjennomsnittsendringer i trijodtyronin eller tyroksin i noen av gruppene.

Økt hjertefrekvens

I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter ble det observert en forbigående økning i gjennomsnittlig hjertefrekvens på 3–4 bpm 2–4 timer etter administrering. Elektrokardiogram viste sinustakykardi hos 11,3 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot 8,8 % i placebo-gruppen (se pkt. 5.1).

Hypotensjon

I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter ble det rapportert hypotensjon hos 5,8 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot 3,8 % i placebo-gruppen. Gjennomsnittlig absolutt endring i systolisk blodtrykk ved regelmessige besøk sammenlignet med baseline, var i området $-2,0$ til $-1,5$ mmHg i seleksipag-gruppen, mot $-1,3$ til $0,0$ mmHg i placebo-gruppen, og i diastolisk blodtrykk i området $-1,6$ til $-0,1$ mmHg i seleksipag-gruppen, mot $-1,1$ til $0,3$ mmHg i placebo-gruppen. Fall i systolisk blodtrykk til under 90 mmHg ble registrert hos 9,7 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot 6,7 % i placebo-gruppen.

Dyspepsi

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med pasienter med nydiagnostisert PAH ble dyspepsi rapportert med frekvensen svært vanlig (16,8 %) hos pasienter som fikk trippelbehandling (seleksipag, macitentan, tadalafil) og frekvensen vanlig (8,3 %) hos pasienter som fikk dobbelbehandling (placebo, macitentan og tadalafil).

Langtidssikkerhet

Av de 1 156 pasientene som deltok i hovedstudien, gikk 709 pasienter inn i en åpen langtidsforlengelsesstudie (330 pasienter som fortsatte med seleksipag fra GRIPHON-studien og 379 pasienter som fikk placebo i GRIPHON og byttet til seleksipag). Langtidsoppfølging av pasienter behandlet med seleksipag med en median behandlingsvarighet på 30,5 måneder og maksimalt opptil 103 måneder, viste en sikkerhetsprofil som var tilsvarende den observert i den kliniske hovedstudien beskrevet ovenfor.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9 Overdosering

Det er rapportert isolerte tilfeller av overdose på opptil 3 200 mikrogram. Lett, forbigående kvalme var eneste rapporterte konsekvens. Ved overdosering må støttetiltak iverksettes etter behov. Dialyse er sannsynligvis ikke effektivt fordi seleksipag og den aktive metabolitten har høy grad av proteinbinding.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antitrombotiske midler, Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin. ATC-kode: B01AC27

Virkningsmekanisme

Seleksipag er en selektiv IP-reseptoragonist som skiller seg fra prostasyklin og dets analoger. Seleksipag blir hydrolysert av karboksylestaser til den aktive metabolitten, som er omtrent 37 ganger mer potent enn seleksipag. Seleksipag og den aktive metabolitten er IP-reseptoragonister med høy affinitet og selektivitet for IP-reseptoren i motsetning til andre prostanoid-reseptorer (EP₁–EP₄, DP, FP, og TP). Lav selektivitet for EP₁, EP₃, FP og TP er viktig fordi disse er velkjente kontraktile reseptorer i gastrointestinalkanalen og blodkar. Lav selektivitet for EP₂, EP₄ og DP₁ er viktig fordi disse reseptorene medierer immunsuppressive effekter.

Stimulering av IP-reseptoren med seleksipag og den aktive metabolitten fører til vasodilaterende samt anti-proliferative og anti-fibrotiske effekter. Seleksipag forhindret kardial og pulmonal remodellering i en rottemodell for PAH og forårsaket proporsjonal reduksjon i pulmonalt og perifert trykk. Dette indikerer at perifer vasodilatasjon gjenspeiler farmakodynamisk effekt i lungene. Seleksipag forårsaket ikke desensibilisering av IP-reseptorer *in vitro* eller takyfylakse i en rottemodell.

Farmakodynamiske effekter

Hjertets elektrofysiologi

I en omfattende QT-studie med friske personer ga gjentatte doser på 800 og 1 600 mikrogram seleksipag to ganger daglig ingen effekt på hjertets repolarisering (QT_c-intervall) eller ledning (PR- og QRS-intervaller), men hadde en lett akselererende effekt på hjertefrekvens (den placebo-korrigererte, baseline-korrigererte økningen av hjertefrekvens nådde 6–7 bpm 1,5 til 3 timer etter administrering av 800 mikrogram seleksipag, og 9–10 bpm på samme tidspunkt etter 1 600 mikrogram seleksipag).

Koagulasjonsfaktorer

I fase 1- og fase 2-studier ble det observert en lett reduksjon i plasmanivået av von Willebrand-faktor (vWF) med seleksipag; vWF-verdien holdt seg over nedre grenseverdi for normalområdet.

Pulmonal hemodynamikk

I en dobbelblind, placebo-kontrollert, klinisk fase 2-studie undersøkte man hemodynamiske variabler etter 17 ukers behandling av pasienter med PAH i WHO FC II–III som samtidig fikk ERA og/eller PDE-5-hemmer. Pasienter som titrerte seleksipag til en individuelt tolerert dose (200 mikrogram to ganger daglig trinnvis opp til 800 mikrogram to ganger daglig; N = 33), oppnådde en statistisk signifikant gjennomsnittlig reduksjon i pulmonal karmotstand på 30,3 % (95 % konfidensintervall [KI]: –44,7 %, –12,2 %; p = 0,0045) og en økning i hjerteindeks (gjennomsnittlig behandlingseffekt) på 0,48 liter/min/m² (95 % KI: 0,13; 0,83) sammenlignet med placebo (N = 10).

Klinisk sikkerhet og effekt

Effekt hos pasienter med PAH

Effekten av seleksipag på progresjonen av PAH ble vist i en multisenter, langtids (maksimal eksponeringsvarighet omtrent 4,2 år), dobbeltblind, placebo-kontrollert, parallellgruppe, hendelsestyrt fase 3-studie (GRIPHON) med 1 156 pasienter med symptomatisk (WHO FC I–IV) PAH. Pasientene ble randomisert til enten placebo (N = 582) eller seleksipag (N = 574) to ganger daglig. Dosen ble ukentlig økt med 200 mikrogram to ganger daglig for å bestemme den individuelle vedlikeholdsdosen (200–1 600 mikrogram to ganger daglig).

Det primære endepunktet for studien var tiden til første opptreden av en morbiditet eller død før avsluttet behandling, definert som et sammensatt endepunkt med død av alle årsaker; eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH; eller progresjon av PAH som medførte behov for lungetransplantasjon eller atrial ballongseptostomi; eller oppstart av parenteral prostanoid-behandling eller kronisk oksygenbehandling; eller andre hendelser som innebar sykdomsprogresjon (pasienter i WHO FC II eller III ved baseline) bekreftet med en reduksjon i 6-minutters gangdistanse (6MWD) fra baseline ($\geq 15\%$) og forverring av WHO FC eller (pasienter i WHO FC III eller IV ved baseline) bekreftet ved en reduksjon i 6MWD fra baseline ($\geq 15\%$) og behov for ytterligere PAH-spesifikk behandling.

Alle hendelser ble bekreftet av en uavhengig beslutningskomité som var blindet for behandlingsallokering.


Gjennomsnittsalderen var 48,1 år (intervall 18–80 år), og de fleste personene var med europeisk avstamning (65,0 %) og kvinner (79,8 %). 17,9 % av pasientene var ≥ 65 år og 1,1 % ≥ 75 år. Omtrent 1 %, 46 %, 53 % og 1 % av pasientene var i henholdsvis WHO FC I, II, III og IV ved baseline. Idiopatisk eller arvelig PAH var vanligste etiologi i studiepopulasjonen (58 %), fulgt av PAH forårsaket av bindevevssykdom (29 %), PAH relatert til korrigert og ukomplisert medfødt hjertesykdom (10 %), og PAH relatert til annen etiologi (legemidler og toksiner [2 %] og HIV [1 %]).

Ved baseline ble de fleste studiedeltakerne (80 %) behandlet med en stabil dose av en spesifikk behandling mot PAH, enten en ERA (15 %) eller en PDE-5-hemmer (32 %) eller både en ERA og en PDE-5-hemmer (33 %).

Total median dobbeltblind behandlingsvarighet var 63,7 uker for placebogruppen og 70,7 uker for seleksipag-gruppen. 23 % av pasientene på seleksipag oppnådde vedlikeholdsdoser i området 200–400 mikrogram, 31 % oppnådde doser i området 600–1 000 mikrogram, og 43 % oppnådde doser i området 1 200–1 600 mikrogram.

Behandling med seleksipag 200–1 600 mikrogram to ganger daglig førte til 40 % reduksjon (hasardratio [HR] 0,60; 99 % KI: 0,46, 0,78; ensidig log-rank p-verdi $< 0,0001$) i forekomsten av morbiditet eller død i inntil innen 7 dager etter siste dose, sammenlignet med placebo (Figur 1). Den fordelaktige effekten av seleksipag kunne primært tilskrives færre sykehusinnleggelser på grunn av PAH og en reduksjon i andre hendelser forårsaket av sykdomsprogresjon (Tabell 1).

Figur 1 Kaplan-Meier-estimer for første hendelse relatert til morbiditet/mortalitet



UPTRAVI-pasienter:

utsatt for risiko	574	455	361	246	171	101	40
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Placebo-pasienter:

utsatt for risiko	582	433	347	220	149	88	28
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Tabell 1 Oppsummering av endepunktshendelser

Endepunkt og statistikk	Pasienter med en hendelse		Sammenligning av behandling: seleksipag kontra placebo			
	Placebo (N=582)	Seleksipag (N=574)	Absolutt risiko-reduksjon	Relativ risiko-reduksjon (99 % KI)	HR (99 % KI)	p-verdi
Morbiditet/Mortalitetshendelse^a	58,3 %	41,8 %	16,5 %	40 % (22 %; 54 %)	0,60 (0,46; 0,78)	< 0,0001
Sykehusinnleggelse på grunn av PAH^b n (%)	109 (18,7 %)	78 (13,6 %)	5,1 %	33 % (2 %; 54 %)	0,67 (0,46; 0,98)	0,04
Sykdomsprogresjon^b	100 (17,2 %)	38 (6,6 %)	10,6 %	64 % (41 %; 78 %)	0,36 (0,22; 0,59)	< 0,0001

n (%)						
Oppstart av i.v./s.c. Prostanoid eller oksygenterapi^{b,c} n (%)	15 (2,6 %)	11 (1,9 %)	0,7 %	32 % (-90 %; 76 %)	0,68 (0,24; 1,90)	0,53
Død innen EOT + 7 dager^d n (%)	37 (6,4 %)	46 (8,0 %)	-1,7 %	-17 % (-107 %; 34 %)	1,17 (0,66; 2,07)	0,77
Død innen studie-avslutning^d n (%)	105 (18,0 %)	100 (17,4 %)	0,6 %	3 % (-39 %; 32 %)	0,97 (0,68; 1,39)	0,42

KI = konfidensintervall; EOT = end of treatment (avsluttet behandling); HR = hazard ratio; i.v. = intravenøs; PAH = pulmonal arteriell hypertensjon; s.c. = subkutant.

^a % av pasientene med en hendelse ved 36 måneder = $100 \times (1 - \text{Kaplan-Meier-estimat})$; hazard ratio estimert ved bruk av Coxs proporsjonale hazard-modell; ikke-stratifisert, ensidig log-rank p-verdi

^b % av pasientene med en hendelse som del av det primære endepunktet inntil avsluttet behandling + 7 dager; hazard ratio estimert ved bruk av Aalen Johansens metode; tosidig p-verdi ved bruk av Grays test

^c Omfatter 'Behov for lungetransplantasjon eller atrial septostomi' (1 pasient på seleksipag og 2 på placebo)

^d % av pasientene med en hendelse inntil avsluttet behandling + 7 dager eller inntil studieavslutning; hazard ratio estimert ved bruk av Coxs proporsjonale hazard-modell; ikke-stratifisert, ensidig log-rank p-verdi

Den numeriske økningen i antall dødsfall fram til avsluttet behandling + 7 dager, men ikke innen studieavslutning, ble undersøkt nærmere i en matematisk modell, som viste at ubalansen i dødsfall er i samsvar med antagelsen om en nøytral effekt på PAH-mortalitet og reduksjon av ikke-fatale hendelser.

Den observerte effekten av seleksipag i forhold til placebo på det primære endepunktet var konsekvent på tvers av individuelle vedlikeholdsdoser, vist ved hasardratio for de tre forhåndsdefinerte kategoriene (0,60 for 200–400 mikrogram to ganger daglig, 0,53 for 600–1 000 mikrogram to ganger daglig og 0,64 for 1 200–1 600 mikrogram to ganger daglig), som var i samsvar med den totale behandlingseffekten (0,60).

Effekten av seleksipag på det primære endepunktet var ensartet på tvers av undergrupper for alder, kjønn, etnisitet, etiologi, geografisk område, WHO FC, og som monoterapi eller i kombinasjon med en ERA eller en PDE-5-hemmer eller trippelkombinasjon med både en ERA og en PDE-5-hemmer.

Tiden til PAH-relatert død eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH ble betraktet som et sekundært endepunkt. Risikoen for en hendelse for dette endepunktet ble redusert med 30 % hos pasienter som fikk seleksipag, sammenlignet med placebo (HR 0,70, 99 % KI: 0,50, 0,98; ensidig log-rank $p = 0,0031$). Prosentandelene av pasienter med en hendelse ved måned 36, var 28,9 % og 41,3 % i henholdsvis seleksipag- og placebo-gruppen, og absolutt risiko-reduksjon var 12,4 %.

Antall pasienter der første hendelse var død på grunn av PAH eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH før avslutning av behandlingen, var 102 (17,8 %) i seleksipag-gruppen og 137 (23,5 %) i placebo-gruppen. Død på grunn av PAH som en komponent av det primære endepunktet, inntraff for 16 (2,8 %) pasienter på seleksipag og 14 (2,4 %) på placebo. Sykehusinnleggelse på grunn av PAH ble observert for 86 (15,0 %) pasienter på seleksipag og 123 (21,1 %) pasienter på placebo. Seleksipag reduserte risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av PAH som en første utfallshendelse, sammenlignet med placebo (HR 0,67, 99 % KI: 0,46, 0,98; ensidig log-rank $p = 0,04$).

Det totale antall dødsfall av alle årsaker før studieavslutning var 100 (17,4 %) for seleksipag-gruppen og 105 (18,0 %) for placebo-gruppen (HR 0,97, 99 % KI: 0,68, 1,39). Antall dødsfall på grunn av PAH før studieavslutning var 70 (12,2 %) i seleksipag-gruppen og 83 (14,3 %) i placebo-gruppen.

Symptomatiske endepunkter

Treningskapasitet ble evaluert som et sekundært endepunkt. Median 6MWD ved baseline var 376 m (intervall: 90–482 m) og 369 m (intervall: 50–515 m) hos henholdsvis seleksipag-pasienter og placebo-pasienter. Behandling med seleksipag ga en placebo-korrigert median effekt på 6MWD målt ved bunnkonsentrasjon (dvs. omtrent 12 timer etter administrering) på 12 m ved uke 26 (99 % KI: 1, 24 m; ensidig p-verdi = 0,0027). Hos pasienter uten samtidig PAH-spesifikk behandling, var den placebokorrigerte behandlingseffekten målt ved bunnkonsentrasjon, 34 m (99 % KI: 10, 63 m).

Livskvalitet ble vurdert for en undergruppe av pasienter i GRIPHON-studien, ved bruk av spørreskjemaet Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review (CAMPHOR). Det var ingen signifikant behandlingseffekt fra baseline til uke 26.

Langtidsdata ved PAH

Pasienter inkludert i hovedstudien (GRIPHON) kunne inkluderes i en åpen langtidsforlengelsesstudie. Totalt 574 pasienter ble behandlet med seleksipag i GRIPHON-studien; av disse fortsatte 330 pasienter med seleksipagbehandling i den åpne forlengelsesstudien. Median oppfølgingsvarighet var 4,5 år, og median seleksipageksponering var 3 år. Under oppfølgingen ble minst ett annet PAH-legemiddel gitt i tillegg til seleksipag hos 28,4 % av pasientene. Mesteparten av behandlingseksponeringen (86,3 %) hos alle de 574 pasientene var imidlertid akkumulert uten tillegg av et nytt PAH-legemiddel. Kaplan-Meier-estimer for overlevelse hos disse 574 pasientene samlet for GRIPHON- og langtidsforlengelsesstudien etter 1, 2, 5 og 7 år var henholdsvis 92 %, 85 %, 71 % og 63 %. Overlevelse etter 1, 2, 5 og 7 år hos 273 pasienter med WHO FC II ved baseline i hovedstudien var henholdsvis 97 %, 91 %, 80 % og 70 %, og hos 294 pasienter med WHO FC III ved baseline, henholdsvis 88 %, 80 %, 62 % og 56 %. Gitt at ytterligere PAH-behandling ble gitt til en liten andel pasienter og at det ikke var noen kontrollgruppe i forlengelsesstudien, kan seleksipags overlevelseshfordel ikke bekreftes av disse dataene.

Innledende trippel kombinasjonsbehandling med seleksipag, macitentan og tadalafil hos pasienter med nydiagnostisert PAH

I en dobbeltblind, placebo-kontrollert studie ble totalt 247 pasienter med nydiagnostisert PAH randomisert for evaluering av behandlingseffekten av innledende trippelbehandling (seleksipag, macitentan og tadalafil) (N = 123) sammenlignet med innledende dobbelbehandling (placebo, macitentan og tadalafil) (N = 124).

Det primære endepunktet, endring i pulmonal karmotstand (PVR) fra baseline til uke 26, viste ikke statistisk signifikant forskjell mellom gruppene, men viste bedring fra baseline i begge behandlingsgrupper (relativ reduksjon på 54 % i gruppen med innledende trippelbehandling og 52 % i gruppen med innledende dobbelbehandling).

I løpet av en median oppfølgingstid på 2 år døde 4 (3,4 %) pasienter i gruppen med trippelbehandling og 12 (9,4 %) pasienter i gruppen med dobbelbehandling.

Pediatrik populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Uptravi i én eller flere undergrupper av den pediatrike populasjonen ved pulmonal hypertensjon (se pkt. 4.2 for informasjon om pediatrik bruk).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten er studert hovedsakelig hos friske personer. Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten, både etter enkeltdosering og gjentatt dosering, var doseproporsjonal opptil en enkeltdose på 800 mikrogram og ved gjentatte doser på opptil 1 800 mikrogram to ganger daglig. Etter gjentatt administrering ble steady state for seleksipag og den aktive metabolitten nådd i løpet av 3 dager. Ingen akkumulering i plasma, verken av opprinnelig forbindelse eller aktiv metabolitt, forekom etter gjentatt dosering.

Hos friske personer var den interindividuelle variabiliteten for eksponering (areal under kurven over et doseringsintervall) ved steady state, 43 % og 39 % for henholdsvis seleksipag og den aktive metabolitten. Den intraindividuelle variabiliteten for eksponering var 24 % og 19 % for henholdsvis seleksipag og den aktive metabolitten.

Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten ved steady state hos PAH-pasienter og friske personer var sammenlignbar. Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten hos PAH-pasienter ble ikke påvirket av sykdommens alvorlighetsgrad og ble ikke endret over tid.

Absorpsjon

Seleksipag blir raskt absorbert og blir hydrolysert av karboksylestaser til den aktive metabolitten.

Maksimal observert plasmakonsentrasjon av seleksipag og den aktive metabolitten etter peroral administrering blir nådd i løpet av henholdsvis 1–3 timer og 3–4 timer.

Absolutt biotilgjengelighet av seleksipag hos mennesker er ca. 49 %. Dette skyldes sannsynligvis en førstepassasje-effekt av seleksipag, siden plasmakonsentrasjonen av den aktive metabolitten er omtrent den samme etter peroral og intravenøs administrering av samme dose.

Når seleksipag var inntatt med mat, økte eksponeringen etter en enkeltdose på 400 mikrogram med 10 % hos kaukasiere og ble redusert med 15 % hos japanere, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ble redusert med 27 % (med europeisk avstamning) og 12 % (japanere). Det var flere pasienter som rapporterte bivirkninger etter administrering i fastende tilstand enn etter administrering sammen med mat.

Distribusjon

Seleksipag og den aktive metabolitten er bundet til plasmaproteiner i høy grad (ca. 99 % totalt og i samme grad til albumin og alfa 1-surt-glykoprotein). Distribusjonsvolumet til seleksipag ved steady state er 11,7 liter.

Biotransformasjon

Seleksipag blir hydrolysert av karboksylestaser i leveren og tarmen til den aktive metabolitten. Oksidativ metabolisme katalysert hovedsakelig av CYP2C8 og i mindre grad av CYP3A4 fører til dannelse av hydroksylerte og dealkylerte produkter. UGT1A3 og UGT2B7 er involvert i glukuronidering av den aktive metabolitten. Bortsett fra den aktive metabolitten, er det ingen av de sirkulerende metabolittene i humant plasma som overskrider 3 % av totale legemiddel-relaterte substanser. Etter oral administrasjon er eksponeringen for den aktive metabolitten ved steady state ca. 3 til 4 ganger høyere enn for den opprinnelige forbindelsen, både hos friske personer og PAH-pasienter.

Eliminasjon

Elimineringen av seleksipag skjer hovedsakelig via metabolisme, med en gjennomsnittlig terminal halveringstid på 0,8–2,5 timer. Den aktive metabolitten har en halveringstid på 6,2–13,5 timer. Total clearance av seleksipag er 17,9 liter/time. Hos friske personer var utskillelsen fullstendig 5 dager etter administrering, hovedsakelig via feces (93 % av den administrerte dosen), og 12 % via urinen.

Spesielle pasientgrupper

Ingen klinisk relevante effekter av kjønn, etnisitet, alder eller kroppsvekt på farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten er sett hverken hos friske personer eller PAH-pasienter.

Nedsatt nyrefunksjon

Det ble observert en 1,4 til 1,7 ganger økt eksponering (maksimal plasmakonsentrasjon og arealet under plasmakonsentrasjon/tid-kurven) for seleksipag og den aktive metabolitten hos personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min/1,73 m²).

Nedsatt leverfunksjon

Hos personer med lett (Child-Pugh klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsatt leverfunksjon var eksponeringen for seleksipag henholdsvis 2 og 4 ganger høyere enn hos friske personer. Eksponeringen for den aktive metabolitten forble nesten uendret hos personer med lett nedsatt leverfunksjon og ble fordoblet hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon. Bare to personer med alvorlig (Child-Pugh klasse C) leverfunksjon fikk administrert seleksipag. Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten hos disse to personene tilsvarte eksponeringen hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B).

Basert på modellerings- og simuleringsdata fra en studie med personer med nedsatt leverfunksjon, antar man at eksponeringen for seleksipag ved steady state hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) etter administrering én gang daglig, er ca. 2 ganger høyere enn hos friske personer etter administrering to ganger daglig. Eksponeringen for den aktive metabolitten ved steady state hos disse pasientene ved administrering én gang daglig, antas å være omtrent som hos friske personer ved administrering to ganger daglig. Personer med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C) viste en tilsvarende eksponering ved steady state som personer med moderat nedsatt leverfunksjon ved administrering én gang daglig.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

I en toksisitetstudie med gjentatt dosering til gnagere falt blodtrykket kraftig på grunn av forsterkede, forbigående, farmakologisk induerte kliniske tegn, og det ble observert redusert matinntak og kroppsvektøkning. Hos voksne og unge hunder ble tarm og skjelett / benmarg identifisert som de viktigste målorganer etter behandling med seleksipag. En forsinkelse i lukkingen av den femorale og/eller tibiale vekstplaten ble observert hos unge hunder. NOEL (no-observed-adverse-effect level) ble ikke fastslått. Hos unge hunder ble det sporadisk observert invaginasjon på grunn av prostasyklin-relaterte effekter på tarmmotilitet. Sikkerhetsmarginer som var tilpasset den aktive metabolittens aktivitet ved IP-reseptoren, var 2 ganger høyere (basert på total eksponering) enn ved terapeutisk eksponering hos mennesker. Dette ble ikke observert i toksisitetstudier med mus eller rotter. På grunn av hunders artsspesifikke sensitivitet for utvikling av invaginasjon, anses ikke dette funnet som relevant for voksne mennesker.

Økt ossifisering og relaterte endringer i benmarg i hundestudier antas å skyldes aktivering av EP₄-reseptorer hos hunder. Siden humane EP₄-reseptorer ikke blir aktivert av seleksipag eller den aktive metabolitten, er denne effekten artsspesifikk og derfor ikke relevant for mennesker.

Seleksipag og den aktive metabolitten er ikke gentoksisk på bakgrunn av total evidens fra utførte studier av gentoksitet.

I en 2-årig karsinogenitetsstudie forårsaket seleksipag økt insidens av tyreoida-adenomer hos mus og Leydigcelle-adenomer hos rotter. Mekanismene er spesifikke for gnagere. Buktede arterioler i retina ble observert etter 2 års behandling kun hos rotter. Mekanistisk sett anses effekten å være induert av livslang vasodilatasjon og påfølgende endringer i øyets hemodynamikk. Ytterligere histopatologiske effekter av seleksipag ble observert bare ved mye høyere eksponering enn maksimal human eksponering og indikerer liten relevans for mennesker.

Ved 173 ganger høyere eksponering enn terapeutisk eksponering (basert på total eksponering) i en fertilitetsstudie med rotter, ble det observert forlenget østrussyklus, som førte til økt antall dager til parring. NOEL (no-observed-effect level) var 30 ganger høyere enn terapeutisk eksponering. Ut over dette ble ikke fertilitetsparametre påvirket.

Seleksipag var ikke teratogent hos rotter og kaniner (eksponeringsmarginer på 13 ganger terapeutisk eksponering for seleksipag og 43 ganger for den aktive metabolitten, basert på total eksponering). Sikkerhetsmarginer for potensielle IP-reseptor-relaterte effekter på reproduksjon, var 20 for fertilitet og 5 og 1 (basert på fri eksponering) for embryoføtal utvikling hos rotte og kanin når det var korrigert for forskjeller i reseptoraktivitet. I den pre-/postnatale utviklingsstudien med rotter induserte seleksipag ingen effekter på reproduksjonfunksjon hos mordyr eller avkom.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpetoffer

Tablettkjerne

Mannitol (E421)

Maisstivelse

Lavsubstituert hydroksypropylcellulose

Hydroksypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmdrasjering

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Gult jernoksid (E172)

Svart jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Talkum

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Gult jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Rødt jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Rødt jernoksid (E172)

Svart jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Gult jernoksid (E172)

Svart jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Rødt jernoksid (E172)

Gult jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Svart jernoksid (E172)

Rødt jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Gult jernoksid (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjert tablett

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Svart jernoksid (E172)

Rødt jernoksid (E172)

Gult jernoksid (E172)

Karnaubavoks

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

Blisterpakning: 4 år.

Boks: 18 måneder.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Boks av høytetthetspolyetylen (HDPE) med barnesikret skrulokk, som inneholder 1 g silika tørkemiddelkapsel i lokket, og varmeforsegling.

Esker med 60 filmdrasjerte tabletter (bokser).

Esker med 140 filmdrasjerte tabletter (titreringspakning, bokser).

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Polyamid / aluminium / HDPE / PE forsynt med tørkemiddel / HDPE-blistre forseglet med aluminiumsfolie.

Hvert blister inneholder 10 filmdrasjerte tabletter.

Esker med 10 eller 60 filmdrasjerte tabletter (1 eller 6 blister)

Esker med 60 eller 140 filmdrasjerte tabletter (titreringspakninger, 6 eller 14 blister).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1 000 mikrogram, 1 200 mikrogram, 1 400 mikrogram, og 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Polyamid / aluminium / HDPE / PE forsynt med tørkemiddel / HDPE-blistre forseglet med aluminiumsfolie.

Hvert blister inneholder 10 filmdrasjerte tabletter.

Esker med 60 filmdrasjerte tabletter (6 blister).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/001
EU/1/15/1083/002
EU/1/15/1083/003
EU/1/15/1083/004
EU/1/15/1083/005
EU/1/15/1083/006
EU/1/15/1083/007
EU/1/15/1083/008
EU/1/15/1083/009
EU/1/15/1083/010
EU/1/15/1083/011
EU/1/15/1083/012
EU/1/15/1083/013

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 12. mai 2016

Dato for siste fornyelse: 14. desember 2020

10. OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettsiden til det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) <http://www.ema.europa.eu>.

VEDLEGG II

- A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE**
- B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK**
- C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**
- D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET**

A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se vedlegg I: Preparatomtale, pkt. 4.2).

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

- **Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er)**

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR-er) for dette legemidlet er angitt i EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency).

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

- **Risikohåndteringsplan (RMP)**

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner vedrørende legemiddelovervåking spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP.

En oppdatert RMP skal sendes inn:

- på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency);
- når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko-profilen eller som resultat av at en viktig milepel (legemiddelovervåking eller risikominimering) er nådd.

- **Andre risikominimeringsaktiviteter**

Før lanseringen av Uptravi skal innehaver av markedsføringstillatelsen bli enig med nasjonal legemiddelmyndighet i hvert av medlemslandene om innholdet og formatet på det kontrollerte distribusjonssystemet.

Det kontrollerte distribusjonssystemet har som formål å lette identifiseringen av forskriverne, å nå dem med hensiktsmessig informasjon om sikker og effektiv bruk av Uptravi, og å gi dem verktøy for risikominimering, spesielt med hensyn til den potensielle risikoen for medisineringsfeil. Det kontrollerte distribusjonssystemet skal omfatte tre hovedprinsipper som skal implementeres i hvert system i alle medlemsland. Hovedprinsippene er:

- Identifisering av alle som forskriver Uptravi, og vedlikehold av en liste over alle disse;
- Distribusjon av forskrivningssett til alle identifiserte forskrivere, for spesielt å minimere risikoen for medisineringsfeil;
- Kontroll av at forskriverne har mottatt forskrivningssettene.

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sikre at i alle medlemsland der Uptravi er markedsført, skal alt helsepersonell som forventes å forskrive og/eller utlevere Uptravi, motta et forskrivningssett som inneholder følgende:

- Preparatomtalen for Uptravi;
- Følg brev til helsepersonell;
- Titreringsveiledning(er) for helsepersonell, i laminert A4-format;
- Titreringsveiledning(er) for pasienter;
- Pakningsvedlegg.

Følg brevet til helsepersonell skal forklare at formålet med opplæringsmateriellet er å redusere risikoen for medisineringsfeil som skyldes at det finnes flere tabletttyper og tablettstyrker. Det skal omfatte en liste over innholdet i forskrivningssettet.

De laminerte A4 titreringsveiledningene for helsepersonell for seleksipag startdoser på 100 mikrogram og 200 mikrogram skal redusere risikoen for medisineringsfeil som skyldes titreringsfasen i begynnelsen av Uptravi-behandlingen, og den skal inneholde følgende hovedelementer:

- Begrepene dosering og titrering;
- Overgangen til vedlikeholdsdosen (titreringsfase);
- Forventede bivirkninger og håndtering av disse under titreringsfasen;
- Oppfordring til helsepersonell, samt en veiledning i, å kommunisere tydelig med pasientene ved oppstart samt om å ta ansvar for å kontakte pasienten under titreringsfasen, for å fremme kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienten (behov for kontakt og å planlegge telefonsamtaler).

Titreringsveiledninger for pasienter er tilgjengelige for seleksipag startdoser på 100 mikrogram og 200 mikrogram. Titreringsveiledningen for pasienter, som skal brukes av helsepersonell i samtaler med pasienten, skal inneholde følgende hovedelementer:

- En lett forståelig versjon av den laminerte A4 titreringsveiledningen for helsepersonell;
- Dagbok som skal lette bruken av Uptravi og tjene som en påminnelse til pasienten (f.eks. om å kontakte legen sin), og som kan brukes til å notere tablettinntaket;
- Informasjon om sikker og effektiv bruk av Uptravi, i lett forståelig språk.

Titreringsveiledningen for pasienter tilhørende pasientens seleksipag startdose på 100 mikrogram eller 200 mikrogram, pluss pakningsvedlegget, skal overleveres til pasienten etter demonstrasjonen. Pasienten får titreringsveiledning og pakningsvedlegg i titreringspakningene med Uptravi.

VEDLEGG III
MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

A. MERKING

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE - TITRERINGSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mikrogram seleksipag

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

Titreringspakning
140 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Skal ikke deles eller knuses.
Les pakningsvedlegget og titreringsveiledningen før bruk.
Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/013

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UTLIVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 100 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mikrogram seleksipag

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

60 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Skal ikke deles eller knuses.
Les pakningsvedlegget før bruk.
Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/012

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 100 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

BOKSETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mikrogram seleksipag

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

60 filmdrasjerte tabletter
140 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Skal ikke deles eller knuses.
Les pakningsvedlegget før bruk.
Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/012
EU/1/15/1083/013

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UTLIVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE - TITRERINGSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

Titreringspakning

60 filmdrasjerte tabletter

140 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Skal ikke deles eller knuses.

Les pakningsvedlegget og titreringsveiledningen før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPEIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/003
EU/1/15/1083/011

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSEFIKASJON FOR UTLIVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 200 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR
MENNESKER**

PC
SN
NN

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 400 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 800 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 000 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 200 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 400 mikrogram seleksipag
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 600 mikrogram seleksipag

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

10 filmdrasjerte tabletter
60 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG -VEI(ER)

Skal ikke deles eller knuses .
Les pakningsvedlegget før bruk.
Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/001
EU/1/15/1083/002
EU/1/15/1083/004
EU/1/15/1083/005
EU/1/15/1083/006
EU/1/15/1083/007
EU/1/15/1083/008
EU/1/15/1083/009
EU/1/15/1083/010

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 200 mikrogram
Uptravi 400 mikrogram
Uptravi 600 mikrogram
Uptravi 800 mikrogram
Uptravi 1 000 mikrogram
Uptravi 1 200 mikrogram
Uptravi 1 400 mikrogram
Uptravi 1 600 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC
SN
NN

**MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ BLISTER ELLER STRIP
BLISTERPAKNINGER**

1. LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram tablett
Uptravi 400 mikrogram tablett
Uptravi 600 mikrogram tablett
Uptravi 800 mikrogram tablett
Uptravi 1 000 mikrogram tablett
Uptravi 1 200 mikrogram tablett
Uptravi 1 400 mikrogram tablett
Uptravi 1 600 mikrogram tablett
seleksipag

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag Int

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter
Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Uptravi er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Uptravi
3. Hvordan du bruker Uptravi
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Uptravi
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Uptravi er og hva det brukes mot

Uptravi er et legemiddel som inneholder virkestoffet seleksipag. Det virker i blodårene på lignende måte som den naturlige substansen prostasyklin, og får dem til å slappe av og utvide seg.

Uptravi blir brukt for langtids behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med andre typer medisiner mot PAH, som kalles endotelinreseptor-antagonister og hemmere av fosfodiesterase type 5. Uptravi kan brukes alene dersom disse legemidlene ikke er egnet for pasienten.

PAH er høyt blodtrykk i blodårene (lungearteriene) som frakter blod fra hjertet til lungene. Hos personer med PAH er disse arteriene trangere, slik at hjertet må arbeide hardere for å pumpe blodet gjennom dem. Dette kan medføre tretthet, svimmelhet, kortpustethet eller andre symptomer.

Ved å virke på tilsvarende måte som den naturlige substansen prostasyklin, utvider dette legemidlet lungearterierene og gjør dem mindre harde. Det gjør det enklere for hjertet å pumpe blodet gjennom lungearteriene. Uptravi senker trykket i lungearteriene, lindrer symptomene på PAH og bremser forverringen av PAH-sykdom.

2. Hva du må vite før du bruker Uptravi

Bruk ikke Uptravi dersom:

- du er allergisk overfor seleksipag eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
- du har et hjerteproblem, som:
 - dårlig blodgjennomstrømning til hjertemuskelen (alvorlig hjertesykdom eller ustabil angina); symptomene kan omfatte brystsmerte
 - hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 måneder
 - svakt hjerte (dekompensert hjertesvikt) som ikke er under tett medisinsk observasjon
 - kraftig uregelmessige hjerteslag
 - feil på hjerteklaffer (medfødt eller ervervet) som forårsaker at hjertet fungerer dårlig (ikke relatert til pulmonal hypertensjon)
- du har hatt slag i løpet av de siste 3 månedene, eller eventuelt en annen hendelse som reduserte blodtilførselen til hjernen (f.eks. TIA/transitorisk iskemisk attack)
- du bruker gemfibrozil (legemiddel som brukes for å senke nivået av fettstoffer [lipider] i blodet)

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med PAH-legen eller sykepleier før du bruker Uptravi dersom du

- bruker medisiner mot høyt blodtrykk
- har lavt blodtrykk med symptomer som svimmelhet
- nylig har hatt stort blodtap eller væsketap, som kraftig diaré eller oppkast
- har problemer med skjoldbruskkjertelen
- har alvorlige problemer med nyrene eller får dialyse
- har eller har hatt alvorlige problemer med at leveren ikke har fungert normalt

Dersom du merker noen av de ovennevnte tegnene eller dersom tilstanden din endres, **må du informere legen umiddelbart.**

Barn og ungdom

Ikke gi denne medisinen til barn under 18 år, siden Uptravi foreløpig ikke er testet hos barn.

Eldre pasienter

Det er begrenset erfaring med Uptravi hos pasienter eldre enn 75 år. Uptravi må brukes med forsiktighet i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Uptravi

Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dersom du bruker andre legemidler, kan det påvirke hvordan Uptravi virker.

Snakk med PAH-legen eller sykepleier dersom du bruker noen av følgende medisiner:

- gemfibrozil (legemiddel som brukes for å senke nivået av fettstoffer [lipider] i blodet)
- klopidogrel (legemiddel som brukes for å hindre blodpropp ved koronarsykdom)
- deferasiroks (legemiddel som brukes for å fjerne jern fra blodstrømmen)
- teriflunomid (legemiddel som brukes som behandling av relapserende remitterende multipel sklerose (attakkvis MS))
- karbamazepin (legemiddel som brukes til behandling av visse former for epilepsi, nervesmerter eller for å kontrollere alvorlige humørforstyrrelser når andre legemidler ikke fungerer)
- fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
- valproinsyre (legemiddel mot epilepsi)
- probenecid (legemiddel mot urinsyregikt)
- flukonazol, rifampicin eller rifapentin (antibiotika mot infeksjon)

Graviditet og amming

Uptravi er ikke anbefalt under graviditet og amming. Dersom du er kvinne og kan bli gravid, må du bruke en effektiv prevensjonsmetode mens du tar Uptravi. Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Uptravi kan forårsake bivirkninger som hodepine og lavt blodtrykk (se pkt. 4), som kan påvirke din evne til å kjøre. Også symptomene på tilstanden din kan gjøre deg dårligere egnet til å kjøre.

3. Hvordan du bruker Uptravi

Uptravi skal forskrives kun av lege med erfaring i behandling av PAH. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker eller har noen spørsmål.

Snakk med lege dersom du opplever bivirkninger, da legen kan anbefale at du endrer dosen med Uptravi.

Snakk med lege dersom du har problemer med leveren din ikke fungerer normalt eller tar andre legemidler. Legen kan da anbefale at du tar en lavere dose av Uptravi to ganger daglig eller kun én gang daglig.

Dersom du har dårlig syn eller er blind, må du be om hjelp fra en annen person i perioden med opptrapping (titrering) av Uptravi (perioden med gradvis doseøkning).

Å finne den riktige dosen for deg

Dersom legen har foreskrevet 200 mikrogram tabletter


I begynnelsen av behandlingen skal de fleste pasienter ta **1 tablett på 200 mikrogram om morgenen og 1 tablett på 200 mikrogram om kvelden, med ca. 12 timers mellomrom**. Det anbefales å starte behandlingen om kvelden. Legen vil be deg om å øke dosen gradvis. Dette kalles titrering. På den måten blir kroppen din vant til medisinen. Målet med titrering er å nå den mest hensiktsmessige dosen. Det er den høyeste dosen du tåler, inntil en maksimal dose på 1 600 mikrogram morgen og kveld.

Den første tablettpakningen du får, inneholder lysegule tabletter på 200 mikrogram. Legen vil be deg øke dosen trinnvis, vanligvis hver uke, men intervallet mellom doseøkningene kan være lenger.

Ved hver doseøkning tar du én ekstra 200 mikrogram tablett med morgendosen og én ekstra 200 mikrogram tablett med kveldsdosen. **Det anbefales at første inntak av en øket dose skjer om kvelden**. Diagrammet nedenfor viser hvor mange tabletter du skal ta **hver morgen** og **hver kveld** på de 4 første trinnene.

Hvert doseringstrinn varer ca. 1 uke.

STARTDOSE




2 200 mikrogram tablett

Dersom lege ber deg øke dosen enda mer, skal du tilføye én tablett på 200 mikrogram til morgendosen og én tablett på 200 mikrogram til kveldsdosen ved hver ny doseøkning. Det anbefales at første inntak av en økt dose skjer om kvelden.

Dersom lege ber deg øke dosen ytterligere og gå til trinn 5, kan du gjøre det ved å ta én grønn tablett på 800 mikrogram og én lysegul tablett på 200 mikrogram om morgenen og én tablett på 800 mikrogram og én tablett på 200 mikrogram om kvelden.

Maksimumsdosen av Uptravi er 1 600 mikrogram om morgenen og 1 600 mikrogram om kvelden. Ikke alle pasienter vil nå denne dosen, fordi forskjellige pasienter trenger forskjellige doser.

Diagrammet nedenfor viser antall tabletter du skal ta hver morgen og hver kveld på hvert trinn, med start på trinn 5.



Dersom legen har foreskrevet 100 mikrogram tabletter

Dersom leveren din ikke fungerer normalt eller du tar visse legemidler, kan legen forskrive 100 mikrogram tabletter som startdose.

I begynnelsen av behandlingen skal du ta **1 tablett på 100 mikrogram om morgenen og 1 tablett på 100 mikrogram om kvelden, med ca. 12 timers mellomrom**. Det anbefales å starte behandlingen om kvelden. Legen vil be deg om å øke dosen gradvis. Dette kalles titrering. På den måten blir kroppen din vant til medisinen. Målet med titrering er å nå den mest hensiktsmessige dosen. Det er den høyeste dosen du tåler, inntil en maksimal dose på 800 mikrogram morgen og kveld.

Legen vil be deg øke dosen trinnvis, vanligvis hver uke, men intervallet mellom doseøkningene kan være lenger.

Ved hver doseøkning tar du én ekstra 100 mikrogram tablett med morgendosen og én ekstra 100 mikrogram tablett med kveldsdosen. **Det anbefales at første inntak av en økt dose skjer om kvelden.** Se titreringsveiledningen for pasienter vedlagt i titreringspakningen, for instruksjoner om hvordan du skal trappe opp dosen.

Snakk med lege dersom du slutter å ta eller kanskje skal slutte å ta noen legemidler, da det er mulig at din dose av seleksipag må justeres.

Dersom lege ber deg øke dosen enda mer, skal du tilføye én tablett på 100 mikrogram til morgendosen og én tablett på 100 mikrogram til kveldsdosen ved hver ny doseøkning. Det anbefales at første inntak av en økt dose skjer om kvelden.

Dersom lege ber deg øke dosen ytterligere over 400 mikrogram, kan du gjøre det ved å ta én rød tablett på 400 mikrogram og én lysegul tablett på 100 mikrogram om morgenen og én tablett på 400 mikrogram og én tablett på 100 mikrogram om kvelden. Se titreringsveiledningen for pasienter vedlagt i titreringspakningen, for instruksjoner om hvordan du skal trappe opp dosen.

Ved opptitrering med 100 mikrogram tabletter er maksimumsdosen av Uptravi 800 mikrogram om morgenen og 800 mikrogram om kvelden. Ikke alle pasienter vil nå denne dosen, fordi forskjellige pasienter trenger forskjellige doser.

Bruk av titeringsveiledningen ved titering

Du vil motta titeringspakningen som inneholder én titeringsveiledning og et pakningsvedlegg. Titeringsveiledningen gir informasjon om titeringsprosessen og der kan du notere hvor mange tabletter du tar hver dag.


Husk å notere i titeringsdagboken hvor mange tabletter du tar hver dag. Hvert titeringstrinn varer vanligvis i ca. 1 uke. Dersom legen ber deg forlenge hvert titeringstrinn til mer enn 1 uke, finnes det ekstra dagboksider for at du skal kunne følge med på det. **Husk å snakke jevnlig med PAH-legen eller sykepleier under titeringen.**

Nedtrapping til en lavere dose på grunn av bivirkninger

Under titering kan det hende du opplever bivirkninger som hodepine, diaré, kvalme, oppkast, kjevesmerte, muskelsmerte, bensmerte eller rødme i ansiktet (se pkt. 4). Dersom disse bivirkningene er vanskelige for deg å tåle, kan du rådføre deg med legen om hvordan du kan takle eller behandle dem. Det finnes behandlinger som kan bidra til å lindre bivirkningene. For eksempel kan smertestillende midler som paracetamol, bidra til å lindre smerter og hodepine.

Dersom bivirkningene ikke kan behandles, eller du ikke blir gradvis bedre på dosen du tar, kan det hende legen justerer dosen din ved å redusere antallet av de lysegule tablettene, med én om morgenen og én om kvelden. Diagrammet nedenfor viser nedtrapping til en lavere dose. Du skal gjøre dette bare dersom legen har bedt deg om det.

Titrering med 200 mikrogram tabletter



Dersom du titrerer med 100 mikrogram tabletter, se titeringsveiledningen for pasienter vedlagt i titeringspakningen, for instruksjoner om hvordan du skal trappe ned.

Dersom bivirkningene er tolererbare etter at du trappet ned dosen, kan det hende legen bestemmer at du skal fortsette med den dosen. Se avsnittet Vedlikeholdsdose nedenfor for mer informasjon.

Vedlikeholdsdose

Den høyeste dosen du tåler under titrering, vil bli din vedlikeholdsdose. Vedlikeholdsdosen er den dosen du skal fortsette å ta regelmessig fremover.

Lege vil forskrive passende tablettstyrke(r) for vedlikeholdsdosen, **slik at du kan ta én tablett om morgenen og én tablett om kvelden, i stedet for flere tabletter hver gang.**

For en fullstendig beskrivelse av Uptravi tabletter, inkludert farger og merking, se pkt. 6 i dette pakningsvedlegget.

Etter hvert kan det hende legen vil justere vedlikeholdsdosen din om det er behov for det.

Dersom du etter å ha tatt samme dose i lengre tid, på noe tidspunkt opplever bivirkninger du ikke kan tolerere eller bivirkninger som har innvirkning på dine daglige aktiviteter, ber vi deg kontakte lege fordi det kan hende dosen din må reduseres. Det kan hende legen vil forskrive en lavere dose. Husk å levere ubrukte tabletter til kassering (se pkt. 5).

Ta Uptravi én gang om morgenen og én gang om kvelden, med ca. 12 timers mellomrom.

Ta tablettene til måltider, siden det kan gjøre at du tåler medisinen bedre. Tablettedrasjeringen gir beskyttelse. Svelg tablettene hele sammen med et glass vann. Ikke del eller knus tablettene.

Dersom du tar for mye av Uptravi

Spør lege om råd dersom du har tatt flere tabletter enn du skulle.

Dersom du har glemt å ta Uptravi

Dersom du glemmer å ta Uptravi, skal du ta en dose så snart du kommer på det og fortsette å ta tablettene til de vanlige tidspunktene. Dersom det snart er på tide å ta neste dose (mindre enn 6 timer før du vanligvis skulle tatt den), skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette å ta medisinen til vanlig tid. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Uptravi

Dersom du plutselig stanser behandlingen med Uptravi, kan symptomene dine bli verre. Ikke avbryt behandlingen, såfremt ikke legen ber deg om det. Det kan hende legen ber deg redusere dosen gradvis før du slutter helt.

Dersom du av en eller annen grunn ikke tar Uptravi i mer enn 3 påfølgende dager (dersom du glemmer 3 morgendoser og 3 kveldsdoser, eller 6 påfølgende doser eller mer), **må du kontakte lege umiddelbart, siden det kan hende at dosen din må justeres for å unngå bivirkninger.** Det kan hende legen bestemmer at du skal starte behandlingen igjen på en lavere dose og gradvis øke til din tidligere vedlikeholdsdose.

Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det kan hende at du opplever bivirkninger ikke bare under titreringsperioden når dosen din økes, men også senere når du har tatt samme dose i lang tid.

Dersom du opplever noen av disse bivirkningene: hodepine, diaré, kvalme, oppkast, kjevesmerte, muskelsmerte, bensmerte, leddsmerte eller rødme i ansiktet, og de er utolererbare eller ikke kan behandles, skal du kontakte lege siden dosen du tar kan være for høy og kanskje må reduseres.

Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

- Hodepine
- Rødme (rødhet i ansiktet)
- Kvalme og oppkast
- Diaré
- Kjevesmerte, muskelsmerte, leddsmerte, bensmerte
- Nasofaryngitt (tett nese)

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

- Anemi (lavt nivå av røde blodceller)
- Hypertyreoidisme (overaktiv skjoldbruskkjertel)
- Nedsatt matlyst
- Vekttap
- Hypotensjon (lavt blodtrykk)
- Magesmerter, inkludert fordøyelsesbesvær
- Smerte
- Endring i noen blodprøveresultater, inkludert de som måler antall blodceller eller skjoldbruskkjertelens funksjon
- Utslett, inkludert elveblest, kan forårsake en brennende eller sviende følelse og rødhet i huden

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

- Økt hjerterefrekvens

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via **det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V**. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Uptravi

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Uptravi etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet eller boksetiketten etter "EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Uptravi

Virkestoffet er seleksipag.

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 100 mikrogram seleksipag

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 400 mikrogram seleksipag

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 600 mikrogram seleksipag

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 800 mikrogram seleksipag

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 1 000 mikrogram seleksipag

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tablett inneholder 1 200 mikrogram seleksipag

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1 400 mikrogram seleksipag
Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1 600 mikrogram seleksipag

Andre innholdstoffer er:

Tablettkjerne

Mannitol (E421)

Maisstivelse

Lavsubstituert hydroksypropylcellulose

Hydroksypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmdrasjering

Hypromellose (E464)

Propylenglykol (E1520)

Titandioksid (E171)

Jernoksider (E172)

Karnaubavoks

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid, svart jernoksid (E172) og talkum.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid (E172).

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid (E172).

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid og svart jernoksid (E172).

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid og svart jernoksid (E172).

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid og gult jernoksid (E172).

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder svart jernoksid og rødt jernoksid (E172).

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid (E172).

Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder svart jernoksid, rødt jernoksid og gult jernoksid (E172).

Hvordan Uptravi ser ut og innholdet i pakningen

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 3,0 mm i diameter, lysegule, filmdrasjerte tabletter med "1" preget på den ene siden.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, lysegule, filmdrasjerte tabletter med "2" preget på den ene siden.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, røde, filmdrasjerte tabletter med "4" preget på den ene siden.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, lysfiolette, filmdrasjerte tabletter med "6" preget på den ene siden.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, grønne, filmdrasjerte tabletter med "8" preget på den ene siden.

Uptravi 1 000 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, oransje, filmdrasjerte tabletter med "10" preget på den ene siden.

Uptravi 1 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, mørkfiolette, filmdrasjerte tabletter med "12" preget på den ene siden.

Uptravi 1 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, mørkegule, filmdrasjerte tabletter med "14" preget på den ene siden.

Uptravi 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, 7,3 mm i diameter, brune, filmdrasjerte tabletter med "16" preget på den ene siden.

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter leveres i bokser med 60 tabletter og 140 tabletter (titreringspakning).

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter leveres i blisterpakninger med 10 eller 60 tabletter, og 60 eller 140 tabletter (titreringspakninger).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1 000 mikrogram, 1 200 mikrogram, 1 400 mikrogram og 1 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter leveres i blisterpakninger med 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Tilvirker

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV
Tel/Tél: +32 14 64 94 11
janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"
Tel: +370 5 278 68 88
lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България“ ЕООД
Тел.: +359 2 489 94 00
jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV
Tél/Tel: +32 14 64 94 11
janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.
Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.
Tel.: +36 1 884 2858
janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S
Tlf: +45 4594 8282
jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD
Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH
Tel: +49 2137 955 955
jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.
Tel: +31 76 711 1111
janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal
Tel: +372 617 7410
ee@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.
Tel: +34 91 722 81 00
contacto@its.jnj.com

France

Janssen-Cilag
Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03
medisource@its.jnj.com

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Tel: +385 1 6610 700
jjsafety@JNJCR.JNJ.com

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC
Tel: 1 800 709 122
medinfo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB
c/o Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
janssen@vistor.is

Italia

Janssen-Cilag SpA
Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1
janssenita@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
Τηλ: +357 22 207 700

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā
Tel: +371 678 93561
lv@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS
Tlf: +47 24 12 65 00
jacno@its.jnj.com

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH
Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Tel: +351 214 368 600

România

Johnson & Johnson România SRL
Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.
Tel: +386 1 401 18 00
Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.
Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy
Puh/Tel: +358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com

Sverige

Janssen-Cilag AB
Tfn: +46 8 626 50 00
jacse@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC
Tel: +44 1 494 567 444
medinfo@its.jnj.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): <http://www.ema.europa.eu>, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

TITRERINGSVEILEDNING - TITRERINGSPAKNING

Side 1

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

Titreringsveiledning

Oppstart av behandling med Uptravi

Les det medfølgende pakningsvedlegget før du begynner på behandlingen.
Rådfør deg med lege dersom du opplever bivirkninger, da legen kan anbefale at du endrer dosen med Uptravi. Rådfør deg med lege dersom du tar andre legemidler, da legen kan anbefale at du tar Uptravi kun én gang daglig.

Side 2

Innhold

Hvordan skal du ta Uptravi?	4
Hvordan skal du trappe opp dosen din?	6
Hva er trinnene?	8
Når skal du trappe ned?	10
Nedtrapping	12

Side 3

Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din	14
Dersom du glemmer å ta Uptravi.....	16
Dersom du avbryter behandling med Uptravi.....	17
Titreringsdagbok.....	18

Side 4

Hvordan skal du ta Uptravi?

Uptravi er en medisin som tas hver morgen og kveld for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, også kalt PAH.

Startdosen av Uptravi er 200 mikrogram **én gang om morgenen og én gang om kvelden.**
Første inntak av Uptravi skal skje om kvelden.
Du skal ta hver dose med et glass vann, fortrinnsvis under et måltid.

Side 5

Det er 2 faser i behandlingen med Uptravi:

Titring

De første ukene samarbeider du med legen om å finne den dosen av Uptravi som er riktig for deg. Det kan hende legen vil at du skal trappe opp fra startdosen til høyere doser av Uptravi. Det kan hende legen vil at du skal trappe ned til en lavere dose. Denne prosessen kalles titring. Den gjør at kroppen din gradvis blir vant til medisinen.

Vedlikehold

Når legen har funnet den dosen som er riktig for deg, vil det bli den dosen du skal ta regelmessig fremover. Den kalles vedlikeholdsdosen.

Side 6

Hvordan skal du trappe opp dosen din?

Du skal starte med en dose på 200 mikrogram morgen og kveld, og etter å ha drøftet det med lege eller sykepleier, trapper du opp til neste dose.

Første inntak av en økt dose skal skje om kvelden. Hvert trinn varer vanligvis ca. 1 uke. Det kan ta flere uker å finne den dosen som er riktig for deg.

Målet er å nå den dosen som er best egnet for å behandle deg.

Denne dosen vil bli din vedlikeholdsdose.

Side 7

Pasienter med PAH er forskjellige. **Ikke alle ender opp med samme vedlikeholdsdose.**

Noen pasienter skal ha 200 mikrogram morgen og kveld som sin vedlikeholdsdose, mens noen når høyeste dose på 1 600 mikrogram morgen og kveld.

Andre når en vedlikeholdsdose et sted mellom disse dosene. Det som er viktig er at du når den dosen som er best egnet for deg.

Side 8



Side 9

Side 10

↓Når skal du trappe ned?

Som med alle legemidler, kan det hende du opplever bivirkninger av Uptravi når du trapper opp til høyere doser.

Snakk med lege eller sykepleier dersom du får bivirkninger. Det finnes behandlinger som kan bidra til å lindre dem.

De vanligste bivirkningene (kan påvirke flere enn 1 av 10) ved bruk av Uptravi er:

- Hodepine • Diaré • Kvalme • Oppkast • Kjevsmerte • Muskelsmerte • Bensmerte • Leddsmerte • Ansiktsrødme


For en fullstendig liste over bivirkninger; se pakningsvedlegget for mer informasjon.

Side 11

Dersom bivirkningene er utolererbare selv etter at legen eller sykepleier har prøvd å behandle dem, kan det hende at han eller hun anbefaler at du trapper ned til en lavere dose.

Dersom lege eller sykepleier ber deg trappe ned til en lavere dose, skal du ta én 200 mikrogram tablett mindre om morgenen og én mindre om kvelden.

Du skal bare trappe ned dersom du har snakket med PAH-legen eller sykepleier. Denne nedtrappingsprosessen vil hjelpe deg med å finne den dosen som er riktig for deg, som også kalles din vedlikeholdsdose.



Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din

Den høyeste dosen du tåler under titrering, vil bli din **vedlikeholdsdose**. Vedlikeholdsdosen er den dosen du skal fortsette å ta regelmessig fremover. Lege eller sykepleier vil forskrive en **enkelttablett** med samme styrke for vedlikeholdsdosen, slik at du kan ta bare én tablett om morgenen og én tablett om kvelden, i stedet for flere tabletter hver gang.

Dersom din høyeste tolererte dose under titrering var for eksempel 1 200 mikrogram én gang om morgenen og én gang om kvelden:



Etter hvert kan det hende lege eller sykepleier vil justere vedlikeholdsdosen din om det er behov for det.

Dersom du glemmer å ta Uptravi

Dersom du glemmer en dose, skal du ta dosen så snart du kommer på det og deretter fortsette å ta tablettene til de vanlige tidspunktene. Dersom det er mindre enn 6 timer til du vanligvis skulle tatt neste dose, skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette å ta medisinen til vanlig tid. **Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.**

Dersom du avbryter behandling med Uptravi

Ikke avbryt behandlingen, såfremt ikke lege eller sykepleier ber deg om det. Dersom du av en eller annen grunn ikke har tatt Uptravi i mer enn 3 påfølgende dager (dersom du har glemt 6 doser på rad), må du kontakte PAH-legen eller sykepleier umiddelbart, siden det kan hende at dosen din må justeres for å unngå bivirkninger.

Det kan hende legen eller sykepleier bestemmer at du skal starte behandlingen igjen på en lavere dose og gradvis øke til din tidligere vedlikeholdsdose.

Titreringsdagbok

Les instruksjonene i pakningsvedlegget nøye.

De følgende dagboksidene kan hjelpe deg med å følge med på hvor mange tabletter du skal ta morgen og kveld under titreringen.

Bruk dem til å skrive ned hvor mange tabletter du tar morgen og kveld.

Hvert trinn varer vanligvis i cirka 1 uke, såfremt ikke lege eller sykepleier bestemmer noe annet. Dersom dine titreringstrinn varer lenger enn 1 uke, er det ekstra dagboksider som kan hjelpe deg å følge med på dette.



Bruk side 20 til 27 for å følge med på de første ukene av behandlingen, når du bare bruker tabletter på 200 mikrogram (trinn 1-4).



Dersom du har fått forskrevet både 200 og 800 mikrogram tabletter, bruker du side 30 til 37 (trinn 5-8).

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen eller sykepleier.

Skriv ned instruksjonene fra lege eller sykepleier:

Legens telefonnummer og e-post:

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Merknader:

<p>Side 20</p> <p>UKE NR: 1</p> <p>Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden.</p> <p>Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.</p> <p>Dato: _____</p> <table border="1"> <tr> <td>Morgen</td> <td>200 mikrogram</td> <td>0</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>Kveld</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> </table> <p>Det første inntak av Upravi bør være om kvelden</p>	Morgen	200 mikrogram	0	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Side 21</p> <p>UKE NR: #</p> <p>Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.</p> <p>Dato: _____</p> <table border="1"> <tr> <td>Morgen</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>Kveld</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> </table> <p>Det første inntak av en økt dose med Upravi bør skje om kvelden</p>	Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	200 mikrogram	0	#	#	#	#	#	#	#																																
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																
Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																

<p>Side 22</p> <p>UKE NR: #</p> <p>Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.</p> <p>Dato: _____</p> <table border="1"> <tr> <td>Morgen</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>Kveld</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> </table>	Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Side 23</p> <p>UKE NR: #</p> <p>Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.</p> <p>Dato: _____</p> <table border="1"> <tr> <td>Morgen</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>Kveld</td> <td>200 mikrogram</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> <td>#</td> </tr> </table> <p>Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 800 mikrogram tabletter</p>	Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																
Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	#																																

Side 24

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	24
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram	# # # # # # # #
Kveld	200 mikrogram	# # # # # # # #
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 800 mikrogram tabletter		

Side 25

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	25
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram	# # # # # # # #
Kveld	200 mikrogram	# # # # # # # #
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 800 mikrogram tabletter		

Side 26

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	26
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram	# # # # # # # #
Kveld	200 mikrogram	# # # # # # # #
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 800 mikrogram tabletter		



Side 27

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	27
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram	# # # # # # # #
Kveld	200 mikrogram	# # # # # # # #
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 800 mikrogram tabletter		

Side 28

Bruk de følgende dagboksiden dersom lege eller sykepleier har forskrevet 800 mikrogram tabletter i tillegg til 200 mikrogram tabletter.

På dagboksiden kan du notere at du har tatt én 800 mikrogram tablett hver dag morgen og kveld, sammen med det forskrevne antall 200 mikrogram tabletter.

-  **200 mikrogram tablett**
-  **800 mikrogram tablett**
(Brukes i trinn 5 til og med 8 for å redusere antall tabletter som trengs pr. dose.)

Side 29

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen eller sykepleier.

Skriv ned instruksjonene fra lege eller sykepleier:

Legens telefonnummer og e-post:

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Merknader:

Side 30

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	30
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram 800 mikrogram	# # # # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1
Kveld	200 mikrogram 800 mikrogram	# # # # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1

Side 31

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ.	31
Dato: _____		
Morgen	200 mikrogram 800 mikrogram	# # # # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1
Kveld	200 mikrogram 800 mikrogram	# # # # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1

Side 32

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 33

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 34

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 Mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 Mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 Mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 Mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 35

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 36

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 37

UKENR #

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	200 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	800 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1	1

Side 38

Merknader

Side 39

Side 40

TITRERINGSVEILEDNING - TITRERINGSPAKNING

Side 1

Uptravi 100 mikrogram filmdrasjerte tabletter
seleksipag

Titreringsveiledning

Oppstart av behandling med Uptravi

Les det medfølgende pakningsvedlegget før du begynner på behandlingen. Rådfør deg med lege dersom du opplever bivirkninger, da legen kan anbefale at du endrer dosen med Uptravi.

Side 2

Innhold

Hvordan skal du ta Uptravi?	4
Hvordan skal du trappe opp dosen din?	6
Hva er trinnene?	8
Når skal du trappe ned?	10
Nedtrapping	12

Side 3

Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din	14
Dersom du glemmer å ta Uptravi.....	16
Dersom du avbryter behandling med Uptravi.....	17
Titreringsdagbok	18

Side 4

Hvordan skal du ta Uptravi?

Uptravi er en medisin som tas hver morgen og kveld for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, også kalt PAH.

Startdosen av Uptravi er 100 mikrogram **én gang om morgenen og én gang om kvelden**. Første inntak av Uptravi skal skje om kvelden. Du skal ta hver dose med et glass vann, fortrinnsvis under et måltid.

Side 5

Det er 2 faser i behandlingen med Uptravi:

Titring

De første ukene samarbeider du med legen om å finne den dosen av Uptravi som er riktig for deg. Det kan hende legen vil at du skal trappe opp fra startdosen til høyere doser av Uptravi. Det kan hende legen vil at du skal trappe ned til en lavere dose. Denne prosessen kalles titring. Den gjør at kroppen din gradvis blir vant til medisinen.

Vedlikehold

Når legen har funnet den dosen som er riktig for deg, vil det bli den dosen du skal ta regelmessig fremover. Den kalles vedlikeholdsdosen.

Side 6

Hvordan skal du trappe opp dosen din?

Du skal starte med en dose på 100 mikrogram morgen og kveld, og etter å ha drøftet det med lege eller sykepleier, trapper du opp til neste dose.

Første inntak av en økt dose skal skje om kvelden. Hvert trinn varer vanligvis ca. 1 uke. Det kan ta flere uker å finne den dosen som er riktig for deg.

Målet er å nå den dosen som er best egnet for å behandle deg.

Denne dosen vil bli din vedlikeholdsdose.


Side 7

Pasienter med PAH er forskjellige. **Ikke alle ender opp med samme vedlikeholdsdose.**

Noen pasienter skal ha 100 mikrogram morgen og kveld som sin vedlikeholdsdose, mens noen når høyeste dose på 800 mikrogram morgen og kveld.

Andre når en vedlikeholdsdose et sted mellom disse dosene. Det som er viktig er at du når den dosen som er best egnet for deg.

Side 8



Side 9

Side 10

↓Når skal du trappe ned?

Som med alle legemidler, kan det hende du opplever bivirkninger av Uptravi når du trapper opp til høyere doser.

Snakk med lege eller sykepleier dersom du får bivirkninger. Det finnes behandlinger som kan bidra til å lindre dem.

De vanligste bivirkningene (kan påvirke flere enn 1 av 10) ved bruk av Uptravi er:

- Hodepine • Diaré • Kvalme • Oppkast • Kjevsmerte • Muskelsmerte • Bensmerte • Leddsmerte • Ansiktsrødme


For en fullstendig liste over bivirkninger; se pakningsvedlegget for mer informasjon.

Side 11

Dersom bivirkningene er utolererbare selv etter at lege eller sykepleier har prøvd å behandle dem, kan det hende at han eller hun anbefaler at du trapper ned til en lavere dose.

Dersom lege eller sykepleier ber deg trappe ned til en lavere dose, skal du ta én 100 mikrogram tablett mindre om morgenen og én mindre om kvelden.

Du skal bare trappe ned dersom du har snakket med PAH-legen eller sykepleier. Denne nedtrappingsprosessen vil hjelpe deg med å finne den dosen som er riktig for deg, som også kalles din vedlikeholdsdose.



Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din

Den høyeste dosen du tåler under titrering, vil bli din **vedlikeholdsdose**. Vedlikeholdsdosen er den dosen du skal fortsette å ta regelmessig fremover. Lege eller sykepleier vil forskrive en **enkelt eller flere tablettstyrker** for vedlikeholdsdosen, slik at du kan ta bare én tablett om morgenen og én tablett om kvelden.

Dersom din høyeste tolererte dose under titrering var for eksempel 600 mikrogram én gang om morgenen og én gang om kvelden:



Etter hvert kan det hende lege eller sykepleier vil justere vedlikeholdsdosen din om det er behov for det.

Dersom du glemmer å ta Uptravi

Dersom du glemmer en dose, skal du ta dosen så snart du kommer på det og deretter fortsette å ta tablettene til de vanlige tidspunktene. Dersom det er mindre enn 6 timer til du vanligvis skulle tatt neste dose, skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette å ta medisinen til vanlig tid. **Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.**

Dersom du avbryter behandling med Uptravi

Ikke avbryt behandlingen, såfremt ikke legen din eller sykepleier ber deg om det. Dersom du av en eller annen grunn ikke har tatt Uptravi i mer enn 3 påfølgende dager (dersom du har glemt 6 doser på rad), **må du kontakte PAH-legen eller sykepleier umiddelbart, siden det kan hende at dosen din må justeres for å unngå bivirkninger.**

Det kan hende legen eller sykepleier bestemmer at du skal starte behandlingen igjen på en lavere dose og gradvis øke til din tidligere vedlikeholdsdose.

Titreringsdagbok

Les instruksjonene i pakningsvedlegget nøye.

De følgende dagboksidene kan hjelpe deg med å følge med på hvor mange tabletter du skal ta morgen og kveld under titreringen.

Bruk dem til å skrive ned hvor mange tabletter du tar morgen og kveld.

Hvert trinn varer vanligvis i cirka 1 uke, såfremt ikke legen eller sykepleier bestemmer noe annet. Dersom dine titreringstrinn varer lenger enn 1 uke, er det ekstra dagboksider som kan hjelpe deg å følge med på dette.



Bruk side 20 til 27 for å følge med på de første ukene av behandlingen, når du bare bruker tabletter på 100 mikrogram (trinn 1-4).



Dersom du har fått forskrevet både 100 og 400 mikrogram tabletter, bruker du side 30 til 37 (trinn 5-8).

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen eller sykepleier.

Skriv ned instruksjonene fra lege eller sykepleier:

Legens telefonnummer og e-post:

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Merknader:

UKE NR 1	Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ. Dato: _____	20	UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ. Dato: _____	21
Morgen	100 mikrogram O # # # # # # # #	Morgen	100 mikrogram # # # # # # # #		
Kveld	100 mikrogram # # # # # # # #	Kveld	100 mikrogram # # # # # # # #		
Det første inntak av en økt dose med Upravi bør skje om kvelden		Det første inntak av en økt dose med Upravi bør skje om kvelden			

UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ. Dato: _____	22	UKE NR #	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/ÅÅ. Dato: _____	23
Morgen	100 mikrogram # # # # # # # #	Morgen	100 mikrogram # # # # # # # #		
Kveld	100 mikrogram # # # # # # # #	Kveld	100 mikrogram # # # # # # # #		
		Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 400 mikrogram tabletter			

Side 24

UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	24	UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	25												
Dato: _____			Dato: _____														
Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 400 mikrogram tabletter									Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 400 mikrogram tabletter								

Side 25

Side 26



UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	26	UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	27												
Dato: _____			Dato: _____														
Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 400 mikrogram tabletter									Hopp til side 28 hvis legen din har forskrevet 400 mikrogram tabletter								

Side 27

Side 28

Bruk de følgende dagbokssidene dersom lege eller sykepleier har forskrevet 400 mikrogram tabletter i tillegg til 100 mikrogram tabletter.

På dagbokssidene kan du notere at du har tatt én 400 mikrogram tablett hver dag morgen og kveld, sammen med det forskrevne antall 100 mikrogram tabletter.

-  100 mikrogram tablett
-  400 mikrogram tablett (Brukes i trinn 5 til og med 8 for å redusere antall tableter som trengs pr. dose.)

Side 29

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen eller sykepleier.

Skriv ned instruksjonene fra lege eller sykepleier:

Legens telefonnummer og e-post:

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Merknader:

Side 30

UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	30	UKE NR: ##	Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.	31												
Dato: _____			Dato: _____														
Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1		400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#	Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1		400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 31

Side 32

UKE NR: # | 32

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 33

UKE NR: # | 33

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 34

UKE NR: # | 34

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 35

UKE NR: # | 35

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 36

UKE NR: # | 36

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 37

UKE NR: # | 37

Skriv ned nummeret for behandlingsuken i det øverste venstre hjørnet. Hver dag skriv ned i rutene nedenfor hvor mange tabletter du tar om morgenen og kvelden. Jeg snakket med legen eller sykepleieren den DD/MM/AA.

Dato: _____

Morgen	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Morgen	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1
Kveld	100 mikrogram	#	#	#	#	#	#	#
Kveld	400 mikrogram	1	1	1	1	1	1	1

Side 38

Merknader

Side 39

Side 40