

**ANEXO I**

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO**

## 1. NOME DO MEDICAMENTO

Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película  
Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película  
Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

### Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película

Cada comprimido revestido por película contém 1 mg de baricitinib.

### Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película

Cada comprimido revestido por película contém 2 mg de baricitinib.

### Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película

Cada comprimido revestido por película contém 4 mg de baricitinib.

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

## 3. FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido revestido por película (comprimido)

### Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película

Comprimidos redondos, cor rosa muito pálido, com 6,75 mm de dimensão, gravados com “Lilly” numa das faces e “1” na outra.

### Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película

Comprimidos oblongos de cor rosa-pálido, com 9 x 7,5 mm de dimensão, gravados com “Lilly” numa das faces e “2” na outra.

### Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película

Comprimidos redondos, cor-de-rosa, com 8,5 mm, gravados com “Lilly” numa das faces e “4” na outra.

Os comprimidos têm uma zona côncava em cada uma das faces.

## 4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

### 4.1 Indicações terapêuticas

#### Artrite reumatoide

O baricitinib é indicado para tratamento da artrite reumatoide ativa moderada a grave em doentes adultos com resposta inadequada ou intolerância a um ou mais antirreumáticos modificadores da doença (*disease modifying anti rheumatic drugs* - DMARDs). O baricitinib pode ser usado em monoterapia ou em

associação com metotrexato (ver secções 4.4, 4.5 e 5.1 sobre os dados disponíveis relativamente a diferentes associações).

#### Dermatite atópica

O baricitinib é indicado para tratamento da dermatite atópica moderada a grave em doentes adultos e pediátricos, com idade igual ou superior a 2 anos, elegíveis para terapêutica sistémica.

#### Alopecia areata

O baricitinib é indicado para tratamento da alopecia areata grave em doentes adultos (ver secção 5.1).

#### Artrite idiopática juvenil

O baricitinib é indicado para tratamento da artrite idiopática juvenil ativa em doentes com idade igual ou superior a 2 anos que tiveram uma resposta inadequada ou intolerância prévia a um ou mais DMARDs sintéticos convencionais ou biológicos:

- Artrite idiopática juvenil poliarticular (fator reumatoide poliarticular positivo [RF+] ou negativo [RF-], oligoarticular estendido),
- Artrite relacionada com entesite, e
- Artrite psoriática juvenil.

O baricitinib pode ser usado em monoterapia ou em associação com metotrexato.

### **4.2 Posologia e modo de administração**

O tratamento deve ser iniciado por médicos experientes no diagnóstico e tratamento das patologias para as quais este medicamento é indicado.

#### Posologia

##### Artrite reumatoide

A dose recomendada do baricitinib é de 4 mg uma vez por dia. É recomendada uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes com risco elevado de tromboembolismo venoso (TEV), acontecimentos cardiovasculares *major* (*major adverse cardiovascular events – MACE*) e neoplasias malignas, para doentes com idade  $\geq 65$  anos e para doentes com história de infeções crónicas ou recorrentes (ver secção 4.4). Poderá ser considerada uma dose de 4 mg, uma vez por dia, para doentes que não mantêm controlo adequado da atividade da doença com a dose de 2 mg, uma vez por dia. Deve considerar-se uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes que conseguiram manter o controlo da atividade da doença com a dose de 4 mg, uma vez por dia, e são elegíveis para redução da dose (ver secção 5.1).

##### Dermatite atópica

##### *Adultos*

A dose recomendada do baricitinib é de 4 mg uma vez por dia. É recomendada uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes com risco elevado de TEV, MACE e neoplasias malignas, para doentes com idade  $\geq 65$  anos e para doentes com história de infeções crónicas ou recorrentes (ver secção 4.4). Poderá ser considerada uma dose de 4 mg, uma vez por dia, para doentes que não mantêm controlo adequado da atividade da doença com a dose de 2 mg, uma vez por dia. Deve considerar-se uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes que conseguiram manter o controlo da atividade da doença com a dose de 4 mg, uma vez por dia, e são elegíveis para redução da dose (ver secção 5.1).

O baricitinib pode ser utilizado com ou sem corticosteroides tópicos. A eficácia do baricitinib pode ser reforçada quando administrado com corticosteroides tópicos (ver secção 5.1). Podem ser utilizados inibidores da calcineurina tópicos, embora devam ser limitados apenas às áreas sensíveis, como o rosto, o pescoço, áreas intertriginosas e genitais.

Deve considerar-se a suspensão do tratamento em doentes que não apresentem evidência de benefício terapêutico após 8 semanas de tratamento.

#### *Crianças e adolescentes (com idade igual ou superior a 2 anos)*

A dose recomendada do baricitinib é de 4 mg, uma vez por dia, para doentes com peso igual ou superior a 30 kg. Para doentes com peso entre 10 kg e menos de 30 kg, a dose recomendada é de 2 mg, uma vez por dia. Deve considerar-se uma redução da dose para metade, para doentes que conseguiram manter o controlo da atividade da doença com a dose recomendada e que são elegíveis para redução da dose.

O baricitinib pode ser utilizado com ou sem corticosteroides tópicos. Podem ser utilizados inibidores da calcineurina tópicos, embora devam ser limitados apenas às áreas sensíveis, como o rosto, o pescoço, áreas intertriginosas e genitais.

Deve considerar-se a descontinuação do tratamento em doentes que não apresentem evidência de benefício terapêutico após 8 semanas de tratamento.

#### *Alopecia areata*

A dose recomendada do baricitinib é de 4 mg, uma vez por dia. É recomendada uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes com risco elevado de TEV, MACE e neoplasias malignas, para doentes com idade  $\geq 65$  anos e para doentes com história de infeções crónicas ou recorrentes (ver secção 4.4). Poderá ser considerada uma dose de 4 mg, uma vez por dia, para doentes que não mantêm controlo adequado da atividade da doença com a dose de 2 mg, uma vez por dia. Deve considerar-se uma dose de 2 mg, uma vez por dia, para doentes que conseguiram manter o controlo da atividade da doença com a dose de 4 mg, uma vez por dia, e são elegíveis para redução da dose (ver secção 5.1).

Uma vez alcançada uma resposta estável, recomenda-se continuar o tratamento durante pelo menos vários meses, a fim de evitar recaídas. O benefício-risco do tratamento deve ser reavaliado em intervalos regulares numa base individual.

Deve considerar-se a descontinuação do tratamento em doentes que não apresentem evidência de benefício terapêutico após 36 semanas de tratamento.

#### *Artrite idiopática juvenil (de 2 a 18 anos de idade)*

A dose recomendada do baricitinib é de 4 mg, uma vez ao dia, para doentes com peso igual ou superior a 30 kg. Para doentes com peso entre 10 kg e 30 kg, a dose recomendada é de 2 mg, uma vez ao dia.

Deve considerar-se a descontinuação do tratamento em doentes que não apresentem evidência de benefício terapêutico após 12 semanas de tratamento.

#### *Início do tratamento*

O tratamento não deve ser iniciado em doentes com contagem absoluta de linfócitos (ALC) inferior a  $0,5 \times 10^9$  células/l, uma contagem absoluta de neutrófilos (ANC) inferior a  $1 \times 10^9$  células/l ou com um valor da hemoglobina inferior a 8 g/dl. O tratamento pode ser iniciado quando os valores aumentarem para lá destes limites (ver secção 4.4).

### Redução da dose

Em doentes tratados com inibidores fortes do Transportador Aniónico Orgânico 3 (OAT3) como a probenecida, ou com depuração da creatinina entre 30 e 60 ml/min a dose recomendada deve ser reduzida para metade nos doentes pediátricos e a dose recomendada para doentes adultos é de 2 mg (ver secção 4.5).

### Populações especiais

#### *Compromisso renal*

A dose recomendada é de 2 mg, uma vez por dia, em doentes adultos com depuração da creatinina entre 30 e 60 ml/min. Em doentes pediátricos com depuração da creatinina entre 30 e 60 ml/min, a dose recomendada do baricitinib deve ser reduzida para metade. Não se recomenda a utilização do baricitinib em doentes com depuração da creatinina < 30 ml/min (ver secção 5.2).

#### *Compromisso hepático*

Não é necessário um ajuste da dose em doentes com insuficiência hepática ligeira ou moderada. Não se recomenda a utilização do baricitinib em doentes com insuficiência hepática grave (ver secção 5.2).

#### *Idosos*

A experiência clínica em doentes com idade  $\geq 75$  anos é muito limitada.

#### *População pediátrica (menos de 2 anos)*

A segurança e eficácia do baricitinib em crianças com menos de 2 anos ainda não foram estabelecidas. Não estão disponíveis dados nesta população. Consulte a secção 4.2 acima para informações sobre a posologia em crianças com idade igual ou superior a 2 anos.

A segurança e eficácia do baricitinib em crianças com menos de 18 anos de idade com alopecia areata ainda não foram estabelecidas. Não existem dados disponíveis.

### Modo de administração

Administração oral.

O baricitinib deve ser tomado uma vez por dia com ou sem alimentos e pode ser tomado a qualquer hora do dia.

#### *Administração alternativa para crianças*

Para doentes pediátricos incapazes de engolir comprimidos inteiros, pode considerar-se a dispersão dos comprimidos em água. Apenas água deve ser usada para dispersar o comprimido. Apenas o número de comprimidos necessários para a dose deve ser disperso.

Se, por qualquer motivo, a suspensão total não for administrada, não disperse nem administre outro comprimido, mas espere até à próxima dose calendarizada.

Para instruções sobre a dispersão do medicamento antes da administração, ver secção 6.6.

## **4.3 Contraindicações**

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

Gravidez (ver secção 4.6).

#### 4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas para doentes:

- com idade igual ou superior a 65 anos;
- doentes com história de doença cardiovascular aterosclerótica ou outros fatores de risco cardiovascular (tais como fumadores atuais ou ex-fumadores que tenham fumado durante um longo período de tempo);
- doentes com fatores de risco de neoplasias malignas (ex. neoplasia maligna atual ou história de neoplasia maligna)

##### Utilização de inibidores das JAK em doentes com idade igual ou superior a 65 anos

Considerando o risco aumentado de acontecimentos cardiovasculares adversos *major* (MACE), neoplasias malignas, infeções graves, e mortalidade por todas as causas em doentes com idade igual ou superior a 65 anos, conforme observado num grande estudo aleatorizado do tofacitinib (outro inibidor das JAK), o baricitinib apenas deve ser utilizado nestes doentes se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.

##### Infeções

Foram notificadas infeções graves e por vezes fatais em doentes a receber outros inibidores das JAK.

O baricitinib está associado a uma taxa acrescida de infeções, tais como infeções do trato respiratório superior, em comparação com o placebo (ver secção 4.8). Em estudos clínicos na artrite reumatoide, a terapêutica combinada com metotrexato resultou num aumento da frequência de infeções em comparação com a monoterapia com baricitinib.

Os riscos e benefícios do tratamento devem ser cuidadosamente avaliados antes do início do tratamento com baricitinib em doentes com infeções ativas, crónicas ou recorrentes (ver secção 4.2). Se se desenvolver uma infeção, o doente deverá ser cuidadosamente monitorizado, e o tratamento temporariamente interrompido, se o doente não responder ao tratamento padrão. O tratamento só deverá ser retomado depois da resolução da infeção.

Como há uma maior incidência de infeções em idosos e na população diabética em geral, deve ter-se precaução no tratamento de idosos e doentes com diabetes. Em doentes com mais de 65 anos de idade, baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.

##### *Tuberculose*

Deve ser feito o rastreio da tuberculose (TB) antes de os doentes iniciarem o tratamento. O baricitinib não deve ser administrado a doentes com TB ativa. Deverá considerar-se terapêutica anti-TB antes de iniciar o tratamento em doentes com TB latente previamente não tratada.

##### Anomalias hematológicas

Nos ensaios clínicos foram notificadas contagens absolutas de neutrófilos (ANC)  $< 1 \times 10^9$  células/l, contagens absolutas de linfócitos (ALC)  $< 0,5 \times 10^9$  células/l, e hemoglobina  $< 8$  g/dl.

Se, durante a rotina de monitorização do doente, se observarem ANC  $< 1 \times 10^9$  células/l, ALC  $< 0,5 \times 10^9$  células/l ou hemoglobina  $< 8$  g/dl, o tratamento não deve ser iniciado, ou deve ser temporariamente interrompido (ver secção 4.2).

O risco de linfocitose é maior em doentes idosos com artrite reumatoide. Foram notificados casos raros de doenças linfoproliferativas.

### Reativação viral

Nos estudos clínicos foi notificada reativação viral, incluindo casos de reativação do vírus herpes (por exemplo, herpes *zoster*, herpes *simplex*) (ver secção 4.8). Em estudos clínicos na artrite reumatoide, herpes *zoster* foi notificado com maior frequência em doentes com  $\geq 65$  anos de idade anteriormente tratados com fármacos DMARDs biológicos e sintéticos convencionais. Se um doente desenvolver herpes *zoster*, o tratamento deverá ser temporariamente interrompido até à resolução do episódio.

Antes de iniciar o tratamento com baricitinib, deverá fazer-se o rastreio de hepatite viral, de acordo com as orientações clínicas. Os doentes com evidência de hepatite B ou C ativa foram excluídos dos ensaios clínicos. Os doentes positivos para anticorpos do vírus da hepatite C, mas negativos para o ARN do vírus da hepatite C foram autorizados a participar. Os doentes com anticorpos de superfície da hepatite B e anticorpos antinucleares da hepatite B, sem o antigénio de superfície da hepatite B, também foram autorizados a participar; estes doentes devem ser monitorizados relativamente à expressão do ADN do vírus da hepatite B (VHB). Se a presença de ADN-VHB for detetada, deverá ser consultado um especialista em doenças hepáticas para determinar se se justifica a interrupção do tratamento.

### Vacinação

Não há dados disponíveis sobre a resposta à vacinação com vacinas vivas em doentes tratados com baricitinib. Não se recomenda a utilização de vacinas vivas atenuadas durante, ou imediatamente antes, do tratamento com baricitinib. Antes de iniciar o tratamento, recomenda-se que todos os doentes, e particularmente doentes pediátricos, sejam atualizados com todas as imunizações de acordo com as orientações de vacinação atuais.

### Lípidos

Foram notificadas elevações dos parâmetros lipídicos no sangue, dependentes da dose, em doentes pediátricos e adultos tratados com baricitinib (ver secção 4.8). Nos adultos, as elevações nas lipoproteínas de baixa densidade (LDL) do colesterol diminuíram para os níveis anteriores ao tratamento em resposta à terapêutica com estatinas. Os parâmetros lipídicos, em doentes pediátricos e adultos, devem ser avaliados aproximadamente 12 semanas após o início do tratamento e, posteriormente, os doentes devem ser tratados de acordo com as orientações clínicas internacionais para a hiperlipidemia.

### Elevação das transaminases hepáticas

Foram notificadas elevações na atividade da alanina transaminase (ALT) e da aspartato transaminase (AST) no sangue, dependentes da dose, em doentes tratados com baricitinib (ver secção 4.8).

Nos ensaios clínicos, foram notificadas elevações da ALT e da AST para  $\geq 5$  e  $\geq 10$  x o limite superior do normal (LSN). Em estudos clínicos na artrite reumatoide, a terapêutica combinada com metotrexato resultou numa frequência acrescida de elevações das transaminases hepáticas em comparação com a monoterapia com baricitinib (ver secção 4.8).

Se se observarem elevações da ALT ou AST durante o tratamento, ou se suspeitar de doença hepática induzida pelo fármaco, o tratamento deve ser temporariamente interrompido até que o diagnóstico seja excluído.

### Neoplasias malignas

Os medicamentos imunomoduladores podem aumentar o risco de neoplasias malignas, incluindo linfoma. Foram notificados linfoma e outras neoplasias malignas em doentes a receber inibidores das JAK, incluindo baricitinib.

Num grande estudo aleatorizado, controlado com comparador ativo, do tofacitinib (outro inibidor das JAK) em doentes com artrite reumatoide com idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos um fator de risco cardiovascular adicional, foi observada uma taxa mais alta de neoplasias malignas, particularmente cancro do pulmão, linfoma e cancro de pele não-melanoma (CPNM) com tofacitinib em comparação com inibidores do TNF.

Em doentes com mais de 65 anos de idade, doentes que são fumadores atuais ou ex-fumadores que tenham fumado durante um longo período de tempo, ou com outros fatores de risco de neoplasias malignas (por ex., neoplasia maligna atual ou história de neoplasia maligna), baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.

O exame periódico da pele é recomendado para todos os doentes, particularmente para aqueles com fatores de risco para o cancro de pele.

Os dados clínicos disponíveis são insuficientes para avaliar a incidência potencial de neoplasias malignas após a exposição ao baricitinib. Estão em curso avaliações da segurança a longo prazo.

### Tromboembolismo venoso

Num estudo observacional retrospectivo do baricitinib em doentes com artrite reumatoide, foi observada uma taxa mais elevada de acontecimentos tromboembólicos venosos (TEV) em comparação com doentes tratados com inibidores do TNF (ver secção 4.8).

Num grande estudo aleatorizado, controlado com comparador ativo, do tofacitinib (outro inibidor das JAK) em doentes com artrite reumatoide com idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos um fator de risco cardiovascular adicional, uma taxa maior de TEV dependente da dose, incluindo trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP) foi observada com tofacitinib em comparação com inibidores do TNF.

Em doentes com fatores de risco cardiovasculares ou de neoplasia maligna (ver também secção 4.4 “Acontecimentos cardiovasculares adversos *major* (*major adverse cardiovascular events* - MACE)” e “Neoplasias malignas”), baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.

Em doentes com fatores de risco de TEV conhecidos que não sejam fatores de risco cardiovasculares ou de neoplasia maligna, o baricitinib deve ser utilizado com precaução. Os fatores de risco para TEV que não sejam fatores de risco cardiovasculares ou de neoplasia maligna incluem TEV prévios, doentes submetidos a cirurgia *major*, imobilização, utilização de contraceção hormonal combinada ou terapêutica de substituição hormonal, e distúrbios de coagulação hereditários.

Os doentes devem ser reavaliados periodicamente durante o tratamento com baricitinib para avaliar as alterações no risco de TEV.

Os doentes com sinais e sintomas de TEV devem ser avaliados imediatamente e deve descontinuar-se baricitinib em doentes com suspeita de TEV, independentemente da dose ou da indicação.

### Acontecimentos adversos cardiovasculares *major* (MACE)

Num estudo observacional retrospectivo de baricitinib em doentes com artrite reumatoide, foi observada uma taxa mais elevada de MACE em comparação com doentes tratados com inibidores de TNF.

Num grande estudo aleatorizado, controlado com comparador ativo, do tofacitinib (outro inibidor das JAK) em doentes com artrite reumatoide com idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos um fator

de risco cardiovascular adicional, foi observada uma taxa mais elevada de MACE), definida como morte cardiovascular, enfarte do miocárdio (EM) não-fatal e acidente vascular cerebral não-fatal, com tofacitinib (outro inibidor das JAK) em comparação com inibidores de TNF.

Consequentemente, em doentes com mais de 65 anos de idade, doentes que são fumadores atuais ou ex-fumadores que tenham fumado durante um longo período de tempo e doentes com história de doença cardiovascular aterosclerótica ou outros fatores de risco cardiovascular, baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.

### Monitorização laboratorial

**Tabela 1. Parâmetros laboratoriais e orientações sobre a monitorização**

Parâmetro laboratorial	Ação	Orientação sobre a monitorização
Parâmetros lipídicos	Os doentes devem ser tratados de acordo com as orientações clínicas internacionais para a hiperlipidemia	12 semanas após o início do tratamento e, posteriormente, de acordo com as orientações clínicas internacionais para a hiperlipidemia
Contagem absoluta de neutrófilos (ANC)	O tratamento deve ser interrompido se a ANC < $1 \times 10^9$ células/l e pode ser retomado quando a ANC voltar a um valor superior a este	Antes do início do tratamento e, posteriormente, de acordo com a terapêutica de rotina dos doentes
Contagem absoluta de linfócitos (ALC)	O tratamento deve ser interrompido se ALC < $0,5 \times 10^9$ células/l e pode ser retomado quando a ALC voltar a um valor superior a este	
Hemoglobina (Hb)	O tratamento deve ser interrompido se Hb < 8 g/dl e pode ser retomado quando a HB voltar a um valor superior a este	
Transaminases hepáticas	O tratamento deve ser temporariamente interrompido se houver suspeita de lesão hepática induzida pelo fármaco	

### Medicamentos imunossupressores

Não se recomenda a associação com DMARDs biológicos, imunomoduladores biológicos ou outros inibidores de Janus quinases (JAKs), pois não se pode excluir o risco de um efeito aditivo de imunossupressão.

Na artrite reumatoide e na artrite idiopática juvenil, os dados sobre a utilização do baricitinib com imunossupressores potentes diferentes do metotrexato (por exemplo, azatioprina, tacrolímus, ciclosporina) são limitados. Recomenda-se precaução aquando da utilização destas associações (ver secção 4.5).

Na dermatite atópica e na alopecia areata, a associação com ciclosporina ou outros imunossupressores potentes não foi estudada e não é recomendada (ver secção 4.5).

### Hipersensibilidade

Na experiência pós-comercialização, foram notificados casos de hipersensibilidade a medicamentos associados à administração do baricitinib. Se ocorrer alguma reação alérgica ou anafilática grave, o tratamento deve ser descontinuado imediatamente.

## Diverticulite

Foram relatados casos de diverticulite e perfuração gastrointestinal em ensaios clínicos e de fontes de dados pós-comercialização (ver secção 4.8). O baricitinib deve ser utilizado com precaução em doentes com doença diverticular e, especialmente, em doentes tratados cronicamente com medicamentos concomitantes associados a um risco acrescido de diverticulite: medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, corticosteroides e opioides. Os doentes que apresentem novos sinais e sintomas abdominais devem ser avaliados imediatamente para identificação precoce de diverticulite ou perfuração gastrointestinal.

## Excipientes

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

## **4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação**

### Interações farmacodinâmicas

#### *Medicamentos imunossupressores*

A associação com DMARDs biológicos, imunomoduladores biológicos ou outros inibidores das JAKs não foi estudada. Na artrite reumatoide e artrite idiopática juvenil, a utilização do baricitinib com medicamentos imunossupressores potentes, como azatioprina, tacrolímus ou ciclosporina foi limitada nos estudos clínicos, não sendo possível excluir o risco de um efeito aditivo de imunossupressão. Na dermatite atópica e na alopecia areata, a associação com ciclosporina ou outros imunossupressores potentes não foi estudada e não é recomendada (ver secção 4.4).

### Potencial de outros medicamentos para afetar a farmacocinética do baricitinib

#### *Transportadores*

*In vitro*, o baricitinib é um substrato do transportador aniónico orgânico 3 (OAT3), da P-glicoproteína (Pgp), da proteína de resistência do cancro da mama (BCRP) e do transportador de extrusão de múltiplos fármacos e toxinas (MATE)2-K. Num estudo de farmacologia clínica, a administração de probenecida (um inibidor do OAT3 com forte potencial de inibição) resultou num aumento aproximadamente para o dobro da  $AUC_{(0-\infty)}$ , sem alterações da  $t_{max}$  ou  $C_{max}$  do baricitinib. Consequentemente, para doentes em tratamento com inibidores do OAT3 com forte potencial de inibição, como a probenecida, a dose recomendada de baricitinib deve ser reduzida para metade (ver secção 4.2). Não foi realizado qualquer estudo de farmacologia clínica com inibidores do OAT3 com menor potencial de inibição. O pró-fármaco leflunomida converte-se rapidamente em teriflunomida, que é um inibidor fraco do OAT3, podendo por isso provocar um aumento da exposição ao baricitinib. Uma vez que não foram realizados estudos dedicados de interação, recomenda-se precaução quando leflunomida ou teriflunomida forem administradas concomitantemente com baricitinib. A administração concomitante dos inibidores do OAT3 ibuprofeno e diclofenac pode levar a um aumento da exposição ao baricitinib. No entanto, o seu potencial de inibição do OAT3 é inferior comparativamente ao da probenecida, pelo que não é expectável qualquer interação clinicamente relevante. A administração concomitante do baricitinib e ciclosporina (inibidor de Pgp/BCRP) ou metotrexato (substrato de vários transportadores, incluindo OATP1B1, OAT1, OAT3, BCRP, MRP2, MRP3 e MRP4) não apresentou quaisquer efeitos clinicamente significativos sobre a exposição ao baricitinib.

#### *Enzimas do citocromo P450*

*In vitro*, baricitinib é uma enzima do substrato do citocromo P450 (CYP)3A4, embora menos de 10 % da dose seja metabolizada através de oxidação. Em estudos de farmacologia clínica, a coadministração do baricitinib com cetoconazol (forte inibidor do CYP3A) não resultou em qualquer efeito clinicamente significativo sobre a farmacocinética de baricitinib. A coadministração do baricitinib com fluconazol

(inibidor moderado do CYP3A/CYP2C19/CYP2C9) ou rifampicina (forte indutor do CYP3A) não causou quaisquer alterações clinicamente significativas da exposição ao baricitinib.

#### *Agentes modificadores do pH gástrico*

A elevação do pH gástrico com omeprazol não teve qualquer efeito clinicamente significativo sobre a exposição ao baricitinib.

#### Potencial do baricitinib para afetar a farmacocinética de outros medicamentos

##### *Transportadores*

*In vitro*, o baricitinib não é um inibidor do OAT1, OAT2, OAT3, do transportador catiónico orgânico (OCT) 2, OATP1B1, OATP1B3, BCRP, MATE1 e MATE2-K a concentrações clinicamente relevantes. O baricitinib pode ser um inibidor clinicamente relevante do OCT1, no entanto, não existem atualmente substratos do OCT1 seletivos conhecidos, em relação aos quais possam prever-se interações clinicamente significativas. Em estudos de farmacologia clínica não houve quaisquer efeitos clinicamente significativos na exposição ao baricitinib, quando baricitinib foi coadministrado com digoxina (substrato Pgp) ou metotrexato (substrato de vários transportadores).

##### *Enzimas do citocromo P450*

Em estudos de farmacologia clínica, a administração concomitante do baricitinib com os substratos do CYP3A sinvastatina, etinilestradiol ou levonorgestrel não originou quaisquer alterações clinicamente significativas na farmacocinética destes medicamentos.

## **4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento**

### Gravidez

Foi demonstrado que a via JAK/STAT está envolvida na adesão e polaridade celular, o que pode afetar o desenvolvimento embrionário precoce. Não existem dados suficientes sobre a utilização do baricitinib em mulheres grávidas. Os estudos em animais revelaram toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). O baricitinib teve um efeito teratogénico em ratos e coelhos. Os estudos em animais sugerem que baricitinib, em doses mais elevadas, pode ter um efeito adverso sobre o desenvolvimento ósseo *in utero*.

O baricitinib está contraindicado durante a gravidez (ver secção 4.3). As mulheres com potencial para engravidar devem usar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento e, pelo menos, durante 1 semana após o tratamento. Se uma doente engravidar durante o tratamento com baricitinib, os pais devem ser informados sobre o risco potencial para o feto.

### Amamentação

Desconhece-se se o baricitinib ou os seus metabolitos são excretados no leite materno. Os dados farmacodinâmicos/toxicológicos disponíveis em animais demonstraram que o baricitinib é excretado no leite materno (ver secção 5.3).

Não se pode excluir um risco para os recém-nascidos/lactentes, e o baricitinib não deve ser utilizado durante a amamentação. A descontinuação da amamentação ou a descontinuação do tratamento deve ser decidida com base no benefício da amamentação para a criança e do medicamento para a mãe.

### Fertilidade

Os estudos em animais sugerem que o tratamento com baricitinib tem o potencial de reduzir a fertilidade da fêmea durante o tratamento, mas não se verificou qualquer efeito na espermatogénese do macho (ver secção 5.3).

#### 4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos do baricitinib sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

#### 4.8 Efeitos indesejáveis

##### Resumo do perfil de segurança

As reações adversas mais frequentes notificadas com baricitinib foram a elevação do colesterol LDL (26,0 %), infecções do trato respiratório superior (16,9 %), cefaleias (5,2 %), herpes *simplex* (3,2 %) e infecções do trato urinário (2,9 %). Pneumonia grave e herpes *zoster* grave foram pouco frequentes em doentes com artrite reumatoide.

##### Tabela com lista de reações adversas

Estimativa da frequência: Muito frequentes ( $\geq 1/10$ ), frequentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ), pouco frequentes ( $\geq 1/1000$  a  $< 1/100$ ), raras ( $\geq 1/10\ 000$  a  $< 1/1000$ ), muito raras ( $< 1/10\ 000$ ). As frequências apresentadas na Tabela 2 baseiam-se nos dados integrados de ensaios clínicos em adultos e/ou no contexto de pós-comercialização das indicações de artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia areata, salvo indicação em contrário; nos casos em que se observaram diferenças consideráveis entre as indicações, estas são apresentadas nas notas de rodapé a seguir à tabela.

**Tabela 2. Reações adversas**

Classes de sistemas de órgãos	Muito frequentes	Frequentes	Pouco frequentes
Infeções e infestações	Infeções do trato respiratório superior	Herpes <i>zoster</i> <sup>b</sup> Herpes <i>simplex</i> Gastroenterite Infeções do trato urinário Pneumonia <sup>d</sup> Foliculite <sup>g</sup>	
Doenças do sangue e do sistema linfático		Trombocitose >600 x 10 <sup>9</sup> células/l <sup>a, d</sup>	Neutropenia <1 x 10 <sup>9</sup> células/l <sup>a</sup>
Doenças do sistema imunitário			Edema da face Urticária
Doenças do metabolismo e da nutrição	Hipercolesterolemia <sup>a</sup>		Hipertrigliceridemia <sup>a</sup>
Doenças do sistema nervoso		Cefaleias	
Vasculopatias			Trombose venosa profunda <sup>b</sup>
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino			Embolismo pulmonar <sup>f</sup>
Doenças gastrointestinais		Náuseas <sup>d</sup> Dor abdominal <sup>d</sup>	Diverticulite
Doenças hepatobiliares		Elevação da ALT ≥3 x LSN <sup>a, d</sup>	Elevação da AST ≥3 x LSN <sup>a, c</sup>
Doenças dos tecidos cutâneos e subcutâneos		Erupção cutânea Acne <sup>c</sup>	
Exames complementares de diagnóstico		Elevação da creatina fosfoquinase >5 x LSN <sup>a, c</sup>	Aumento de peso

<sup>a</sup> Inclui alterações detetadas durante a monitorização laboratorial (ver texto abaixo).

<sup>b</sup> A frequência de herpes *zoster* e trombose venosa profunda baseia-se em ensaios clínicos na artrite reumatoide.

<sup>c</sup> Em ensaios clínicos na artrite reumatoide, a frequência do acne e da elevação da creatina fosfoquinase >5 x LSN foi pouco frequente.

<sup>d</sup> Nos ensaios clínicos na dermatite atópica, a frequência náuseas e ALT ≥3 x LSN foi pouco frequente. Nos ensaios clínicos na alopecia areata, a frequência de dor abdominal foi pouco frequente. Nos ensaios clínicos de dermatite atópica e alopecia areata, a frequência de pneumonia e trombocitose > 600 x 10<sup>9</sup> células/l foi pouco frequente.

<sup>e</sup> Nos ensaios clínicos na alopecia areata, a frequência de AST ≥ 3 x LSN foi frequente.

<sup>f</sup> A frequência de embolismo pulmonar baseia-se nos ensaios clínicos de artrite reumatoide e dermatite atópica.

<sup>g</sup> Foi observada foliculite na alopecia areata nos ensaios clínicos. Foi localizada geralmente na região do couro cabeludo associada à regeneração do cabelo.

## Descrição de reações adversas

### *Doenças gastrointestinais*

Em estudos clínicos na artrite reumatoide com doentes não previamente tratados, a frequência de náuseas, ao longo de 52 semanas, foi maior com a terapêutica combinada com metotrexato e baricitinib (9,3 %) do que com a monoterapia com metotrexato (6,2 %) ou a monoterapia com baricitinib (4,4 %). Nos dados integrados de ensaios clínicos de artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia areata, as náuseas foram mais frequentes durante as duas primeiras semanas de tratamento.

Em geral os casos de dor abdominal foram ligeiros, transitórios, não estiveram associados com infeções ou doenças gastrointestinais inflamatórias, e não levaram à interrupção do tratamento.

### *Infeções*

Nos dados integrados dos ensaios clínicos de artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia areata, a maioria das infeções foi de gravidade ligeira a moderada. Em estudos que incluíram ambas as doses, foram notificadas infeções em 31,0 %, 25,7 % e 26,7 % dos doentes dos grupos de 4 mg, 2 mg e placebo, respetivamente. Nos estudos clínicos na artrite reumatoide, a associação de metotrexato resultou num aumento da frequência de infeções em comparação com a monoterapia com baricitinib. A frequência de herpes *zoster* foi frequente na artrite reumatoide, muito rara na dermatite atópica e pouco frequente na alopecia areata. Em ensaios clínicos na dermatite atópica, existiram menos infeções cutâneas a necessitarem de tratamento com antibióticos com baricitinib do que com placebo.

A incidência de infeções graves com baricitinib foi semelhante ao placebo. A incidência de infeções graves permaneceu estável durante a exposição prolongada. A taxa de incidência geral de infeções graves no programa de ensaios clínicos foi de 3,2 por 100 doentes-ano na artrite reumatoide, 2,1 na dermatite atópica e 0,8 na alopecia areata. Pneumonia grave e herpes *zoster* grave foram pouco frequentes em doentes com artrite reumatoide.

### *Elevação das transaminases hepáticas*

Foram notificadas elevações na atividade da ALT e da AST no sangue, dose dependente, em estudos estendidos ao longo da semana 16. As elevações na média de ALT/AST permaneceram estáveis ao longo do tempo. As elevações das transaminases hepáticas  $\geq 3 \times$  LSN foram, na sua maioria, assintomáticas e transitórias.

Em doentes com artrite reumatoide, a combinação do baricitinib com medicamentos potencialmente hepatotóxicos, como o metotrexato, resultou no aumento da frequência dessas elevações.

### *Elevações dos lípidos*

Em dados integrados de ensaios clínicos da artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia areata, o tratamento com baricitinib ficou associado a elevações dependentes da dose dos parâmetros lipídicos, incluindo o colesterol total, o colesterol LDL e o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL). Não se verificou qualquer alteração no rácio LDL/HDL. As elevações foram observadas às 12 semanas e mantiveram-se estáveis daí em diante com um valor superior ao da linha de base, incluindo o estudo de extensão a longo prazo na artrite reumatoide. A média do colesterol total e do colesterol LDL aumentaram até à semana 52 em doentes com dermatite atópica e alopecia areata. Em ensaios clínicos na artrite reumatoide, o tratamento com baricitinib foi associado a um aumento dos triglicéridos dose dependente. Nos ensaios clínicos da dermatite atópica e alopecia areata não se observou nenhum aumento dos níveis de triglicéridos.

As elevações do colesterol LDL diminuíram para níveis pré-tratamento em resposta à terapêutica com estatinas.

### *Creatina fosfoquinase (CPK)*

O tratamento com baricitinib foi associado a aumentos de CPK dependentes da dose. A CPK média aumentou na Semana 4 e, posteriormente, manteve-se a um nível superior à linha de base. Entre as

indicações, na maioria dos casos de elevações da CPK >5 x LSN, estas foram transitórias e não obrigaram à descontinuação do tratamento.

Nos ensaios clínicos, não existiram casos confirmados de rabdomiólise.

#### *Neutropenia*

As contagens médias de neutrófilos diminuiram às 4 semanas e permaneceram estáveis ao longo do tempo a um nível inferior à linha de base. Não houve uma relação clara entre a neutropenia e a ocorrência de infecções graves. No entanto, em estudos clínicos, o tratamento foi interrompido em resposta a ANC < 1 x 10<sup>9</sup> células/l.

#### *Trombocitose*

Elevações das contagens médias de plaquetas dependentes da dose foram observadas e mantiveram-se estáveis ao longo do tempo, com um valor superior ao da linha de base.

#### População pediátrica

##### *Artrite idiopática juvenil*

Um total de 220 doentes entre 2 e 18 anos de idade foram expostos a qualquer dose do baricitinib no programa de ensaio clínico de artrite idiopática juvenil, representando 326 anos de exposição de doentes.

Em doentes pediátricos tratados com baricitinib, no período de retirada do ensaio clínico aleatorizado duplamente-cego controlado por placebo, de artrite idiopática juvenil (n=82), a cefaleia foi muito frequente (11 %), a neutropenia < 1000 células/mm<sup>3</sup> foi frequente (2,4 %, um doente) e a embolia pulmonar foi frequente (1,2 %, um doente).

##### *Dermatite atópica pediátrica*

A avaliação de segurança em crianças e adolescentes é baseada nos dados de segurança do estudo de fase III BREEZE-AD-PEDS, no qual 466 doentes com idades entre os 2 e 18 anos receberam qualquer dose do baricitinib. No geral, o perfil de segurança nestes doentes foi comparável ao observado na população adulta. A neutropenia (< 1 x 10<sup>9</sup> células/L) foi mais frequente (1,7 %) em comparação aos adultos.

#### Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V.

#### **4.9 Sobredosagem**

Foram administradas em doentes adultos doses únicas de 40 mg e doses múltiplas até 20 mg por dia, durante 10 dias, em ensaios clínicos sem dose limite para o estudo da toxicidade. Não foram identificadas toxicidades específicas. Os dados farmacocinéticos de uma dose única de 40 mg em voluntários saudáveis sugeriu que mais de 90 % da dose administrada será previsivelmente eliminada num prazo de 24 horas. Em caso de sobredosagem, recomenda-se a monitorização dos sinais e sintomas de reações adversas. Caso ocorram reações adversas, devem tomar-se as medidas apropriadas.

## **5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS**

### **5.1 Propriedades farmacodinâmicas**

Grupo farmacoterapêutico: Imunossuppressores, Imunossuppressores seletivos, código ATC: L04AA37

## Mecanismo de ação

O baricitinib é um inibidor seletivo e reversível da Janus quinase (JAK)1 e JAK2. Em ensaios de enzimas isoladas, o baricitinib inibiu as atividades da JAK1, JAK2, Tirosina quinase 2 e JAK3 com valores IC<sub>50</sub> de 5,9; 5,7; 53 e > 400 nM, respetivamente.

As Janus quinases (JAKs) são enzimas que fazem a transdução dos sinais intracelulares dos recetores da superfície celular de várias citocinas e fatores de crescimento envolvidos na hematopoiese, inflamação e função imunitária. Na via de sinalização intracelular, as JAKs fosforilam e ativam transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STAT), que ativam a expressão dos genes no interior da célula. O baricitinib modula estas vias de sinalização, inibindo parcialmente a atividade enzimática da JAK1 e JAK2, reduzindo assim a fosforilação e ativação dos STAT.

## Efeitos farmacodinâmicos

### *Inibição da fosforilação do STAT 3 induzida pela IL-6*

A administração do baricitinib resultou numa inibição dependente da dose da fosforilação do STAT3 induzida pela IL-6 no sangue total de indivíduos saudáveis, sendo a inibição máxima observada 2 horas após a administração do fármaco e regressando a valores próximos dos da linha de base ao fim de 24 horas.

### *Imunoglobulinas*

Os valores séricos médios da IgG, IgM e IgA diminuíram às 12 semanas após o início do tratamento, e mantiveram-se estáveis com valores inferiores aos da linha de base durante, pelo menos, 104 semanas. Na maioria dos doentes, as alterações das imunoglobulinas ocorreram dentro do intervalo de referência normal.

### *Linfócitos*

A contagem média absoluta de linfócitos aumentou na primeira semana após o início do tratamento, tendo regressado à linha de base até à semana 24 e mantendo posteriormente um valor estável durante, pelo menos 104 semanas. Na maioria dos doentes, as alterações da contagem de linfócitos ocorreram dentro do intervalo de referência normal.

### *Proteína C-reativa*

Em doentes com artrite reumatoide, observaram-se decréscimos do valor da proteína C-reativa logo na primeira semana de tratamento, tendo-se mantido durante todo o tratamento.

### *Creatinina*

Em ensaios clínicos, o baricitinib induziu um aumento médio dos valores da creatinina de 3,8 µmol/l após duas semanas de tratamento. Posteriormente, os valores mantiveram-se estáveis. Este facto poderá dever-se à inibição da secreção de creatinina pelo baricitinib nos túbulos renais. Consequentemente, as estimativas da taxa de filtração glomerular com base na creatinina sérica podem ser ligeiramente reduzidas, sem que haja uma perda real da função renal ou ocorram reações adversas renais. Na alopecia areata, a média da creatinina sérica continuou a aumentar até à semana 52. Na dermatite atópica e na alopecia areata, o baricitinib ficou associado a uma diminuição da cistatina C (também utilizada para estimar a taxa de filtração glomerular) na Semana 4, sem que se observassem decréscimos posteriores.

### *Modelos cutâneos in vitro*

Num modelo cutâneo humano *in vitro* tratado com citocinas pró-inflamatórias (i.e. IL-4, IL-13, IL-31), o baricitinib reduziu a expressão da pSTAT3 pelos queratinócitos epidérmicos e aumentou a expressão da filagrina, uma proteína que está envolvida na função de barreira cutânea e na patogénese da dermatite atópica.

## Estudo de vacinação

A influência do baricitinib na resposta humoral às vacinas não vivas foi avaliada em 106 doentes com artrite reumatoide sob tratamento estável com baricitinib 2 ou 4 mg, recebendo vacinação inativada contra pneumococo ou tétano. A maioria desses doentes (n = 94) foi tratada concomitantemente com metotrexato. Para a população total, a vacinação pneumocócica resultou numa resposta imune IgG satisfatória em 68 % (IC 95 %: 58,4 %; 76,2 %) dos doentes. Em 43,1 % (IC 95 %: 34 %; 52,8 %) dos doentes, foi obtida uma resposta imune IgG satisfatória à vacinação contra o tétano.

## Eficácia clínica

### *Artrite reumatoide*

A eficácia e segurança do baricitinib uma vez por dia foi avaliada em 4 estudos de Fase III aleatorizados, multicêntricos, com dupla ocultação em doentes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, diagnosticada segundo os critérios ACR/EULAR de 2010 (Tabela 3). A presença de pelo menos 6 articulações dolorosas e 6 articulações edemaciadas foram necessárias na linha de base. Todos os doentes que completassem estes estudos eram elegíveis para participarem num estudo de extensão a longo prazo durante um período até 7 anos de tratamento adicional.

**Tabela 3. Resumo dos Ensaios Clínicos**

Nome do estudo (Duração)	População (Número)	Braços de tratamento	Resumo dos principais resultados
RA-BEGIN (52 semanas)	Naïves a MTX <sup>1</sup> (584)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baricitinib 4 mg QD</li> <li>• Baricitinib 4 mg QD + MTX</li> <li>• MTX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Endpoint</i> primário: ACR20 na semana 24</li> <li>• Funcionamento físico (HAQ-DI)</li> <li>• Progressão radiográfica (mTSS)</li> <li>• Baixa atividade da doença e Remissão (SDAI)</li> </ul>
RA-BEAM (52 semanas)	MTX-IR <sup>2</sup> (1305)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baricitinib 4 mg QD</li> <li>• Adalimumab 40 mg SC Q2W</li> <li>• Placebo</li> </ul> <p>Todos os doentes com tratamento de base com MTX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Endpoint</i> primário: ACR20 na semana 12</li> <li>• Funcionamento físico (HAQ-DI)</li> <li>• Progressão radiográfica (mTSS)</li> <li>• Baixa atividade da doença e Remissão (SDAI)</li> <li>• Rigidez articular matinal</li> </ul>
RA-BUILD (24 semanas)	cDMARD-IR <sup>3</sup> (684)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baricitinib 4 mg QD</li> <li>• Baricitinib 2 mg QD</li> <li>• Placebo</li> </ul> <p>Com tratamento de base com cDMARD<sup>5</sup> se estáveis com tratamento com cDMARD aquando da entrada no estudo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Endpoint</i> primário: ACR20 na semana 12</li> <li>• Funcionamento físico (HAQ-DI)</li> <li>• Baixa atividade da doença e Remissão (SDAI)</li> <li>• Progressão radiográfica (mTSS)</li> <li>• Rigidez articular matinal</li> </ul>
RA-BEACON (24 semanas)	TNF-IR <sup>4</sup> (527)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baricitinib 4 mg QD</li> <li>• Baricitinib 2 mg QD</li> <li>• Placebo</li> </ul> <p>Com tratamento de base com cDMARD<sup>5</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Endpoint</i> primário: ACR20 na semana 12</li> <li>• Funcionamento físico (HAQ-DI)</li> <li>• Baixa atividade da doença e Remissão (SDAI)</li> </ul>

Abreviaturas: QD = Uma vez por dia; Q2W = Uma vez de 2 em 2 semanas; SC = Por via subcutânea; ACR = *American College of Rheumatology*; SDAI = *Simplified Disease Activity Index*; HAQ-DI = *Health Assessment Questionnaire-Disability Index*; mTSS = *modified Total Sharp Score*

<sup>1</sup> Doentes tratados com menos de 3 doses de Metotrexato (MTX); sem tratamento prévio com outros DMARD convencionais ou biológicos

<sup>2</sup> Doentes com resposta insuficiente ao MTX (+/- outros cDMARD); sem tratamento prévio com biológicos

<sup>3</sup> Doentes com resposta insuficiente ou intolerância a  $\geq 1$  cDMARD; sem tratamento prévio com biológicos

<sup>4</sup> Doentes com resposta insuficiente ou intolerância a  $\geq 1$  bDMARD; incluindo, pelo menos, um inibidor do TNF

<sup>5</sup> Os cDMARD mais comuns incluíram MTX, hidroxicloroquina, leflunomida e sulfasalazina

### Resposta clínica

Em todos os estudos, os doentes tratados com baricitinib 4 mg uma vez por dia tiveram uma resposta ACR20, ACR50 e ACR70 significativamente maior às 12 semanas em comparação com placebo, MTX ou adalimumab (Tabela 4). O tempo até ao início da eficácia foi rápido em todas as medidas, tendo sido observadas respostas significativamente maiores logo na primeira semana. Observaram-se taxas de resposta continuadas e duradouras, sendo as respostas ACR20/50/70 mantidas durante, pelo menos, 2 anos, incluindo o estudo de extensão a longo prazo.

O tratamento com baricitinib 4 mg, em monoterapia ou em associação com cDMARD, resultou em melhorias significativas de todos os componentes individuais do ACR, incluindo o número de articulações

dolorosas ou edemaciadas, avaliações globais feitas pelo doente e pelo médico, HAQ-DI, avaliação da dor e PCR, em comparação com o placebo, MTX ou adalimumab.

Não se observaram diferenças relevantes quanto à eficácia e segurança em subgrupos definidos pelos tipos de DMARD concomitantes utilizados em associação com baricitinib.

#### Remissão e baixa atividade da doença

Foi significativamente maior em termos estatísticos a percentagem de doentes tratados com baricitinib 4 mg, em comparação com placebo ou MTX, que atingiram a remissão, ( $SDAI \leq 3,3$  e  $CDAI \leq 2,8$ ) ou baixa atividade da doença ou remissão ( $DAS28-ESR$  ou  $DAS28-hsCRP \leq 3,2$  e  $DAS28-ESR$  ou  $DAS28-hsCRP < 2,6$ ), nas semanas 12 e 24 (Tabela 4).

Observaram-se taxas de remissão maiores em comparação com o placebo logo na semana 4. Verificou-se que as taxas de remissão e baixa atividade da doença se mantiveram durante, pelo menos, 2 anos. Os dados do estudo de extensão a longo prazo até 6 anos de acompanhamento indicam taxas sustentadas de baixa atividade/remissão da doença.

**Tabela 4: Resposta, Remissão e Funcionamento Físico**

Estudo	RA-BEGIN Doentes naïves a MTX			RA-BEAM Doentes MTX-IR			RA-BUILD Doentes cDMARD-IR			RA-BEACON Doentes TNF-IR		
	MTX	BARI 4 mg	BARI 4 mg + MTX	PBO	BARI 4 mg	ADA 40 mg Q2W	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg
N	210	159	215	488	487	330	228	229	227	176	174	177
<b>ACR20:</b>												
Semana 12	59 %	79 %***	77 %***	40 %	70 %****†	61 %***	39 %	66 %***	62 %***	27 %	49 %***	55 %***
Semana 24	62 %	77 %**	78 %***	37 %	74 %****†	66 %***	42 %	61 %***	65 %***	27 %	45 %***	46 %***
Semana 52	56 %	73 %***	73 %***		71 %††	62 %						
<b>ACR50:</b>												
Semana 12	33 %	55 %***	60 %***	17 %	45 %****††	35 %***	13 %	33 %***	34 %***	8 %	20 %**	28 %***
Semana 24	43 %	60 %**	63 %***	19 %	51 %***	45 %***	21 %	41 %***	44 %***	13 %	23 %*	29 %***
Semana 52	38 %	57 %***	62 %***		56 %†	47 %						
<b>ACR70:</b>												
Semana 12	16 %	31 %***	34 %***	5 %	19 %****†	13 %***	3 %	18 %***	18 %***	2 %	13 %***	11 %**
Semana 24	21 %	42 %***	40 %***	8 %	30 %****†	22 %***	8 %	25 %***	24 %***	3 %	13 %***	17 %***
Semana 52	25 %	42 %***	46 %***		37 %	31 %						
<b>DAS28-hsCRP ≤ 3,2:</b>												
Semana 12	30 %	47 %***	56 %***	14 %	44 %****††	35 %***	17 %	36 %***	39 %***	9 %	24 %***	32 %***
Semana 24	38 %	57 %***	60 %***	19 %	52 %***	48 %***	24 %	46 %***	52 %***	11 %	20 %*	33 %***
Semana 52	38 %	57 %***	63 %***		56 %†	48 %						
<b>SDAI ≤ 3,3:</b>												
Semana 12	6 %	14 %*	20 %***	2 %	8 %***	7 %***	1 %	9 %***	9 %***	2 %	2 %	5 %
Semana 24	10 %	22 %**	23 %***	3 %	16 %***	14 %***	4 %	17 %***	15 %***	2 %	5 %	9 %**
Semana 52	13 %	25 %**	30 %***		23 %	18 %						
<b>CDAI ≤ 2,8:</b>												
Semana 12	7 %	14 %*	19 %***	2 %	8 %***	7 %**	2 %	10 %***	9 %***	2 %	3 %	6 %
Semana 24	11 %	21 %**	22 %**	4 %	16 %***	12 %***	4 %	15 %***	15 %***	3 %	5 %	9 %*
Semana 52	16 %	25 %*	28 %**		22 %	18 %						
<b>HAQ-DI Diferença mínima clinicamente importante (diminuição da pontuação HAQ-DI ≥ 0,30):</b>												
Semana 12	60 %	81 %***	77 %***	46 %	68 %***	64 %***	44 %	60 %***	56 %**	35 %	48 %*	54 %***
Semana 24	66 %	77 %*	74 %	37 %	67 %****†	60 %***	37 %	58 %***	55 %***	24 %	41 %***	44 %***
Semana 52	53 %	65 %*	67 %**		61 %	55 %						

Nota: Percentagem de doentes com resposta em cada momento temporal com base no número de doentes inicialmente aleatorizados para tratamento (N). Considerou-se que os doentes que descontinuaram o tratamento ou receberam terapêutica de resgate eram doentes sem resposta a partir desse momento.

Abreviaturas: ADA = adalimumab; BARI = baricitinib; MTX = metotrexato; PBO = Placebo

\*  $p \leq 0,05$ ; \*\*  $p \leq 0,01$ ; \*\*\*  $p \leq 0,001$  vs. placebo (vs. MTX no estudo RA-BEGIN)

†  $p \leq 0,05$ ; ††  $p \leq 0,01$ ; †††  $p \leq 0,001$  vs. adalimumab

### Resposta radiográfica

O efeito do baricitinib na progressão de lesões estruturais articulares foi avaliado radiologicamente nos estudos RA-BEGIN, RA-BEAM e RA-BUILD e expresso através da Escala Total de Sharp modificada - *modified Total Sharp Score* (mTSS) e dos seus componentes, a escala de erosão e a escala do estreitamento do espaço articular.

O tratamento com baricitinib 4 mg resultou numa inibição estatisticamente significativa da progressão das lesões estruturais articulares (Tabela 5). As análises das pontuações da erosão e do estreitamento do espaço articular foram consistentes com as pontuações globais. A percentagem de doentes sem progressão radiológica (variação da mTSS  $\leq 0$ ) foi significativamente maior com baricitinib 4 mg em comparação com o placebo nas semanas 24 e 52.

**Tabela 5. Alterações radiológicas**

Estudo	RA-BEGIN Doentes naïves a MTX			RA-BEAM Doentes MTX-IR			RA-BUILD Doentes cDMARD-IR		
	MTX	BARI 4 mg	BARI 4 mg + MTX	PBO <sup>a</sup>	BARI 4 mg	ADA 40 mg Q2W	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg
<b>Escala Total de Sharp modificada, variação média em relação à linha de base:</b>									
Semana 24	0,61	0,39	0,29*	0,90	0,41***	0,33***	0,70	0,33*	0,15**
Semana 52	1,02	0,80	0,40**	1,80	0,71***	0,60***			
<b>Percentagem de doentes sem progressão radiológica<sup>b</sup>:</b>									
Semana 24	68 %	76 %	81 %**	70 %	81 %***	83 %***	74 %	72 %	80 %
Semana 52	66 %	69 %	80 %**	70 %	79 %**	81 %**			

Abreviaturas: ADA = adalimumab; BARI = baricitinib; MTX = metotrexato; PBO = Placebo

<sup>a</sup> Dados do placebo na semana 52 derivados através de extrapolação linear

<sup>b</sup> Não progressão definida como variação da mTSS  $\leq 0$ .

\*  $p \leq 0,05$ ; \*\*  $p \leq 0,01$ ; \*\*\*  $p \leq 0,001$  vs. placebo (vs. MTX no estudo RA-BEGIN)

#### Resposta da função física e resultados relacionados com a saúde

O tratamento com baricitinib 4 mg, em monoterapia ou em associação com cDMARD, resultou numa melhoria significativa da função física (HAQ-DI) e dor (escala visual analógica de 0-100) relativamente a todos os comparadores (placebo, MTX, adalimumab). As melhorias foram observadas logo na semana 1 e, nos estudos RA-BEGIN e RA-BEAM, mantiveram-se até às 52 semanas.

Nos estudos RA-BEAM e RA-BUILD, o tratamento com baricitinib 4 mg resultou numa melhoria significativa da duração média e da gravidade da rigidez articular matinal em comparação com o placebo ou adalimumab, avaliada pelos diários eletrónicos dos doentes.

Em todos os estudos, os doentes tratados com baricitinib referiram melhorias na qualidade de vida reportada pelo doente, medidas pela pontuação do componente físico do *Short Form (36) Health Survey* (SF-36), e na fadiga, medida pela pontuação do *Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue score* (FACIT-F).

#### Baricitinib 4 mg vs. 2 mg

As diferenças na eficácia entre as doses de 4 mg e 2 mg foram visíveis sobretudo na população bDMARD-IR (RA-BEACON), na qual foram observadas melhorias estatisticamente significativas nos componentes ACR de contagem de articulações edemaciadas, contagem de articulações dolorosas e Velocidade de Sedimentação Eritrocitária (ESR) com o baricitinib 4 mg em comparação com o placebo na semana 24, mas não com o baricitinib 2 mg em comparação com o placebo. Além disso, tanto no estudo RA-BEACON como no estudo RA-BUILD, o início da eficácia foi mais rápido e a dimensão do efeito foi, em geral, maior nos grupos com a dose de 4 mg em comparação com os da dose de 2 mg.

Num estudo de extensão a longo prazo, os doentes dos Estudos RA-BEAM, RA-BUILD e RA-BEACON que atingissem uma baixa atividade ou remissão da doença sustentadas (CDAI  $\leq 10$ ) após um período mínimo de 15 meses de tratamento com baricitinib 4 mg uma vez por dia eram realeatorizados num rácio de 1:1, com dupla ocultação, para continuação do tratamento com 4 mg uma vez por dia ou redução da

dose para 2 mg uma vez por dia. A maioria dos doentes manteve uma baixa atividade ou remissão da doença, com base na pontuação CDAI:

- Na semana 12: 451/498 (91 %) dos que continuaram com 4 mg vs. 405/498 (81 %) dos que reduziram para 2 mg ( $p \leq 0,001$ )
- Na semana 24: 434/498 (87 %) dos que continuaram com 4 mg vs. 372/498 (75 %) dos que reduziram para 2 mg ( $p \leq 0,001$ )
- Na semana 48: 400/498 (80 %) dos que continuaram com 4 mg vs. 343/498 (69 %) dos que reduziram para 2 mg ( $p \leq 0,001$ )
- Na semana 96: 347/494 (70 %) dos que continuaram com 4 mg vs. 297/496 (60 %) dos que reduziram para 2 mg ( $p \leq 0,001$ )

A maioria dos doentes, que deixou de ter uma baixa atividade ou remissão da doença após a redução da dose, recuperou o controlo da doença após o regresso à dose de 4 mg.

#### *Adultos com dermatite atópica*

A eficácia e segurança do baricitinib em monoterapia ou em associação com corticosteroides tópicos (TCS) foram avaliadas em 3 estudos de Fase III, aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com placebo, com a duração de 16 semanas (BREEZE-AD1, -AD2 e -AD7). Os estudos incluíram 1568 doentes com dermatite atópica moderada a grave, definida por uma pontuação do *Investigator's Global Assessment* (IGA)  $\geq 3$ , uma pontuação do *Eczema Area and Severity Index* (EASI)  $\geq 16$  e um envolvimento da área de superfície corporal (BSA)  $\geq 10$  %. Os doentes elegíveis tinham mais de 18 anos de idade e tinham tido anteriormente uma resposta insuficiente ou eram intolerantes a medicamentos tópicos. Os doentes podiam fazer terapêutica de resgate (que incluía terapêutica tópica ou sistémica), sendo que nesse momento eram considerados doentes não-respondedores. No início do estudo BREEZE-AD7, todos os doentes estavam em terapêutica associada com corticosteroides tópicos e foi permitido aos doentes utilizar inibidores de calcineurina tópicos. Todos os doentes que completavam estes estudos eram elegíveis para participarem num estudo de extensão a longo prazo (BREEZE AD-3) com uma duração de até 2 anos de tratamento continuado.

O estudo de Fase III, aleatorizado, com dupla ocultação, controlado com placebo BREEZE-AD4 avaliou a eficácia do baricitinib em associação com corticosteroides tópicos durante 52 semanas em 463 doentes com dermatite atópica moderada a grave com resposta inadequada, intolerância ou contraindicação ao tratamento oral com ciclosporina.

#### Características na linha de base

Nos estudos de Fase III controlados por placebo (BREEZE-AD1, -AD2, -AD7 e -AD4), em todos os grupos de tratamento, 37 % eram mulheres, 64 % eram caucasianos, 31 % eram asiáticos e 0,6 % eram negros, e a idade média era de 35,6 anos. Nestes estudos, 42 % a 51 % dos doentes tinham uma pontuação IGA na *baseline* de 4 (dermatite atópica grave) e 54 % a 79 % dos doentes tinham feito terapêutica sistémica anterior para a dermatite atópica. A pontuação média da EASI na *baseline* variou de 29,6 a 33,5, a média semanal do Prurido *Numerical Rating Scale* (NRS) variou de 6,5 a 7,1, a *Dermatology Life Quality Index* (DLQI) média na *baseline* variou de 13,6 a 14,9, e a pontuação média da *Hospital Anxiety and Depression Scale* (HADS) na *baseline* variou de 10,9 a 12,1.

#### Resposta clínica

Estudos de monoterapia de 16 semanas (BREEZE-AD1, -AD2) e estudos de combinação TCS (BREEZE-AD7)

Uma percentagem significativamente maior de doentes aleatorizados para baricitinib 4 mg atingiram uma resposta IGA 0 ou 1 (resultado primário), EASI 75 ou uma melhoria  $\geq 4$  pontos no Prurido NRS em comparação com o placebo na semana 16 (Tabela 6). A Figura 1 mostra a variação percentual em relação à *baseline* da EASI até à semana 16.

Uma percentagem significativamente maior de doentes aleatorizados para baricitinib 4 mg atingiram uma melhoria  $\geq 4$  pontos do Prurido NRS em comparação com o placebo (na primeira semana de tratamento para BREEZE-AD1 e AD2, e imediatamente na semana 2 para BREEZE-AD7;  $p < 0,002$ ).

Os efeitos do tratamento nos subgrupos (peso, idade, sexo, raça, gravidade da doença e tratamento anterior, incluindo imunossupressores) foram consistentes com os resultados da população global dos estudos.

**Tabela 6. Eficácia do baricitinib na semana 16 (FAS<sup>a</sup>)**

Estudo	Monoterapia						Combinação com TCS		
	BREEZE- AD1			BREEZE-AD2			BREEZE-AD7		
Grupo de tratamento	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg	PBO + TCS	BARI 2 mg + TCS	BARI 4 mg + TCS
N	249	123	125	244	123	123	109	109	111
IGA 0 ou 1, % de respondedores <sup>b, c</sup>	4,8	11,4**	16,8**	4,5	10,6%**	13,8%**	14,7	23,9	30,6**
EASI 75, % de respondedores <sup>c</sup>	8,8	18,7**	24,8**	6,1	17,9**	21,1%**	22,9	43,1*	47,7**
Prurido NRS (melhoria $\geq 4$ pontos), % de respondedores <sup>c, d</sup>	7,2	12,0	21,5**	4,7	15,1**	18,7%**	20,2	38,1*	44,0**

BARI = Baricitinib; PBO = Placebo

\*estatisticamente significativo vs. placebo sem ajuste de multiplicidade; \*\* estatisticamente significativo vs. placebo com ajuste de multiplicidade.


<sup>a</sup> Conjunto completo da análise (FAS) incluindo todos os doentes aleatorizados.

<sup>b</sup> Definiu-se respondedor como um doente com pontuação IGA de 0 ou 1 (“limpa” ou “quase limpa”) com uma redução  $\geq 2$  pontos na escala IGA de 0 a 4.

<sup>c</sup> Imputação de não-respondedor: os doentes que fizeram terapêutica de resgate ou com dados em falta foram considerados não-respondedores.

<sup>d</sup> Resultados apresentados no subconjunto de doentes elegíveis para avaliação (doentes com Prurido NRS  $\geq 4$  na *baseline*).

**Figura 1. Variação percentual média da EASI em relação à *baseline* (FAS)<sup>a</sup>**



LS = Quadrados mínimos, \*estatisticamente significativo vs. placebo sem ajuste de multiplicidade; \*\* estatisticamente significativo vs. placebo com ajuste de multiplicidade.

<sup>a</sup> Conjunto completo da análise (FAS) incluindo todos os doentes aleatorizados. Os dados recolhidos após terapêutica de resgate ou descontinuação permanente do medicamento foram considerados dados em falta. As médias LS são das análises pelo Modelo Misto de Medidas Repetidas (MMRM).

### Manutenção da resposta

Para avaliar a manutenção da resposta, 1373 doentes tratados com baricitinib durante 16 semanas no BREEZE-AD1 (N=541), BREEZE-AD2 (N=540) e BREEZE-AD7 (N = 292) eram elegíveis para participarem num estudo de extensão a longo prazo, o BREEZE-AD3. Existem dados disponíveis até às 68 semanas de tratamento acumulado para os doentes do BREEZE-AD1 e BREEZE -AD2, e até às 32 semanas de tratamento acumulado para os doentes do BREEZE-AD7. Observou-se uma resposta continuada em doentes com pelo menos alguma resposta (IGA 0, 1 ou 2) após o início com baricitinib.

### Qualidade de vida/resultados reportados pelos doentes na dermatite atópica

Em ambos os estudos de monoterapia (BREEZE-AD1 e BREEZE-AD2) e no estudo com TCS concomitantes (BREEZE-AD7), baricitinib 4 mg melhorou significativamente os resultados reportados pelos doentes, incluindo prurido NRS, sono (ADSS), dor cutânea (*Skin Pain* NRS), qualidade de vida (DLQI) e sintomas de ansiedade e depressão, (HADS) que não foram corrigidos para multiplicidade, às 16 semanas em comparação com o placebo. (ver Tabela 7).

**Tabela 7. Qualidade de vida/resultados reportados pelos doentes com baricitinib, em monoterapia e em associação com TCS na semana 16 (FAS) <sup>a</sup>**

Estudo	Monoterapia						Associação com TCS		
	BREEZE-AD1			BREEZE-AD2			BREEZE-AD7		
Grupo de tratamento	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg	PBO	BARI 2 mg	BARI 4 mg	PBO + TCS	BARI 2 mg + TCS	BARI 4 mg + TCS
N	249	123	125	244	123	123	109	109	111
ADSS Item 2 melhoria $\geq 2$ pontos, % de respondedores <sup>c, d</sup>	12,8	11,4	32,7*	8,0	19,6	24,4*	30,6	61,5*	66,7*
Varição da <i>Skin Pain</i> NRS, média(SE) <sup>b</sup>	-0,84 (0,24)	-1,58 (0,29)	-1,93** (0,26)	-0,86 (0,26)	-2,61** (0,30)	-2,49** (0,28)	-2,06 (0,23)	-3,22* (0,22)	-3,73* (0,23)
Varição da DLQI, média (SE) <sup>b</sup>	-2,46 (0,57)	-4,30* (0,68)	-6,76* (0,60)	-3,35 (0,62)	-7,44* (0,71)	-7,56* (0,66)	-5,58 (0,61)	-7,50* (0,58)	-8,89* (0,58)
Varição da HADS, média (SE) <sup>b</sup>	-1,22 (0,48)	-3,22* (0,58)	-3,56* (0,52)	-1,25 (0,57)	-2,82 (0,66)	-3,71* (0,62)	-3,18 (0,56)	-4,75* (0,54)	-5,12* (0,54)

BARI = Baricitinib; PBO = Placebo

\*estatisticamente significativo vs. placebo sem ajuste de multiplicidade; \*\* estatisticamente significativo vs. placebo com ajuste de multiplicidade.

<sup>a</sup> Conjunto completo da análise (FAS) incluindo todos os doentes aleatorizados.

<sup>b</sup> Os resultados apresentados são variações médias LS em relação à *baseline* (SE). Os dados recolhidos após terapêutica de resgate ou descontinuação permanente do medicamento foram considerados dados em falta. As médias LS são das análises pelo Modelo Misto de Medidas Repetidas (MMRM).

<sup>c</sup> ADSS Item 2: Número médio de despertares durante a noite devido ao prurido.

<sup>d</sup> Imputação de não-respondedor: doentes que receberam terapêutica de resgate ou com dados ausentes foram considerados como não-respondedores. Resultados mostrados no subconjunto de doentes elegíveis para avaliação (doentes com ADSS Item 2  $\geq 2$  no início do estudo).

Resposta clínica em doentes com experiência ou com contraindicação ao tratamento com ciclosporina (estudo BREEZE-AD4)

Foram incluídos 463 doentes que tinham tido uma resposta inadequada (n=173), ou tinham intolerância (n=75) ou contraindicação (n=126) à ciclosporina oral. O *endpoint* primário era a percentagem de doentes que atingiam EASI 75 na semana 16. O *endpoint* primário e alguns dos principais *endpoints* secundários à semana 16 estão resumidos na Tabela 8.

**Tabela 8: Eficácia de baricitinib em associação com TCS<sup>a</sup> à semana 16 no BREEZE-AD4 (FAS)<sup>b</sup>**

Estudo	BREEZE- AD4		
	PBO <sup>a</sup>	BARI 2 mg <sup>a</sup>	BARI 4 mg <sup>a</sup>
Grupo de tratamento			
N	93	185	92
EASI 75, % respondedores <sup>c</sup>	17,2	27,6	31,5**
IGA 0 ou 1, % respondedores <sup>c, e</sup>	9,7	15,1	21,7*
Prurido NRS (melhoria $\geq$ 4 pontos), % respondedores <sup>c, f</sup>	8,2	22,9*	38,2**
Variação da média da DLQI (SE) <sup>d</sup>	-4,95 (0,752)	-6,57 (0,494)	-7,95* (0,705)

BARI = Baricitinib; PBO = Placebo

\*estatisticamente significativo vs. placebo sem ajuste de multiplicidade; \*\* estatisticamente significativo vs. placebo com ajuste de multiplicidade.

<sup>a</sup> Todos os doentes faziam terapêutica concomitante com corticosteroides tópicos, e os doentes podiam utilizar inibidores da calcineurina tópicos.

<sup>b</sup> Conjunto completo da análise (FAS) incluindo todos os doentes aleatorizados.

<sup>c</sup> Imputação de não-respondedor: os doentes que fizeram terapêutica de resgate ou com dados em falta foram considerados não-respondedores.

<sup>d</sup> Os dados recolhidos após terapêutica de resgate ou descontinuação permanente do medicamento foram considerados dados em falta. As médias LS são das análises pelo Modelo Misto de Medidas Repetidas (MMRM).

<sup>e</sup> Definiu-se respondedor como um doente com IGA 0 ou 1 (pele “limpa” ou “quase limpa”) com uma redução  $\geq$  2 pontos na escala IGA de 0 a 4.

<sup>f</sup> Resultados apresentados no subconjunto de doentes elegíveis para avaliação (doentes com prurido NRS  $\geq$  4 na *baseline*).

#### *Alopecia areata*

A eficácia e segurança do baricitinib, uma vez por dia, foram avaliadas num estudo adaptativo de Fase II/III (BRAVE-AA1) e num estudo de Fase III (BRAVE-AA2). A Parte de Fase III do estudo BRAVE-AA1 e o estudo de Fase III BRAVE-AA2 foram aleatorizados, com dupla ocultação, controlados com placebo, com a duração de 36 semanas e com fases de extensão até às 200 semanas. Em ambos os estudos de fase III, os doentes foram aleatorizados para placebo, baricitinib 2 mg ou baricitinib 4 mg numa proporção de 2:2:3. Os doentes elegíveis eram adultos entre os 18 e os 60 anos de idade no caso dos homens, e entre os 18 e os 70 anos de idade no caso das mulheres, com um episódio em curso há mais de 6 meses de alopecia areata grave (perda de cabelo correspondente a  $\geq$  50 % do couro cabeludo). Os doentes com um episódio em curso há mais de 8 anos não eram elegíveis a menos de tivessem sido observados episódios de regeneração nas áreas afetadas do couro cabeludo nos últimos 8 anos. As únicas terapêuticas concomitantes permitidas na alopecia areata eram finasterida (ou outros inibidores da 5-alfa redutase), minoxidil oral ou tópico e solução oftálmica bimatoprost para as pestanas, se a dose fosse estável aquando da entrada no estudo.

Ambos os estudos avaliaram como resultado primário a percentagem de doentes que atingiram uma pontuação SALT (*Severity of Alopecia Tool*)  $\leq$  20 (80 % ou mais da cobertura do couro cabeludo com cabelo) na semana 36. Além disso, ambos os estudos realizaram a avaliação clínica da perda de pêlos nas sobrancelhas e nas pestanas usando uma escala de 4 pontos (*ClinRO Measure for Eyebrow Hair Loss*<sup>TM</sup>, *ClinRO Measure for Eyelash Hair Loss*<sup>TM</sup>).

### Características na linha de base

A parte de Fase III do estudo BRAVE-AA1 e a Fase III do estudo BRAVE-AA2 incluíram 1200 doentes adultos. Em todos os grupos de tratamento, a média das idades foi de 37,5 anos, e 61 % dos doentes eram mulheres. A duração média da alopecia areata desde o início e a duração média do episódio em curso de perda de cabelo foram de 12,2 e 3,9 anos, respetivamente. A pontuação SALT média nos vários estudos foi de 96 (o equivalente a 96 % de perda de cabelo do couro cabeludo), e aproximadamente 44 % dos doentes tinham alopecia *universalis*. Nos vários estudos, 69 % dos doentes tinham uma perda significativa ou completa das sobrancelhas na linha de base e 58 % tinha perda significativa ou completa das pestanas, avaliada pelas Medidas ClinRO para pontuações das sobrancelhas e pestanas de 2 ou 3. Aproximadamente 90 % dos doentes tinham recebido, pelo menos, um tratamento para a alopecia areata a determinada altura antes de entrarem nos estudos, e 50 % tinham sido tratados, pelo menos, com um imunossupressor sistémico. A utilização de tratamentos concomitantes autorizados para a alopecia apenas foi notificada por 4,3 % dos doentes durante os estudos.

### Resposta clínica

Em ambos os estudos, foi significativamente maior a percentagem de doentes aleatorizados para baricitinib 4 mg, uma vez por dia, que atingiram uma pontuação SALT  $\leq 20$  na semana 36 em comparação com o placebo, logo a partir da semana 8 no estudo BRAVE-AA1 e da semana 12 no estudo BRAVE-AA2. Observou-se uma eficácia consistente na maioria dos *endpoints* secundários (Tabela 9). A Figura 2 mostra a percentagem de doentes que atingiram SALT  $\leq 20$  até à semana 36.

Os efeitos do tratamento nos vários subgrupos (sexo, idade, peso, eGFR, etnia, região geográfica, gravidade da doença, duração do episódio de alopecia areata em curso) foram consistentes com os resultados da população global do estudo na semana 36.

**Tabela 9. Eficácia do baricitinib até à semana 36 nos estudos integrados (População de Eficácia Integrada na Semana 36<sup>a</sup>)**

	BRAVE-AA1 (parte de fase III de um estudo de fase II/III) e BRAVE-AA2 (estudo de Fase III) Dados Integrados*		
	Placebo N=345	Baricitinib 2 mg N=340	Baricitinib 4 mg N=515
SALT $\leq 20$ na semana 36	4,1 %	19,7 %**	34,0 %**
SALT $\leq 20$ na semana 24	3,2 %	11,2 %	27,4 %**
ClinRO Medida de perda de pelos nas sobrancelhas de 0 ou 1 na semana 36 com uma melhoria $\geq 2$ pontos relativamente à linha de base <sup>b</sup>	3,8 %	15,8 %	33,0 %**
ClinRO Medida de perda de pestanas de 0 ou 1 na semana 36 com uma melhoria $\geq 2$ pontos relativamente à linha de base <sup>b</sup>	4,3 %	12,0 %	33,9 %**
Variação do Skindex-16 adaptado à alopecia areata domínio das emoções, média (SE) <sup>c</sup>	-11,33 (1,768)	-19,89 (1,788)	-23,81 (1,488)
Variação do Skindex-16 adaptado à alopecia areata	-9,26 (1,605)	-13,68 (1,623)	-16,93 (1,349)

domínio do funcionamento, média (SE) <sup>c</sup>			
---	--	--	--

ClinRO = resultados notificados pelo clínico; SE = erro-padrão

<sup>a</sup> População de Eficácia Integrada na Semana 36: Todos os doentes que participaram na parte de Fase III do estudo BRAVE-AA1 e no estudo BRAVE-AA2.


\* Os resultados da análise integrada estão em linha com os dos estudos individuais

\*\* Estatisticamente significativo com ajuste de multiplicidade no esquema gráfico de teste em cada estudo individual.

<sup>b</sup> Doentes com pontuação  $\geq 2$  na linha de base no ClinRO Medida de perda de pêlos nas sobrancelhas: 236 (Placebo), 240 (Baricitinib 2 mg), 349 (Baricitinib 4 mg). Doentes com pontuação  $\geq 2$  na linha de base no ClinRO Medida de perda de pestanas: 186 (Placebo), 200 (Baricitinib 2 mg), 307 (Baricitinib 4 mg). Ambas as medidas ClinRO utilizam uma escala de resposta de 4 pontos variando de 0 que indica sem perda de pêlos até 3 que indica sem pelos visíveis nas sobrancelhas/pestanas.

<sup>c</sup>As dimensões da amostra para análise no Skindex-16 adaptado à alopecia areata na semana 36 são n= 256 (Placebo), 249 (Baricitinib 2 mg), 392 (Baricitinib 4 mg).

**Figura 2: Percentagem de doentes com SALT  $\leq 20$  na semana 36**



\*\*valor de  $p$  para baricitinib *versus* placebo  $\leq 0,01$ ; \*\*\*valor de  $p$  para baricitinib *versus* placebo  $\leq 0,001$ .

### Eficácia até à semana 52

A percentagem de doentes tratados com baricitinib que atingiram SALT  $\leq 20$  continuou a aumentar após a semana 36, atingindo 39,0 % dos doentes do grupo baricitinib 4 mg na semana 52. Os resultados das subpopulações gravidade da doença e duração do episódio na linha de base na semana 52 foram consistentes com os observados na semana 36 e com os resultados da população global do estudo.

### Estudo de redução da dose

No estudo BRAVE-AA2, os doentes tratados com baricitinib 4 mg, uma vez por dia, desde a aleatorização inicial e que atingiram SALT  $\leq 20$  na semana 52, foram realeatorizados com dupla ocultação para continuar com a dose de 4 mg uma vez por dia, ou para reduzir a dose para 2 mg uma vez por dia. Os resultados mostram que 96 % dos doentes, que continuaram com baricitinib 4 mg e 74 % dos doentes que foram re-aleatorizados para baricitinib 2 mg, mantiveram a resposta à semana 76.

### *Artrite idiopática juvenil*

O programa de desenvolvimento clínico do baricitinib para a artrite idiopática juvenil consistiu num estudo pivotal de Fase III (JUVE-BASIS) completo e num estudo, em andamento, de extensão de segurança a longo prazo, sem ocultação (JUVE-X).

JUVE-BASIS foi um estudo duplamente-cego aleatorizado de retirada (DBW), até às 44 semanas controlado por placebo para avaliar a eficácia e segurança do baricitinib quando administrado uma vez ao dia a doentes entre os 2 anos e os 18 anos de idade com artrite idiopática juvenil que tiveram uma resposta inadequada ou intolerância ao tratamento a pelo menos 1 DMARD sintético convencional ou biológico. Isto incluiu doentes com artrite idiopática juvenil poliarticular (fator reumatoide positivo ou fator reumatoide negativo), artrite idiopática juvenil de curso oligoarticular estendido, artrite idiopática juvenil relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil, conforme definido pelos critérios da Liga Internacional de Associações de Reumatologia (*International League of Associations for Rheumatology* - ILAR). Os doentes que participaram no JUVE-BASIS eram elegíveis para inscrição no estudo JUVE-X.

No JUVE-BASIS, os doentes receberam baricitinib de rótulo-aberto uma vez ao dia aproximadamente por 12 semanas desde a linha de base. Doentes com 2 anos e menos de 9 anos de idade receberam diariamente 2 mg e doentes com 9 anos e menos de 18 anos de idade receberam diariamente 4 mg, para atingir uma exposição equivalente a uma dose de 4 mg em adultos. Na semana 12, a resposta ao tratamento (com base nos critérios PedACR30) foi revista para cada doente. Os doentes que atingiram pelo menos uma resposta PedACR30 foram aleatorizados (proporção de 1:1) para receber placebo ou para permanecer na mesma dose de baricitinib às 32 semanas na fase de duplamente-cego, controlada por placebo. Os doentes que não atingiram o PedACR30 tiveram a opção de se inscrever no JUVE-X.

O *endpoint* primário de eficácia do JUVE-BASIS foi o tempo de exacerbação da doença desde o início do período de DBW até o final do período de DBW.

### *Características na linha de base*

Um total de 220 doentes inscritos no JUVE-BASIS. Destes, 163 (74,4 %) doentes foram elegíveis para serem aleatorizados no período DBW para o baricitinib (n=82) ou placebo (n=81). Existia 144 doentes com artrite idiopática juvenil poliarticular, 16 com artrite idiopática juvenil oligoarticular estendida, 50 com artrite idiopática juvenil relacionada com entesite e 10 com artrite psoriática juvenil.


No JUVE-BASIS, a média de idade foi de 13 anos (desvio padrão 3,4) e 69,1 % eram do sexo feminino. O número de doentes por faixa etária foi o seguinte: 2 a <6 anos: n=6; 6 a <9 anos: n=9; 9 a <12 anos: n=30; e 12 a <18 anos: n=175.

O tempo médio notificado por todos os doentes do estudo desde o diagnóstico de artrite idiopática juvenil foi de 4 anos. O uso de terapêuticas concomitantes foi semelhante entre os grupos de tratamento no período de DBW (os csDMARDs concomitantes mais comuns incluíram o MTX, a sulfasalazina e leflunomida). Um total de 127 (57,7 %) doentes estavam com MTX no início do estudo.

### *Resposta clínica*

No JUVE-BASIS, o grupo de doentes tratados com baricitinib teve um tempo significativamente maior até à exacerbação da doença em comparação com aqueles que receberam placebo (Figura 3). Além disso, mais doentes tratados com baricitinib alcançaram um valor de PedACR de 30/50/70/90/100 durante todo o período DBW, em comparação com placebo.

**Figura 3. Tempo para a exacerbação da doença durante o período DBW**



IC = intervalo de confiança; HR = taxa de risco; NA = não aplicável; nr = número

\*a HR - estratificada por categorias de artrite idiopática juvenil (poliarticular e oligoarticular estendida *versus* artrite relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil).

\*b O valor de *p* é do teste de log-rank estratificado por categorias de artrite idiopática juvenil (poliarticular e oligoarticular estendida *versus* artrite relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil).

O tempo até à exacerbação da doença e os resultados PedACR foram globalmente consistentes entre os subtipos de artrite idiopática juvenil e as características básicas (incluindo idade, geografia, peso, uso anterior de biológicos, uso concomitante de MTX ou corticosteroides), e foram consistentes com aqueles para a população geral do estudo.

### Dermatite atópica pediátrica

A eficácia e segurança do baricitinib em associação com TCS foram avaliadas num estudo de Fase III, aleatorizado, duplamente-cego, controlado por placebo, com a duração de 16 semanas (BREEZE-AD-PEDS). O estudo incluiu 483 doentes com dermatite atópica moderada a grave, definida por uma pontuação IGA  $\geq 3$ , uma pontuação EASI  $\geq 16$  e um envolvimento BSA  $\geq 10$  %. Os doentes elegíveis tinham idades entre os 2 e 18 anos e tinham tido anteriormente uma resposta insuficiente ou eram intolerantes à medicação tópica, e eram candidatos para terapêutica sistémica. Todos os doentes receberam prescrição concomitante para corticosteroides tópicos de baixa ou média potência e durante o estudo foi permitido aos doentes usar inibidores tópicos de calcineurina. Os doentes foram aleatorizados para receber placebo ou baricitinib em doses baixas, médias ou altas (resultando numa exposição equivalente a 1 mg, 2 mg ou 4 mg em doentes adultos com DA, respetivamente) sendo testados numa proporção de 1:1:1:1. O estudo inclui uma extensão contínua a longo prazo até 4 anos.

### Características na linha de base

Em todos os grupos de tratamento, 76 % eram caucasianos, 15 % eram asiáticos e 3 % eram negros. 50 % eram mulheres e a idade média era de 12 anos, em que 72 % tinham, pelo menos, 10 anos de idade e 28 % menos de 10 anos de idade. Os doentes com idade igual ou inferior a 6 anos constituíram 14 % da

população (6 anos [N=28], 5 anos [N=11], 4 anos [N=16], 3 anos [N=8], 2 anos [N=5]). Neste estudo, 38 % dos doentes tinham uma pontuação IGA na *baseline* de 4 (dermatite atópica grave), e 42 % dos doentes tinha recebido terapêutica sistémica prévia para dermatite atópica. A pontuação EASI na *baseline* variou entre 12,2 e 70,8, a média semanal do Prurido *Numerical Rating Scale* (NRS), em doentes com, pelo menos, 10 anos de idade, foi de 5,5 (SD = 2,6).

### Resposta Clínica

Uma proporção estatisticamente significativa maior de doentes aleatorizados para baricitinib 4 mg atingiu uma resposta IGA 0 ou 1 (resultado primário), EASI 75, ou uma melhoria  $\geq 4$  pontos no Prurido NRS em comparação com o placebo na semana 16 (Tabela 10). A Figura 4 mostra o tempo decorrido até alcançar IGA 0 ou 1.

Os efeitos do tratamento nos subgrupos (peso, idade, sexo, etnia, gravidade da doença e tratamento anterior, incluindo imunossuppressores) foram consistentes com os resultados da população global dos estudos.

**Tabela 10. Eficácia do baricitinib em doentes pediátricos na semana 16<sup>a</sup>**

Estudo	BREEZE-AD-PEDS	
	PBO	BARI 4 mg equivalente
N	122	120
IGA 0 ou 1, % de respondedores <sup>b,c</sup>	16,4	41,7**
EASI 75, % de respondedores <sup>c</sup>	32,0	52,5**
Prurido NRS (melhoria $\geq 4$ pontos), % respondedores <sup>c,d</sup>	16,4	35,5**

BARI = Baricitinib; PBO = Placebo

\*\* Estatisticamente significativo vs placebo com ajuste de multiplicidade.


<sup>a</sup> População com intenção de tratamento (ITT) (todos os doentes aleatorizados)

<sup>b</sup> Definiu-se respondedor como um doente com IGA de 0 ou 1 (“limpa” ou “quase limpa”) com uma redução  $\geq 2$  pontos na escala IGA 0-4.

<sup>c</sup> Imputação de não-respondedor: os doentes que receberam terapêutica de resgate ou com dados em falta foram considerados não-respondedores.

<sup>d</sup> Resultados apresentados no subconjunto de doentes elegíveis para avaliação (doentes com idade  $\geq 10$  anos com Prurido NRS  $\geq 4$  na *baseline*, BARI 4 mg equivalente N=62; Placebo, N = 55).

**Figura 4. Tempo decorrido até atingir IGA 0 ou 1 com melhoria  $\geq 2$  pontos em doentes pediátricos até à semana 16**



BARI=baricitinib; NRI=imputação de não-respondedor; PBO=placebo\*  $p < 0,05$ ; \*\*  $p < 0,01$ ; \*\*\*  $p < 0,001$  vs PBO (valor de  $p$ ; análise regressão logística); †Estatisticamente significativo com ajuste de multiplicidade.

Uma proporção significativamente maior de doentes aleatorizados para baricitinib 4 mg dose equivalente atingiram uma melhoria  $\geq 4$  pontos no Prurido NRS em comparação com o placebo na semana 4 (com ajuste de multiplicidade).

A necessidade de utilizar concomitantemente TCS foi reduzida conforme demonstrado por uma redução na mediana da quantidade em gramas de TCS utilizada para a dose equivalente de baricitinib 4 mg *versus* placebo ao longo de 16 semanas, e uma maior mediana de dias sem TCS para a dose equivalente do baricitinib 4 mg (25 dias) *versus* placebo (11 dias) durante 16 semanas.

### População pediátrica

A Agência Europeia do Medicamento deferiu a obrigação de submissão de resultados de estudos com baricitinib em um ou mais subgrupos da população pediátrica na artrite idiopática crónica, na dermatite atópica e na alopecia areata (ver secção 4.2 para informação sobre utilização pediátrica).

A eficácia do baricitinib até 12 mg/dia foi avaliada em 71 doentes com CANDLE (Dermatose Neutrofílica Atípica Crónica com Lipodistrofia e Temperatura Elevada,  $n=10$ ), condições relacionadas com CANDLE (CANDLE-RC,  $n=9$ ), SAVI (Vasculopatia associada a genes do interferão com início durante a infância,  $n=8$ ), Dermatomiosite Juvenil (DMJ,  $n=5$ ) e com a síndrome de Aicardi-Goutières (SAG,  $n=39$ ). A exposição total dos doentes (PYE) foi de 251. Devido a insuficiências metodológicas, não foi possível retirar nenhuma conclusão definitiva sobre a eficácia do baricitinib nestes doentes. Apesar dos padrões de segurança terem mostrado semelhanças com os das indicações para os adultos, a frequência dos acontecimentos adversos foi, geralmente, maior. Foram observadas três mortes na população com SAG; não é certo se estas mortes estão relacionadas com o tratamento com baricitinib.

## **5.2 Propriedades farmacocinéticas**

Após a administração oral do baricitinib, observou-se um aumento proporcional à dose da exposição sistémica dentro do intervalo da dose terapêutica. A farmacocinética do baricitinib é linear no que respeita ao tempo.

## Absorção

Após a administração oral, o baricitinib é rapidamente absorvido, com uma mediana de  $t_{max}$  de aproximadamente 1 hora (intervalo 0,5 – 3,0 h) e uma biodisponibilidade absoluta de aproximadamente 79 % (CV = 3,94 %). A ingestão de alimentos levou a uma diminuição da exposição em até 14 %, uma diminuição da  $C_{max}$  em até 18 % e um prolongamento de  $t_{max}$  de 0,5 horas. A administração às refeições não ficou associada a qualquer efeito clinicamente relevante na exposição.

## Distribuição

O volume médio de distribuição após a administração por perfusão intravenosa foi de 76 l, indicando a distribuição de baricitinib nos tecidos. O baricitinib liga-se em aproximadamente 50 % às proteínas do plasma.

## Biotransformação

O metabolismo do baricitinib é mediado pelo CYP3A4, tendo-se verificado biotransformação em menos de 10 % da dose. Não foram quantificáveis metabolitos no plasma. Num estudo de farmacologia clínica, o baricitinib foi predominantemente excretado sob a forma de substância ativa inalterada na urina (69 %) e nas fezes (15 %), e só foram identificados 4 metabolitos oxidativos *minor* (3 na urina; 1 nas fezes), constituindo aproximadamente 5 % e 1 % da dose, respetivamente. *In vitro*, o baricitinib é um substrato do CYP3A4, OAT3, Pgp, BCRP e MATE2-K, e pode ser um inibidor clinicamente relevante do transportador OCT1 (ver secção 4.5). Baricitinib não é um inibidor dos transportadores OAT1, OAT2, OAT3, OCT2, OATP1B1, OATP1B3, BCRP, MATE1 e MATE2-K a concentrações clinicamente relevantes.

## Eliminação

A eliminação renal é o principal mecanismo de depuração do baricitinib através da filtração glomerular e secreção ativa através do OAT3, Pgp, BCRP e MATE2-K. Num estudo de farmacologia clínica, aproximadamente 75 % da dose administrada foi eliminada na urina, e cerca de 20 % da dose foi eliminada nas fezes.

A depuração média aparente (CL/F) e a semivida em doentes com artrite reumatoide foram de 9,42 l/hora (CV = 34,3 %) e 12,5 horas (CV = 27,4 %), respetivamente. No estado estacionário, a  $C_{max}$  e a AUC foram 1,4 e 2,0 vezes maiores, respetivamente, em doentes com artrite reumatoide em comparação com controlos saudáveis.

A depuração média aparente (CL/F) e a semivida em doentes com dermatite atópica foram de 11,2 l/hora (CV = 33,0 %) e 12,9 horas (CV = 36,0 %), respetivamente. No estado estacionário, a  $C_{max}$  e a AUC foram 0,8 vezes maiores em doentes com dermatite atópica em comparação com doentes com artrite reumatoide.

A depuração média aparente (CL/F) e a semivida em doentes com alopecia areata foram de 11,0 l/hora (CV = 36,0 %) e 15,8 horas (CV = 35,0 %), respetivamente. No estado estacionário, a  $C_{max}$  e a AUC foram 0,9 vezes maiores em doentes com alopecia areata em comparação com doentes com artrite reumatoide.

## Compromisso renal

A exposição ao baricitinib foi significativamente afetada pela função renal. Os rácios médios da AUC em doentes com compromisso renal ligeiro e moderado relativamente a doentes com função renal normal foram de 1,41 (IC de 90 %: 1,15-1,74) e 2,22 (IC de 90 %: 1,81-2,73), respetivamente. Os rácios médios da  $C_{max}$  em doentes com compromisso renal ligeiro e moderado relativamente a doentes com função renal normal foram de 1,16 (IC de 90 %: 0,92-1,45) e 1,46 (IC de 90 %: 1,17-1,83), respetivamente. Ver secção 4.2 sobre recomendações posológicas.

### Compromisso hepático

Não se observou qualquer efeito clinicamente relevante sobre a farmacocinética do baricitinib em doentes com compromisso hepático ligeiro ou moderado. A utilização de baricitinib não foi estudada em doentes com compromisso hepático grave.

### Idosos

A idade  $\geq 65$  anos ou  $\geq 75$  anos não teve qualquer efeito sobre a exposição ao baricitinib ( $C_{\max}$  e AUC).

### População pediátrica

#### *Farmacocinética em doentes pediátricos com artrite idiopática juvenil*

A semivida em doentes pediátricos entre os 2 anos e os 18 anos de idade foi de 8 a 9 horas.

A exposição em doentes pediátricos com peso  $<30$  kg e  $\geq 30$  kg: em doentes  $< 30$  kg com idade média e um intervalo de 8,1 (2,0-16,0) anos, a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 381 h\*ng/ml (76 %) e 62,1 ng/ml (39 %), respetivamente. Em doentes  $\geq 30$  kg com idade média e um intervalo de 14,1 (9,0 – 17,0), a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 438 h\*ng/ml (68 %) e 60,7 ng/ml (30 %), respetivamente.

A exposição em doentes pediátricos com peso de 10 a  $<20$  kg e 20 a  $<30$  kg: em doentes de 10 a  $< 20$  kg com idade média e um intervalo de 5,1 (2,0-8,0) anos, a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 458 h\*ng/ml (81 %) e 77,6 ng/ml (38 %), respetivamente. Em doentes de 20 a  $< 30$  kg com idade média e um intervalo de 10,3 (6,0 – 16,0), a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 327 h\*ng/ml (66 %) e 51,2 ng/ml (22 %), respetivamente.

#### *Farmacocinética em doentes pediátricos com dermatite atópica*

A semivida média em doentes pediátricos entre os 2 anos e os 18 anos de idade foi de 13 a 18 horas.

A exposição em doentes pediátricos com peso  $< 30$  kg e  $\geq 30$  kg: em doentes  $< 30$  kg com idade média e um intervalo de 6,4 (2,0-11,1) anos, a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 404 h\*ng/ml (78 %) e 60,4 ng/ml (28 %), respetivamente. Em doentes  $\geq 30$  kg com idade média e um intervalo de 13,5 (6,2 – 17,9), a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 529 h\*ng/ml (102 %) e 57,0 ng/ml (42 %), respetivamente.

A exposição em doentes pediátricos com peso de 10 a  $<20$  kg e 20 a  $< 30$  kg: em doentes de 10 a  $< 20$  kg com idade média e um intervalo de 4,8 (2,0-6,9) anos, a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 467 h\*ng/ml (80 %) e 73,4 ng/ml (21 %), respetivamente. Em doentes de 20 a  $< 30$  kg com idade média e um intervalo de 7,5 (4,8 – 11,1), a média e CV% para a AUC e  $C_{\max}$  foi de 363 h\*ng/ml (72 %) e 52,0 ng/ml (21 %), respetivamente.

### Outros fatores intrínsecos

O peso corporal, a idade, o sexo, a raça e a etnicidade não tiveram qualquer efeito clinicamente relevante sobre a farmacocinética do baricitinib em doentes adultos. Os efeitos médios dos fatores intrínsecos sobre os parâmetros farmacocinéticos (AUC e  $C_{\max}$ ) situaram-se em geral dentro da variabilidade inter-sujeitos do baricitinib. Consequentemente, não é necessário qualquer ajuste da dose com base nestes fatores dos doentes.

### 5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os dados não clínicos não revelaram riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais de segurança farmacológica, de genotoxicidade ou de potencial carcinogénico.

Observaram-se decréscimos dos linfócitos, eosinófilos e basófilos bem como depleção linfóide em órgãos/tecidos do sistema imunitário em ratinhos, ratos e cães. Observaram-se infeções oportunistas relacionadas com demodecose (sarna) em cães com exposições a aproximadamente 7 vezes a exposição em seres humanos. Observaram-se decréscimos nos parâmetros eritrocitários em ratinhos, ratos e cães com exposições a aproximadamente 6 a 36 vezes a exposição em seres humanos. Observou-se uma degeneração da placa de crescimento do esterno em alguns cães, com uma incidência baixa e também em animais de controlo, mas com uma relação dose-efeito quanto à gravidade. Atualmente, desconhece-se se este dado é clinicamente relevante.

Em estudos de toxicologia reprodutiva em ratos e coelhos, o baricitinib demonstrou reduzir o crescimento/peso do feto e causar malformações do esqueleto (com exposições de aproximadamente 10 e 39 vezes maiores do que a exposição em seres humanos, respetivamente). Não se observaram efeitos adversos sobre o feto com exposições 2 vezes maiores do que a exposição em seres humanos, com base na AUC.

Num estudo de fertilidade com ratos machos/fêmeas, o baricitinib diminuiu o desempenho global no acasalamento (diminuição da fertilidade e dos índices de conceção). Nas fêmeas, houve um decréscimo do número de corpos lúteos e locais de implantação, um aumento das perdas pré-implantação e/ou efeitos adversos sobre a sobrevivência uterina dos embriões. Uma vez que não foram observados quaisquer efeitos sobre a espermatogénese (avaliada por histopatologia) ou nos *endpoints* relativos ao sémén/esperma em ratos machos, o decréscimo global do acasalamento resulta provavelmente dos efeitos nas fêmeas.

O baricitinib foi detetado no leite de ratos fêmeas a amamentarem. Num estudo de desenvolvimento pré e pós-natal, observou-se uma diminuição do peso das crias e da sobrevivência pós-natal com exposições 4 e 21 vezes maiores, respetivamente, do que a exposição em seres humanos.

## 6. INFORMAÇÕES FARMACÉUTICAS

### 6.1 Lista dos excipientes

#### Núcleo do comprimido

Celulose microcristalina  
Croscarmelose sódica  
Estearato de magnésio  
Manitol

#### Revestimento

Óxido de ferro vermelho (E172)  
Lecitina (soja) (E322)  
Macrogol  
Álcool polivinílico  
Talco  
Dióxido de titânio (E171)

## 6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

## 6.3 Prazo de validade

3 anos.

## 6.4 Precauções especiais de conservação

Este medicamento não requer quaisquer precauções especiais de conservação.

## 6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

### Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película

Cloreto de polivinilo/polietileno/policlorotrifluoroetileno – blisters de alumínio em embalagens de 14 ou 28 comprimidos revestidos por película.

Cloreto de polivinilo/alumínio/poliamida orientada – blisters de alumínio perfurado para dose unitária em embalagens de 28 x 1 comprimidos revestidos por película.

### Olumiant 2 mg e 4 mg comprimidos revestidos por película

Cloreto de polivinilo/polietileno/policlorotrifluoroetileno – blisters de alumínio em embalagens de 14, 28, 35, 56, 84 ou 98 comprimidos revestidos por película.

Cloreto de polivinilo/alumínio/poliamida orientada – blisters de alumínio perfurado para dose unitária em embalagens de 28 x 1 ou 84 x 1 comprimidos revestidos por película.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

## 6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Para doentes pediátricos incapazes de engolir comprimidos inteiros, pode considerar-se a dispersão dos comprimidos em água. Apenas água deve ser usada para dispersar o comprimido. Apenas o número de comprimidos necessários para a dose deve ser disperso.

- Coloque o comprimido inteiro num recipiente com 5-10 ml de água à temperatura ambiente e agite suavemente para dispersar. Pode levar até 10 minutos para que o comprimido se disperse numa suspensão rosa-pálida turva. Poderá ocorrer alguma sedimentação.
- Após a dispersão do comprimido, agite suavemente novamente e administre de imediato toda a suspensão.
- Limpe o recipiente com 5-10 ml de água à temperatura ambiente e administre de imediato todo o conteúdo.

O comprimido disperso em água é estável até 4 horas à temperatura ambiente.

Se, por qualquer motivo, a suspensão total não for administrada, não disperse e administre outro comprimido, mas espere até a próxima dose calendarizada.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

## **7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Países Baixos.

## **8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

### Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película

EU/1/16/1170/017

EU/1/16/1170/018

EU/1/16/1170/019

### Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película

EU/1/16/1170/001

EU/1/16/1170/002

EU/1/16/1170/003

EU/1/16/1170/004

EU/1/16/1170/005

EU/1/16/1170/006

EU/1/16/1170/007

EU/1/16/1170/008

### Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película

EU/1/16/1170/009

EU/1/16/1170/010

EU/1/16/1170/011

EU/1/16/1170/012

EU/1/16/1170/013

EU/1/16/1170/014

EU/1/16/1170/015

EU/1/16/1170/016

## **9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Data da primeira autorização: 13 de fevereiro de 2017

Data da última renovação: 12 de novembro de 2021

## **10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO**

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>.

## **ANEXO II**

- A. FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE**
- B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO**
- C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**
- D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ DO MEDICAMENTO**

## **A. FABRICANTE(S) RESPONSÁVEL(VEIS) PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE**

### Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote

Lilly S.A.  
Avda de la Industria, 30  
Alcobendas  
28108 Madrid  
ESPAÑA

## **B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO**

Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver Anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2).

## **C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

- **Relatórios Periódicos de Segurança (RPS)**

Os requisitos para a apresentação de RPS para este medicamento estão estabelecidos na lista Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do nº 7 do artigo 107º-C da Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicada no portal europeu de medicamentos.

## **D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ DO MEDICAMENTO**

- **Plano de gestão do risco (PGR)**

O Titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2 da Autorização de Introdução no Mercado, e quaisquer atualizações subsequentes do PGR que sejam acordadas.

Deve ser apresentado um PGR atualizado:

- A pedido da Agência Europeia de Medicamentos;
- Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou minimização do risco).

- **Medidas adicionais de minimização do risco**

Antes da introdução do baricitinib no mercado de cada Estado-Membro, o Titular da AIM deverá acordar com a Entidade Nacional Competente o conteúdo e formato dos materiais educacionais, incluindo meios de comunicação, modalidades de distribuição e quaisquer outros aspetos do programa.

Os principais objetivos do programa são consciencializar os prescritores dos riscos associados à utilização do medicamento e destacar medidas específicas de minimização do risco que devem ser tomadas antes e durante o tratamento com baricitinib.

O Titular da AIM deverá certificar-se de que, em cada Estado-Membro em cujo mercado baricitinib seja introduzido, todos os profissionais de saúde que previsivelmente irão prescrever baricitinib têm à sua disposição materiais educacionais para médicos, contendo:

- O Resumo das Características do Medicamento
- O Folheto Informativo, incluindo o Cartão de Alerta para o Doente
- O guia de apoio ao aconselhamento dos doentes destinado aos profissionais de saúde
- Cartões de Alerta para o Doente adicionais

**O guia para os profissionais de saúde** deverá conter os seguintes elementos essenciais:

- Fornecer declarações de indicação e posologia para reforçar em quem o baricitinib deve ser utilizado.
- Baricitinib aumenta o risco potencial de infeções. Os doentes devem ser aconselhados a procurar ajuda médica imediata, caso surjam sinais ou sintomas de infeção. Como há uma maior incidência de infeções em idosos e na população diabética em geral, deve ter-se precaução no tratamento de idosos e doentes com diabetes. O baricitinib apenas deve ser utilizado em doentes com idade igual ou superior a 65 anos se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.
- A utilização do baricitinib deve ser interrompida em caso de ocorrência de herpes zoster ou qualquer outra infeção que não responda ao tratamento convencional até à resolução do acontecimento. Os doentes não devem ser imunizados com vacinas vivas atenuadas pouco tempo antes ou durante o tratamento com baricitinib.
- Antes de iniciar o tratamento, é recomendado que todos os doentes, especialmente os doentes pediátricos, sejam atualizados com todas as imunizações de acordo com as atuais diretivas de imunização locais.
- Os prescritores deverão fazer o rastreio de hepatites virais ao doente antes de iniciarem o tratamento com baricitinib. Deverá também ser descartada a presença de tuberculose ativa.
- A utilização do baricitinib está associada a hiperlipidemia; os prescritores deverão monitorizar os parâmetros lipídicos do doente e tratar a hiperlipidemia, caso seja detetada.
- Baricitinib aumenta o risco de trombose venosa e de embolia pulmonar. Baricitinib deve ser utilizado com precaução em doentes com fatores de risco conhecidos de TVP/EP. Os doentes devem ser aconselhados a procurar ajuda médica imediata, caso surjam sinais ou sintomas de TVP/EP.
- Há um risco potencialmente aumentado de MACE em doentes com certos fatores de risco que estejam a realizar tratamento com inibidores das JAK, incluindo baricitinib. Em doentes com idade igual ou superior a 65 anos, doentes que são fumadores atuais ou ex-fumadores que tenham fumado durante um longo período de tempo e doentes com outros fatores de risco cardiovascular, o baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.
- Foram notificados linfoma e outras neoplasias malignas em doentes a receber inibidores das JAK, incluindo baricitinib. Em doentes com mais de 65 anos de idade, doentes são fumadores atuais ou ex-fumadores que tenham fumado durante um longo período de tempo, ou com outros fatores de risco de neoplasias malignas (por ex., neoplasia maligna atual ou histórico de neoplasia maligna), o baricitinib apenas deve ser utilizado se não estiverem disponíveis alternativas de tratamento adequadas.
- Baricitinib está contraindicado na gravidez, pois os dados pré-clínicos revelaram redução do crescimento fetal e malformações. Os médicos deverão aconselhar as mulheres com potencial para engravidar a utilizar contraceptivos durante o tratamento e durante uma semana após a última toma do medicamento. Se a mulher estiver a planear engravidar, o tratamento com baricitinib deverá ser suspenso.
- O objetivo e utilização do Cartão de Alerta para o Doente

**O Cartão de Alerta do Doente** deverá conter os seguintes elementos essenciais:

- O tratamento com baricitinib pode aumentar o risco de infeções, e reativação viral, que pode tornar-se grave se não for tratada.

- Sinais e sintomas de infeções incluindo sintomas gerais e sinais e sintomas específicos da tuberculose e do herpes *zoster*; e uma recomendação para que os doentes procurem ajuda médica imediata, se aparecerem sinais ou sintomas sugestivos de infeção.
- Os doentes devem procurar imediatamente aconselhamento médico se ocorrerem sinais e sintomas de enfarte do miocárdio ou de acidente vascular cerebral.
- Baricitinib não deve ser tomado durante a gravidez, e as mulheres deverão informar o seu médico no caso de engravidarem ou quererem engravidar.
- Baricitinib pode causar um coágulo sanguíneo na perna que pode deslocar-se até aos pulmões; é feita uma descrição dos sinais e sintomas e incluída uma recomendação para que os doentes procurem ajuda médica imediata, se aparecerem sinais ou sintomas sugestivos de um coágulo sanguíneo.
- Baricitinib poderá causar cancro da pele não-melanoma e os doentes devem aconselhar-se com o seu médico se aparecerem novas lesões na pele durante ou após o tratamento ou se as lesões existentes mudarem de aparência, fale com o seu médico.
- Informações de contacto do prescriptor.
- O Cartão de Alerta para o Doente deverá acompanhar permanentemente o doente, que deverá apresentá-lo a outros profissionais de saúde envolvidos no seu tratamento.

**ANEXO III**  
**ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO**

## **A. ROTULAGEM**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO**

**CARTONAGEM PARA COMPRIMIDOS DE 1 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película  
baricitinib

**2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)**

Cada comprimido contém 1 mg de baricitinib

**3. LISTA DOS EXCIPIENTES**

**4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO**

14 comprimidos revestidos por película  
28 comprimidos revestidos por película  
28 x 1 comprimidos revestidos por película

**5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO**

Via oral  
Consultar o folheto informativo antes de utilizar

Código QR a incluir+ [www.olumiant.eu](http://www.olumiant.eu)

**6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO**

**8. PRAZO DE VALIDADE**

EXP

**9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

**10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE APLICÁVEL**

**11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Países Baixos.

**12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/1/16/1170/017 (14 comprimidos revestidos por película)  
EU/1/16/1170/018 (28 comprimidos revestidos por película)  
EU/1/16/1170/019 (28 x 1 comprimidos revestidos por película)

**13. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO**

**15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE**

Olumiant 1 mg

**17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D**

Código de barras 2D com o identificador único incluído.

**18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS LEGÍVEIS**

PC  
SN  
NN

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS CALENDÁRIO PARA COMPRIMIDOS DE 1 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 1 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

Seg  
Ter  
Qua  
Qui  
Sex  
Sab  
Dom

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS PERFURADOS PARA DOSE UNITÁRIA DE COMPRIMIDOS DE 1 MG  
REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 1 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO**

**CARTONAGEM PARA COMPRIMIDOS DE 2 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película  
baricitinib

**2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)**

Cada comprimido contém 2 mg de baricitinib

**3. LISTA DOS EXCIPIENTES**

**4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO**

14 comprimidos revestidos por película  
28 comprimidos revestidos por película  
35 comprimidos revestidos por película  
56 comprimidos revestidos por película  
84 comprimidos revestidos por película  
98 comprimidos revestidos por película  
28 x 1 comprimidos revestidos por película  
84 x 1 comprimidos revestidos por película

**5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO**

Via oral  
Consultar o folheto informativo antes de utilizar

Código QR a incluir + [www.olumiant.eu](http://www.olumiant.eu)

**6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO**

**8. PRAZO DE VALIDADE**

EXP

**9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

**10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE APLICÁVEL**

**11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Países Baixos.

**12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/1/16/1170/001	(14 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/002	(28 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/003	(28 x 1 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/004	(35 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/005	(56 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/006	(84 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/007	(84 x 1 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/008	(98 comprimidos revestidos por película)

**13. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO**

**15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE**

Olumiant 2 mg

**17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D**

Código de barras 2D com o identificador único incluído.

**18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS LEGÍVEIS**

PC  
SN  
NN

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS CALENDÁRIO PARA COMPRIMIDOS DE 2 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 2 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

Seg  
Ter  
Qua  
Qui  
Sex  
Sab  
Dom

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS PERFURADOS PARA DOSE UNITÁRIA DE COMPRIMIDOS DE 2 MG  
REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 2 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO**

**CARTONAGEM PARA COMPRIMIDOS DE 4 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película  
baricitinib

**2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)**

Cada comprimido contém 4 mg de baricitinib

**3. LISTA DOS EXCIPIENTES**

**4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO**

14 comprimidos revestidos por película  
28 comprimidos revestidos por película  
35 comprimidos revestidos por película  
56 comprimidos revestidos por película  
84 comprimidos revestidos por película  
98 comprimidos revestidos por película  
28 x 1 comprimidos revestidos por película  
84 x 1 comprimidos revestidos por película

**5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO**

Via oral  
Consultar o folheto informativo antes de utilizar

Código QR a inclui + [www.olumiant.eu](http://www.olumiant.eu)

**6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO**

**8. PRAZO DE VALIDADE**

EXP

**9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

**10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE APLICÁVEL**

**11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Países Baixos.

**12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/1/16/1170/009	(14 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/010	(28 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/011	(28 x 1 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/012	(35 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/013	(56 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/014	(84 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/015	(84 x 1 comprimidos revestidos por película)
EU/1/16/1170/016	(98 comprimidos revestidos por película)

**13. NÚMERO DO LOTE**

Lote

**14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO**

**15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE**

Olumiant 4 mg

**17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D**

Código de barras 2D com o identificador único incluído.

**18. IDENTIFICADOR ÚNICO – DADOS LEGÍVEIS**

PC  
SN  
NN

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS CALENDÁRIO PARA COMPRIMIDOS DE 4 MG REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 4 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

Seg  
Ter  
Qua  
Qui  
Sex  
Sab  
Dom

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR NAS EMBALAGENS BLISTER OU FITAS  
CONTENTORAS**

**BLISTERS PERFURADOS PARA DOSE UNITÁRIA DE COMPRIMIDOS DE 4 MG  
REVESTIDOS POR PELÍCULA**

**1. NOME DO MEDICAMENTO**

Olumiant 4 mg comprimidos  
baricitinib

**2. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Lilly

**3. DATA DE VALIDADE**

EXP

**4. NÚMERO DO LOTE**

Lot

**5. OUTRAS**

## **B. FOLHETO INFORMATIVO**

## Folheto informativo: Informação para o utilizador

**Olumiant 1 mg comprimidos revestidos por película**  
**Olumiant 2 mg comprimidos revestidos por película**  
**Olumiant 4 mg comprimidos revestidos por película**  
baricitinib

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale como o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.

### O que contém este folheto

1. O que é Olumiant e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Olumiant
3. Como tomar Olumiant
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Olumiant
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

#### 1. O que é Olumiant e para que é utilizado

Olumiant contém a substância ativa baricitinib. Pertence a um grupo de medicamentos designados por inibidores das Janus quinases, que ajudam a reduzir a inflamação.

##### Artrite reumatoide

Olumiant é utilizado para tratar adultos com artrite reumatoide moderada a grave, uma doença inflamatória das articulações, se a terapêutica anterior não resultou suficientemente bem ou não foi tolerada. Olumiant pode ser utilizado como único medicamento ou juntamente com outros medicamentos, como o metotrexato.

Olumiant atua, reduzindo a atividade de uma enzima do organismo denominada “Janus quinase”, que está envolvida na inflamação. Ao reduzir a atividade desta enzima, Olumiant ajuda a reduzir a dor, a rigidez e o inchaço das suas articulações, ajuda a reduzir o cansaço e ajuda a diminuir a progressão das lesões no osso e nas cartilagens das articulações. Estes efeitos podem ajudá-lo a realizar as suas atividades diárias normais e, assim, melhorar a qualidade de vida relacionada com a saúde dos doentes com artrite reumatoide.

##### Dermatite atópica

Olumiant é utilizado para tratar crianças com idade igual ou superior a 2 anos, adolescentes e adultos com dermatite atópica moderada a grave, também conhecida como eczema atópico. Olumiant pode ser utilizado juntamente com medicamentos para o eczema, que são aplicados na pele, ou como único medicamento.

Olumiant atua reduzindo a atividade de uma enzima do organismo denominada “Janus quinase”, que está envolvida na inflamação. Ao reduzir a atividade desta enzima, Olumiant ajuda a melhorar o estado da sua pele e a reduzir o prurido. Além disso, Olumiant ajuda a melhorar as perturbações do sono (causadas pelo prurido) e a qualidade de vida. Olumiant também demonstrou melhorar os sintomas de dor cutânea, ansiedade e depressão associados à dermatite atópica.

### **Alopecia areata**

Olumiant é utilizado para tratar adultos com alopecia areata grave, uma doença autoimune caracterizada pela perda de cabelo inflamatória e não-cicatricial no couro cabeludo, na face e por vezes noutras zonas do corpo que pode ser recorrente e progressiva.

Olumiant atua reduzindo a atividade de uma enzima do organismo denominada “Janus quinase”, que está envolvida na inflamação. Ao reduzir a atividade desta enzima, Olumiant ajuda a que o cabelo cresça novamente no couro cabeludo, face ou outras zonas do corpo afetadas pela doença.

### **Artrite idiopática juvenil poliarticular, artrite relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil**

Olumiant é utilizado para o tratamento da artrite idiopática juvenil poliarticular ativa, uma doença inflamatória das articulações, em crianças com idade igual ou superior a 2 anos.

Olumiant é também utilizado no tratamento da artrite relacionada com a entesite ativa, uma doença inflamatória das articulações e dos locais onde os tendões se unem ao osso, em crianças com idade igual ou superior a 2 anos.

Olumiant é também utilizado para o tratamento da artrite psoriática juvenil ativa, uma doença inflamatória das articulações frequentemente acompanhada de psoríase, em crianças com idade igual ou superior a 2 anos.

Olumiant pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com o metotrexato.

## **2. O que precisa de saber antes de tomar Olumiant**

### **Não tome Olumiant**

- se tem alergia ao baricitinib ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- se estiver grávida ou achar que pode estar grávida.

### **Advertências e precauções**

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes e durante o tratamento com Olumiant se:

- tem mais do que 65 anos de idade. Doentes com idade igual ou superior a 65 anos poderão ter um risco acrescido de infeções, problemas de coração incluindo ataque cardíaco e alguns tipos de cancro. O seu médico irá discutir consigo se Olumiant é adequado para si.
- tem uma infeção, ou se tem frequentemente infeções. Fale com o seu médico se tiver sintomas como febre, feridas, se se sentir mais cansado do que é habitual ou se tiver problemas dentários, pois podem ser sinais de infeção. Olumiant pode reduzir a capacidade do seu organismo de combater as infeções e pode agravar uma infeção existente ou aumentar as probabilidades de ter uma nova infeção. Se tem diabetes ou se tem mais do que 65 anos poderá ter uma maior probabilidade de ter infeções.
- tem, ou teve, tuberculose. Pode precisar de fazer testes para avaliar a tuberculose antes de tomar Olumiant. Fale com o seu médico se tiver tosse persistente, febre, suores noturnos e perda de peso durante o tratamento com Olumiant, pois podem ser sinais de tuberculose
- teve uma infeção por herpes (zona), pois Olumiant pode permitir que ela reapareça. Fale com o seu médico se tiver uma erupção na pele dolorosa com bolhas durante o tratamento com Olumiant, pois podem ser sinais de zona
- tem ou teve hepatite B ou C
- necessitar ser vacinado. Não deve tomar certas vacinas (vivas) durante o tratamento com Olumiant
- tem ou já tiver tido cancro, fuma ou já fumou no passado, pois o seu médico irá discutir consigo se Olumiant é adequado para si.
- tiver uma função hepática deficiente

- tem, ou já tiver tido, problemas de coração, pois o seu médico irá discutir consigo se Olumiant é adequado para si.
- já teve coágulos de sangue nas veias dos membros inferiores (trombose venosa profunda) ou nos pulmões (embolia pulmonar), ou tiver um risco aumentado de os desenvolver (por exemplo: se teve uma grande cirurgia recentemente, se utiliza contraceptivos hormonais/terapêutica de substituição hormonal, ou se foi identificado um distúrbio na coagulação em si ou nos seus familiares). O seu médico irá discutir consigo se Olumiant é adequado para si. Informe o seu médico se tiver uma falta de ar súbita ou dificuldade em respirar, dor no peito ou dor na parte superior das costas, inchaço na perna ou no braço, dor ou sensibilidade na perna, ou vermelhidão ou descoloração na perna ou braço, pois estes podem ser sinais de coágulos sanguíneos nas veias
- já teve diverticulite (um tipo de inflamação do intestino grosso) ou úlceras no estômago ou nos intestinos (ver secção 4).
- Foi observado cancro da pele não-melanoma em doentes a tomar Olumiant. O seu médico pode recomendar que faça exames regulares da pele enquanto estiver a tomar Olumiant. Se surgirem novas lesões cutâneas durante ou após o tratamento ou se as lesões existentes mudarem de aparência, informe o seu médico.

Se detetar alguns dos seguintes efeitos indesejáveis graves, deve informar o seu médico de imediato:

- aperto no peito
- pieira
- tonturas graves ou ligeiras
- inchaço dos lábios, língua ou garganta
- urticária (prurido ou erupção cutânea)
- dor abdominal intensa, especialmente se acompanhada de febre, náuseas e vômitos
- dor ou aperto no peito grave (que pode se espalhar para os braços, maxilar, pescoço, costas)
- falta de ar
- suores frios
- fraqueza unilateral no braço e/ou perna
- fala arrastada

Pode ter de fazer análises ao sangue antes de começar a tomar Olumiant, ou se ainda estiver a tomar, para verificar se tem uma baixa contagem de glóbulos vermelhos (anemia), uma baixa contagem de glóbulos brancos (neutropenia ou linfopenia), muita gordura no sangue (colesterol) ou níveis elevados das enzimas hepáticas, para garantir que o tratamento com Olumiant não está a causar problemas.

### **Crianças e adolescentes**

Se possível, crianças e adolescentes devem estar com as vacinas todas em dia antes de utilizar Olumiant.

Não dê este medicamento a crianças com menos de 2 anos de idade.

Não dê este medicamento a crianças e adolescentes com alopecia areata com menos de 18 anos de idade, porque não existem informações sobre a utilização nesta doença.

### **Outros medicamentos e Olumiant**

Fale com o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Informe sobretudo o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Olumiant, se estiver a utilizar qualquer outro medicamento como:

- probenecida (para a gota), pois este medicamento pode aumentar os níveis de Olumiant no sangue. Se estiver a tomar probenecida, a dose recomendada de Olumiant para adultos é de 2 mg, uma vez por dia, e para crianças e adolescentes a dose deve ser reduzida para metade.
- medicamentos antirreumáticos injetáveis
- medicamentos injetáveis que inibam o sistema imunitário, incluindo as terapêuticas biológicas dirigidas (anticorpos)

- medicamentos utilizados para controlar a resposta imunitária do organismo, como azatioprina, tacrolimus ou ciclosporina
- outros medicamentos pertencentes ao grupo dos inibidores da Janus quinase
- medicamentos que podem aumentar o risco de diverticulite, tais como medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (geralmente utilizados para tratar patologias dolorosas e/ou inflamatórias dos músculos ou das articulações) e/ou opioides (utilizados no tratamento da dor intensa) e/ou corticosteroides (geralmente utilizados no tratamento de doenças inflamatórias) (ver secção 4).

### **Gravidez e amamentação**

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou se planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Deverá utilizar contraceptivos eficazes para evitar engravidar durante o tratamento com Olumiant e, pelo menos, durante uma semana após a última toma de Olumiant. Fale com o seu médico se engravidar, pois Olumiant não deve ser utilizado durante a gravidez.

Não utilize Olumiant se estiver a amamentar, pois não se sabe se este medicamento passa para o leite materno. Consulte o seu médico para decidirem se deve amamentar ou tomar Olumiant. Não deverá fazer as duas coisas em simultâneo.

### **Condução de veículos e utilização de máquinas**

Olumiant não tem qualquer efeito sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

### **Olumiant contém sódio**

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

## **3. Como tomar Olumiant**

O tratamento deve ser iniciado por um médico com experiência no diagnóstico e tratamento da sua doença. Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

### **Adultos com artrite reumatoide, dermatite atópica e alopecia areata**

A dose recomendada é de 4 mg, uma vez por dia. O seu médico poderá receitar-lhe uma dose mais baixa de 2 mg, uma vez por dia, principalmente se tiver mais de 65 anos de idade ou se tiver um risco acrescido de infeções, coágulos sanguíneos, acontecimentos cardiovasculares *major* ou cancro.

Se estiver a responder bem ao tratamento, o seu médico poderá decidir que a dose pode ser reduzida.

Se tiver uma função renal diminuída, a dose recomendada de Olumiant é de 2 mg, uma vez por dia.

### **Uso em crianças e adolescentes**

A dose recomendada é de 4 mg, uma vez ao dia, para doentes  $\geq 30$  kg. Para doentes com 10 kg a  $< 30$  kg, a dose recomendada é de 2 mg, uma vez ao dia.

Se tem função renal reduzida, a dose recomendada de Olumiant deve ser reduzida para metade.

Para doentes pediátricos que não conseguem engolir comprimidos inteiros, os comprimidos podem ser dispersos em água:

- Coloque o comprimido inteiro num recipiente com 5-10 ml de água à temperatura ambiente e agite suavemente para dispersar (desfazer) o comprimido. Poderá levar até 10 minutos para que o comprimido se disperse numa suspensão rosa-pálida turva. Poderá ocorrer alguma sedimentação.

- Após a dispersão do comprimido, agite suavemente novamente e depois engula a mistura de imediato.
- Lave o recipiente com 5-10 ml de água à temperatura ambiente, agitando e engula a mistura de imediato para garantir que a dose completa é ingerida.

Apenas água deve ser usada para dispersar o comprimido.

Depois de o comprimido estar disperso em água, este pode ser utilizado até 4 horas, se mantido à temperatura ambiente.

Se um comprimido é disperso em água e apenas uma parte da dose dispersa é ingerida, espere até ao dia seguinte para tomar a próxima dose calendarizada.

### **Modo de administração**

Olumiant destina-se a administração oral. Deverá engolir o seu comprimido com água.

Pode tomar os comprimidos com ou sem alimentos. Para o ajudar a lembrar-se de tomar Olumiant, poderá ser mais fácil para si tomá-lo todos os dias à mesma hora.

### **Se tomar mais Olumiant do que deveria**

Se tomar mais Olumiant do que deveria, consulte o seu médico. Poderá ter alguns dos efeitos indesejáveis descritos na secção 4.

### **Caso se tenha esquecido de tomar Olumiant**

- Se se esqueceu de tomar este medicamento, tome-o assim que se lembrar.
- Se se esqueceu de o tomar durante um dia inteiro, omita a dose de que se esqueceu e tome uma dose única no dia seguinte, como habitualmente.
- Não tome uma dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de tomar.

### **Se parar de tomar Olumiant**

Não pare de tomar o seu medicamento a menos que o seu médico lhe diga para o fazer.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

## **4. Efeitos indesejáveis possíveis**

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

### **Efeitos indesejáveis graves**

**Infeção como a zona e pneumonia**, que podem afetar até 1 em 10 pessoas:

Informe imediatamente o seu médico ou procure ajuda médica se tiver os seguintes sintomas, que podem ser sinais de:

- zona (*herpes zoster*): erupção cutânea dolorosa com bolhas e febre (foram muito raros na dermatite atópica e pouco frequentes na alopecia areata)
- pneumonia: tosse persistente, febre, falta de ar e cansaço (foi pouco frequente na dermatite atópica e na alopecia areata)

Pneumonia grave e *herpes zoster* grave foram pouco frequentes.

### **Outros efeitos indesejáveis**

**Muito frequentes** (podem afetar mais de 1 em 10 pessoas)

- infeções da garganta e do nariz
- níveis altos de gordura no sangue (colesterol) revelados por uma análise ao sangue

### **Frequentes** (podem afetar até 1 em 10 pessoas)

- Feridas (herpes *simplex*)
- infecção que provoque dores de estômago ou diarreia (gastroenterite)
- infecção urinária
- número elevado de plaquetas (células envolvidas na coagulação do sangue), revelado por uma análise ao sangue (foi pouco frequente na dermatite atópica e na alopecia areata)
- dor de cabeça
- sentir indisposição no estômago (náusea; foi pouco frequente na dermatite atópica)
- dor de estômago (foi pouco frequente na alopecia areata)
- níveis elevados de enzimas hepáticas, revelados por uma análise ao sangue (foi pouco frequente na dermatite atópica)
- erupção na pele
- acne (foi pouco frequente na artrite reumatoide)
- aumento de uma enzima chamada creatina quinase, revelada numa análise ao sangue (foi pouco frequente na artrite reumatoide)
- inflamação (inchaço) dos folículos capilares particularmente na região do couro cabeludo associada a novo crescimento do cabelo (observada na alopecia areata)

### **Pouco frequentes** (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

- número baixo de glóbulos brancos (neutrófilos), revelado por uma análise ao sangue
- níveis elevados de gordura no sangue (triglicéridos), revelados por uma análise ao sangue
- níveis elevados de enzimas hepáticas, revelados por uma análise ao sangue (foi frequente na alopecia areata)
- aumento de peso
- inchaço na face
- urticária
- coágulos sanguíneos nos vasos sanguíneos dos pulmões
- coágulo sanguíneo nas veias das pernas ou da pelve, chamado de trombose venosa profunda (TVP)
- diverticulite (inflamação dolorosa de pequenas bolsas na parede do intestino).

### **Crianças e adolescentes**

- **Artrite idiopática juvenil poliarticular, artrite relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil:** num estudo com crianças com idade igual ou superior a 2 anos com artrite idiopática juvenil poliarticular, artrite relacionada com entesite e artrite psoriática juvenil, a dor de cabeça foi muito frequente, e um baixo número de glóbulos brancos e coágulos sanguíneos nos pulmões foram frequentes (1 em cada 82 crianças).
- **Dermatite atópica pediátrica:** num estudo com crianças com idade igual ou superior a 2 anos com dermatite atópica, os efeitos indesejáveis foram consistentes com os observados em doentes adultos, com a exceção do baixo número de glóbulos brancos (neutrófilos), que foi mais frequente em comparação aos adultos.

### **Comunicação de efeitos indesejáveis**

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#). Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

## **5. Como conservar Olumiant**

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Este medicamento não necessita de condições especiais de conservação.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e blister após “EXP”. A data de validade refere-se ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

## 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### Qual a composição de Olumiant

- A substância ativa é baricitinib. Cada comprimido contém 1, 2 ou 4 miligramas do baricitinib.
- Os outros componentes são: celulose microcristalina, croscarmelose sódica (ver secção 2 “Olumiant contém sódio”), estearato de magnésio, manitol, óxido de ferro vermelho (E172), lecitina (soja) (E322), macrogol, álcool polivinílico, talco, dióxido de titânio (E171).

### Qual o aspeto de Olumiant e conteúdo da embalagem

Os comprimidos de Olumiant 1 mg revestidos por película são comprimidos redondos de 6,75 mm, cor rosa muito pálido, com “Lilly” gravado numa das faces e “1” na outra.

Os comprimidos de Olumiant 2 mg revestidos por película são comprimidos oblongos de 9 x 7,5 mm, rosa-pálido, com “Lilly” gravado numa das faces e “2” na outra.

Os comprimidos de Olumiant 4 mg revestidos por película são redondos de 8,5 mm, de cor rosa, com “Lilly” gravado numa das faces e “4” na outra.

Os comprimidos são arredondados e têm uma parte côncava nas extremidades para ajudar a tirá-los.

Olumiant 1 mg está disponível em embalagens com blisters de 14 e 28 comprimidos em blisters calendário e 28 x 1 comprimidos em blisters perfurados de dose unitária. Olumiant 2 mg e 4 mg está disponível em embalagens com blisters de 14, 28, 35, 56, 84 e 98 comprimidos em blisters calendário e 28 x 1 e 84 x 1 comprimidos em blisters perfurados de dose unitária. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

### Titular da Autorização de Introdução

Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ, Utrecht, Países Baixos.

### Fabricante

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Espanha.

Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

#### Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.  
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

#### Lietuva

Eli Lilly Lietuva  
Tel. +370 (5) 2649600

#### България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България  
тел. + 359 2 491 41 40

#### Luxembourg/luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.  
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

#### Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.  
Tel: + 420 234 664 111

#### Magyarország

Lilly Hungária Kft.  
Tel: + 36 1 328 5100

**Danmark**

Eli Lilly Danmark A/S  
Tlf: +45 45 26 60 00

**Deutschland**

Lilly Deutschland GmbH  
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

**Eesti**

Eli Lilly Nederland B.V.  
Tel: +372 6 817 280

**Ελλάδα**

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  
Τηλ: +30 210 629 4600

**España**

Lilly S.A.  
Tel: + 34-91 663 50 00

**France**

Lilly France  
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

**Hrvatska**

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.  
Tel: +385 1 2350 999

**Ireland**

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited  
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

**Ísland**

Icepharma hf.  
Sími + 354 540 8000

**Italia**

Eli Lilly Italia S.p.A.  
Tel: + 39- 055 42571

**Κύπρος**

Phadisco Ltd  
Τηλ: +357 22 715000

**Latvija**

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā  
Tel: +371 67364000

**Malta**

Charles de Giorgio Ltd.  
Tel: + 356 25600 500

**Nederland**

Eli Lilly Nederland B.V.  
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

**Norge**

Eli Lilly Norge A.S.  
Tlf: + 47 22 88 18 00

**Österreich**

Eli Lilly Ges.m.b.H.  
Tel: + 43-(0) 1 711 780

**Polska**

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 440 33 00

**Portugal**

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda  
Tel: + 351-21-4126600

**România**

Eli Lilly România S.R.L.  
Tel: + 40 21 4023000

**Slovenija**

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.  
Tel: +386 (0)1 580 00 10

**Slovenská republika**

Eli Lilly Slovakia s.r.o.  
Tel: + 421 220 663 111

**Suomi/Finland**

Oy Eli Lilly Finland Ab  
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

**Sverige**

Eli Lilly Sweden AB  
Tel: + 46-(0) 8 7378800

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited  
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

**Este folheto foi revisto pela última vez em**

### **Outras fontes de informação**

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>

Código QR a incluir + [www.olumiant.eu](http://www.olumiant.eu)

Por favor retire esta parte do folheto informativo e mantenha-a junto de si.

---

<p><b>Informações aos doentes sobre OLUMIANT (baricitinib)</b></p> <p><b>Este documento contém informações importantes às quais deve prestar atenção antes e durante o tratamento com Olumiant.</b></p> <p>Mantenha estas informações consigo e partilhe-as com outros profissionais de saúde envolvidos nos seus cuidados médicos ou tratamento.</p> <p><b>O seu nome:</b></p> <hr/> <p><b>Nome do médico</b> (que prescreveu Olumiant):</p> <hr/> <p><b>N.º de telefone do médico:</b></p> <hr/>	<p><b><u>Gravidez:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Não tome Olumiant durante a gravidez ou se suspeita de que pode estar grávida.</li><li>• Utilize métodos contraceptivos eficazes enquanto estiver a tomar Olumiant (e, pelo menos, durante uma semana depois de parar o tratamento).</li><li>• Diga imediatamente ao seu médico se engravidar (ou se planeia engravidar).</li></ul> <p><b><u>Infeções:</u></b></p> <p>Olumiant pode agravar uma infeção existente ou aumentar a probabilidade de vir a ter uma nova infeção ou aumentar a probabilidade de reativação viral. Se tiver diabetes ou tem mais de 65 anos, pode ter uma maior probabilidade de ter infeções. A infeção pode tornar-se grave se não for tratada. Informe o seu médico imediatamente se tiver sintomas de infeção, como por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Febre, feridas, sentir-se mais cansado do que o habitual, ou problemas dentários.</li><li>• Tosse persistente, suores noturnos e perda de peso. Podem ser sintomas de tuberculose (uma doença infecciosa dos pulmões).</li><li>• Uma erupção na pele dolorosa com bolhas. Pode ser um sinal de uma infeção por herpes zoster.</li></ul> <p><b><u>Cancro da pele não-melanoma</u></b></p> <p>Foi notificado cancro da pele não-melanoma em doentes a tomar Olumiant. Se surgirem novas lesões cutâneas durante ou após o tratamento ou se as lesões existentes mudarem de aparência, informe o seu médico.</p> <p><b><u>Coágulos sanguíneos:</u></b></p> <p>Olumiant pode causar uma patologia em que se forma um coágulo sanguíneo na sua perna, que pode deslocar-se até aos seus pulmões. Informe o seu médico imediatamente se tiver qualquer um dos seguintes sintomas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inchaço ou dor numa perna ou braço</li><li>• Calor ou vermelhidão numa perna ou braço</li><li>• Falta de ar inesperada</li><li>• Respiração acelerada</li><li>• Dor no peito</li></ul>
--	--

**Ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral:**

- Dor ou aperto no peito grave (que pode se espalhar para os braços, maxilar, pescoço, costas)
- Falta de ar
- Suores frios
- Fraqueza unilateral no braço e/ou perna
- Fala arrastada